

LE GROUPOÏDE DE GALOIS DE P_1 ET SON IRRÉDUCTIBILITÉ

GUY CASALE

RÉSUMÉ. Dans cet article, nous calculons le groupoïde de Galois de la première équation de Painlevé. Nous proposons ensuite une définition de réductibilité pour les feuilletages holomorphes singuliers et montrons que la réductibilité peut se lire sur le groupoïde de Galois du feuilletage. Nous obtenons un résultat d'irréductibilité du feuilletage sous-jacent à la première équation de Painlevé.

ABSTRACT. (**The Galois groupoid of P_1 and its irreducibility**) In this article, the Galois groupoid of the first Painlevé equation is computed. This computation uses É. Cartan's classification of structural equations of pseudogroups acting on \mathbb{C}^2 and the degeneration of the first Painlevé equation on an elliptic equation ($y'' = 6y^2$). Moreover a definition of reducibility for singular holomorphic foliations is proposed and a characterization of reducible foliations on their Galois groupoids is given. It is applied to prove the foliation-irreducibility of the first Painlevé equation.

TABLE DES MATIÈRES

Introduction	2
0.1. Énoncé des résultats	2
0.2. Théories de Galois différentielles et irréductibilité	3
0.3. Organisation de l'article	4
0.4. Remerciements	5
1. Le groupoïde de Galois d'un feuilletage algébrique	5
1.1. Espaces de jets et \mathcal{D} -variétés	5
1.2. \mathcal{D} -groupoïdes de Lie algébriques et \mathcal{D} -algèbres de Lie	7
1.3. Forme de Maurer-Cartan d'un \mathcal{D} -groupoïde de Lie et suites de Godbillon-Vey d'un feuilletage	10
2. Le groupoïde de Galois de P_1	13
2.1. Étude préliminaire de l'équation réduite X_0	14
2.2. Le groupoïde de Galois de X_1 est transitif	16
2.3. Le groupoïde de Galois de X_1 est transversalement primitif	17
2.4. Le groupoïde de Galois n'est pas transversalement affine	20
3. Irréductibilité de P_1	25
3.1. Feuilletages réductibles	25
3.2. Types d'une extension différentielle et preuve du théorème 3.4	26
Annexe A. Classification de Cartan ; preuve du théorème 1.35	28
Références	32

This work was done when the author was supported by JSPS Postdoctoral Fellowship for Foreign Researchers (FY2004). The author is supported by EIF Marie Curie fellowship.

Address: Department de Matemàtiques, Edifici C, Universitat Autònoma des Barcelona, 08 193 Bellaterra (Barcelona) Spain

E-mail address: casale@picard.ups-tlse.fr ; casale@mat.uab.es .

INTRODUCTION

Le groupoïde de Galois d'un feuilletage a été introduit par B. Malgrange dans [18]. Cette définition concerne les feuilletages holomorphes (singuliers) sur une variété \mathbb{C} -analytique lisse. Cet objet est la "clôture de Zariski" du pseudo-groupe d'holonomie du feuilletage dans le sens suivant. Soient (X, \mathcal{F}) une variété \mathbb{C} -analytique lisse portant un feuilletage \mathcal{F} . Les champs de vecteurs locaux tangents à \mathcal{F} forment un faisceau en algèbres de Lie de champs de vecteurs. Le pseudo-groupe de transformations de X engendré par ces champs de vecteurs est appelé le pseudo-groupe tangent du feuilletage et noté $Tan(\mathcal{F})$. Ce pseudo-groupe intervient notamment dans la construction des transports holonomes. Le pseudo-groupe tangent n'est pas décrit par un système d'équations aux dérivées partielles, ceci malgré le fait que le faisceau de champs de vecteurs dont il est issu soit décrit par un système d'équations aux dérivées partielles linéaires. Ce phénomène est bien connu sur les groupes algébriques où le groupe de Lie intégrant une sous-algèbre de Lie n'est pas toujours un groupe algébrique. La définition proposée par B. Malgrange est basée sur l'absence de "troisième théorème de Lie" pour les \mathcal{D} -groupoïdes de Lie (pseudo-groupes décrits par des e.d.p. algébriques ; définition 1.15). La définition du groupoïde de Galois est la suivante (nous renvoyons en 1.24 pour une définition plus précise).

Définition. *Le groupoïde de Galois d'un feuilletage est le plus petit \mathcal{D} -groupoïde de Lie contenant le pseudo-groupe tangent du feuilletage.*

Dans [18], B. Malgrange montre que cette définition généralise le groupe de Galois différentiel d'une connexion linéaire intégrable.

Dans le cas d'un germe de feuilletage de codimension un, une étude complète des relations entre le groupoïde de Galois, la transcendance des intégrales premières et les structures géométriques singulières transverses au feuilletage est faite dans [5]. L'outil principal de cette étude est la construction de suites de Godbillon-Vey méromorphes spéciales.

0.1. Énoncé des résultats. Dans cet article, nous calculons le groupoïde de Galois du feuilletage décrit par la première équation de Painlevé :

$$\frac{d^2y}{dx^2} = 6y^2 + x.$$

Nous noterons P_1 cette équation et

$$X_1 = \frac{\partial}{\partial x} + y' \frac{\partial}{\partial y} + (6y^2 + x) \frac{\partial}{\partial y'}$$

le champ de vecteurs décrivant le feuilletage associé. Nous obtenons le résultat suivant :

Théorème 2.1. *Le groupoïde de Galois de P_1 est le groupoïde d'invariance de la forme $\gamma = i_{X_1} dx \wedge dy \wedge dy'$. Ces solutions sont les germes de transformations de \mathbb{C}^3 , Γ , satisfaisant les équations $\Gamma^* \gamma = \gamma$.*

Les feuilletages plus simples que les feuilletages de codimension deux sont les feuilletages donnés par des équations linéaires et les feuilletages de codimension un. Nous dirons qu'un feuilletage de codimension deux est réductible si on peut construire deux intégrales premières locales en utilisant seulement des intégrales premières locales de feuilletages plus simples (définition 3.3). Plus précisément, pour la première équation de Painlevé, le théorème 2.1 nous permet d'obtenir le résultat d'irréductibilité suivant :

Théorème 3.4. *Il n'existe pas d'extension différentielle K_n de $(\mathbb{C}(x, y, y'), \frac{\partial}{\partial x}, \frac{\partial}{\partial y}, \frac{\partial}{\partial y'})$ contenant une intégrale première de X_1 construite de la manière suivante :*

$$\mathbb{C}(x, y, y') = K_0 \subset K_1 \dots \subset K_n$$

avec

- K_{i+1} algébrique sur K_i ,
- ou $K_{i+1} = K_i(h_1, \dots, h_p)$ avec $dh_j = \sum h_k \omega_j^k$, $\omega_j^k \in K_i \otimes \Omega_{\mathbb{C}^3}^1$ et $d\omega_j^k = -\sum \omega_\ell^k \wedge \omega_j^\ell$,
- ou $K_{i+1} = K_i(\langle h \rangle)$ avec $dh \wedge \omega = 0$, $\omega \in K_i \otimes \Omega_{\mathbb{C}^3}^1$ et $\omega \wedge d\omega = 0$.

Le corps $K(h)$ désigne le corps engendré par h et $K(\langle h \rangle)$ le corps différentiel engendré par h . Le théorème que nous montrons est en fait un peu plus général que celui-ci mais nécessite la mise en place du vocabulaire approprié.

0.2. Théories de Galois différentielles et irréductibilité. À la fin du dix-neuvième siècle, les idées d'É. Galois ont été étendues aux équations différentielles linéaires par É. Picard [26] puis ont été complétées par E. Vessiot [35]. Dans les années 1950, E. Kolchin développe cette théorie du point de vue des extensions de corps différentiels [1, 15]

Dans [7], J. Drach avance une théorie de Galois pour les équations différentielles non-linéaires. Malgré les erreurs qui invalident la plupart de ses définitions, il donne des indications pour calculer le groupoïde de Galois de divers feuilletages [9, 10] et notamment [8] dont cet article suit la démarche. Dans [36], E. Vessiot esquisse une définition semblable à celle de B. Malgrange. Elle est à l'origine de la définition du groupe de Galois infinitésimal de H. [32]. Bien qu'ils aient un "ancêtre" commun, l'équivalence du groupoïde de Galois et du groupe de Galois infinitésimal n'est encore qu'une conjecture.

Les premières tentatives de calcul du groupoïde de Galois de la première équation de Painlevé sont dûs à P. Painlevé [25] et J. Drach [8]. Utilisant une définition basée sur des résultats erronés, J. Drach donne les directions à suivre pour prouver le théorème 2.1. En faisant appel à la classification locale des pseudo-groupes de Lie agissant sur \mathbb{C}^2 , établie par S. Lie, il affirme que la nature du groupoïde de Galois est décrit par un système d'équations aux dérivées partielles (dit "résolvant") admettant une solution rationnelle. Il affirme ensuite que la dégénérescence de P_1 sur l'équation elliptique $y'' = 6y^2$ peut servir à montrer l'absence de solutions rationnelles aux équations résolvantes. Le premier point n'est pas justifié et le deuxième est entaché d'erreurs.

Dans les articles précédemment cités, les auteurs affirment que le théorème 2.1 implique l'irréductibilité "absolue" de l'équation sans même définir cette irréductibilité. Dans les Leçons de Stockholm [23], P. Painlevé définit une notion de réductibilité d'une solution d'une équation différentielle. Une équation est dite réductible si toutes ses solutions le sont. Il donne ensuite une caractérisation des équations sans singularités mobiles du second ordre réductibles : la solution générale dépend semi-transcendentement des constantes d'intégrations. En d'autres termes, l'équation admet une intégrale première rationnelle en les variables dépendantes.

Cette définition est très restrictive comme le montre P. Painlevé dans la remarque 28 de [24]. Elle a néanmoins l'intérêt de faire apparaître les différences entre la réductibilité d'une équation (ou du feuilletage sous-jacent) et celle d'une solution particulière. L'étude de la réductibilité des solutions particulières des équations de Painlevé est l'œuvre de l'école japonaise. H. Umemura [31] et K. Nishioka [21] donnent un critère permettant de trouver les familles à un paramètre de solutions réductibles d'une équation du second ordre et l'appliquent à l'étude de la première équation de Painlevé. À la suite de ces articles, Murata [20], Watanabe [37, 38], Noumi-Okamoto [22] and Umemura-Watanabe [33, 34] trouvent les solutions réductibles non algébriques des autres équations de Painlevé.

Ces résultats prouvent l'irréductibilité (au sens des Leçons de Stockholm) des solutions des équations de Painlevé pour des valeurs génériques des paramètres. Dans [24], P. Painlevé souligne la nature restrictive de sa définition et pose la question des rapports entre une définition de l'irréductibilité du feuilletage sous-jacent à l'équation et la tentative de théorie de Galois de J. Drach.

Dans cet article, nous proposons une définition de feuilletages réductibles. La définition porte sur les feuilletages de codimension deux mais il est facile de l'étendre aux feuilletages de codimension quelconque. Elle met l'accent sur la nature de certaines intégrales premières du feuilletage. Les intégrales premières les moins "transcendantes" permettent de comprendre grossièrement la manière dont la solution générale dépend des constantes d'intégration. Un des intérêts de cette définition est de pouvoir se lire sur le groupoïde de Galois du feuilletage. Nous suivons les résultats partiels de J. Drach pour calculer le groupoïde de Galois de P_1 et prouver son irréductibilité.

Dans l'état actuel, la réductibilité au sens des feuilletages ne permet pas de définir la réductibilité d'une solution particulière. D'une manière plus générale, les relations entre le type de transcendance d'une solution et celui des intégrales premières sont difficiles à saisir. Pour les feuilletages de codimension un, un théorème de M. Singer [30] dit que si une feuilletage du plan admet une solution Liouvillienne alors soit elle est algébrique soit le feuilletage admet une intégrale première Liouvillienne.

0.3. Organisation de l'article. Dans la première partie, nous rappelons les définitions nécessaires à la compréhension des résultats et des preuves présentés. Nous commençons par un rapide rappel de la construction des espaces de jets et des plus importantes des propriétés de leurs sous-variétés. Pour plus de détails, nous renvoyons aux livres de J.F. Ritt [28] et de J-F. Pommaret [27] dans le cadre algébrique et à B. Malgrange [19] dans le cadre analytique.

Nous rappelons ensuite les définitions de \mathcal{D} -groupoïdes de Lie et de leurs algèbres de Lie. Ces objets formalisent les notions de pseudo-groupes de Lie algébriques de transformations et de leurs algèbres de Lie de champs de vecteurs. Ils sont étudiés depuis S. Lie et É. Cartan sous le nom de "groupes infinis de Lie" ou de "pseudo-groupes de Lie" sous des hypothèses supplémentaires de régularité. L'étude de la structure d'un \mathcal{D} -groupoïde de Lie passe par la compréhension de sa forme de Maurer-Cartan. Cette forme généralise la forme de Maurer-Cartan d'un groupe de Lie et satisfait des équations de structures semblable [13, 29].

Enfin, nous donnons la définition du groupoïde de Galois d'un feuilletage. Nous définissons les formes invariantes transverses du groupoïde de Galois d'un feuilletage et montrons comment construire des suites de Godbillon-Vey "spéciales" à partir de ces formes. Cette partie se termine avec l'énoncé d'un résultat (théorème 1.35) donnant une description sommaire des suites de Godbillon-Vey possibles pour un feuilletage défini par une 2-forme fermée. Ce résultat est une conséquence de la preuve donnée par É. Cartan de la classification des pseudo-groupes agissant sur \mathbb{C}^2 . Nous redonnons la preuve de Cartan en annexe.

Dans la deuxième partie, nous calculons le groupoïde de Galois de P_1 . D'après le théorème 1.35, le théorème 2.1 est vrai si trois conditions sont vérifiées. Premièrement, il n'existe pas d'intégrale première rationnelle du feuilletage. Deuxièmement, il n'existe pas de feuilletage de codimension un contenant le feuilletage. Troisièmement, il n'existe pas de sl_2 -connexion sur le fibre conormal. Chacune de ces conditions se réécrit sous la forme d'un système d'équations aux dérivées partielles ne devant pas avoir de solutions algébriques. Pour montrer que ces équations n'ont pas de solutions, nous utilisons la dégénérescence de X_1 sur $X_0 = \frac{\partial}{\partial x} + y' \frac{\partial}{\partial y} + 6y^2 \frac{\partial}{\partial y'}$ à travers la famille $X_\alpha = \frac{\partial}{\partial x} + y' \frac{\partial}{\partial y} + (6y^2 + \alpha^5 x) \frac{\partial}{\partial y'}$. La famille de champs de vecteurs X_α étant triviale pour $\alpha \in \mathbb{C} - 0$, les équations à étudier se prolongent rationnellement au paramètre. En les développant le long de $\{\alpha = 0\}$, on

obtient une suite de systèmes d'équations aux dérivées partielles plus simples. Chacun des trois systèmes d'e.d.p. données par le théorème 1.35 est étudié dans un paragraphe propre.

Dans la dernière partie, nous définissons une propriété de réductibilité pour les feuilletages. Cette propriété signifie que l'on peut construire un système d'intégrales premières du feuilletage en utilisant successivement des intégrales premières de feuilletages plus simples. Dans le cas d'un feuilletage de codimension deux, les extensions de corps différentiels que nous considérerons comme plus simples que l'extension du corps des fonctions rationnelles par un système de deux intégrales premières indépendantes seront :

- les extensions algébriques,
- les extensions fortement normales (au sens de Kolchin [15]),
- les extensions par une intégrale première d'un feuilletage de codimension un,
- les extension fortement normales relatives en codimension un (voir définition 3.1 et [6])

Ce dernier type d'extension signifie de manière grossière que relativement à la projection sur \mathbb{C} donnée par une intégrale première, le feuilletage que l'on considère est de codimension un et qu'il admet une intégrale première dans une extension fortement normale. Nous utilisons le type d'une extension de corps différentiels introduit par Kolchin ([15]) à partir d'un analogue différentiel du polynôme de Hilbert pour mesurer la taille du groupoïde de Galois d'un feuilletage réductible. Nous montrons que les feuilletages réductibles de codimension deux ont un groupoïde de Galois "petit" (*i.e* de type linéaire) et que le groupoïde de Galois de P_1 est plus "gros" (*i.e* de type quadratique).

0.4. Remerciements. Ce travail a été effectué pendant un séjour post-doctoral à l'Université de Tokyo, je remercie particulièrement Kazuo Okamoto et Hitedaka Sakai pour leur accueil. Je remercie également Hiroshi Umemura pour son invitation à Nagoya, son enthousiasme et son intérêt pour ce travail.

1. LE GROUPOÏDE DE GALOIS D'UN FEUILLETAGE ALGÈBRE

La notion de \mathcal{D} -groupoïde de Lie introduite par B. Malgrange dans [18] formalise l'idée de pseudo-groupe de Lie singulier. Ces objets, sous certaines conditions de régularité, ont été étudiés par divers auteurs [16, 12, 13, 29] à la suite de S. Lie et É. Cartan.

Dans cette partie, nous rappelons les résultats élémentaires sur les \mathcal{D} -groupoïdes de Lie. Pour les détails nous renvoyons à B. Malgrange [18] et à J-F. Pommaret [27].

1.1. Espaces de jets et \mathcal{D} -variétés. Soit X une variété algébrique lisse sur \mathbb{C} et $Z \rightarrow X$ une variété algébrique sur X . Nous noterons $J_q(Z/X)$ l'espace des jets d'ordre q de sections de Z sur X . Ces espaces sont des espaces affines au-dessus de Z . Rappelons brièvement comment on les construit.

Commençons par construire $J_q(X \times \mathbb{C}^N/X)$ où X est affine de dimension n telle qu'il existe un revêtement d'un ouvert de \mathbb{C}^n par X non ramifié. Nous noterons x_1, \dots, x_n des coordonnées sur \mathbb{C}^n et celles induites sur X et y_1, \dots, y_N celles de \mathbb{C}^N . L'espace $J_q(X \times \mathbb{C}^N/X)$ est alors défini comme l'espace $X \times \mathbb{C}^N$ muni du faisceau d'anneaux

$$\mathcal{O}_{J_q(X \times \mathbb{C}^N/X)} = \mathcal{O}_{X \times \mathbb{C}^N}[y_i^\alpha], \quad 1 \leq i \leq N, \quad \alpha \in \mathbb{N}^n, \quad 1 \leq |\alpha| = \alpha_1 + \dots + \alpha_n \leq q.$$

Ces espaces de jets sont munis de dérivations D_i de $\mathcal{O}_{J_q(X \times \mathbb{C}^N/X)}$ dans $\mathcal{O}_{J_{q+1}(X \times \mathbb{C}^N/X)}$ définies par

$$D_j(x_i) = \delta_{ij}, \quad D_j y_i^\alpha = y_i^{\alpha + \epsilon_j},$$

ϵ_j étant le multi-indice de poids 1 dont la seule composante non nulle est la j -ième.

Soit Z une variété affine au-dessus de X (plongée dans $X \times \mathbb{C}^N$) décrite par un idéal I . L'espace des jets $J_q(Z/X)$ est le sous-espace de $J_q(X \times \mathbb{C}^N/X)$ défini au-dessus de Z par

l'idéal $\sum_{|\alpha| \leq q} D^\alpha I$. Nous noterons $\mathcal{O}_{J_q(Z/X)}$ le faisceau quotient sur Z . C'est le faisceau des équations aux dérivées partielles d'ordre q portant sur les sections de Z sur X . Ces espaces ne dépendent ni des coordonnées choisies sur X ni du plongement de Z . Lorsque X et Z ne sont pas affines, on construit les espaces de jets par recollement des constructions locales. Ces espaces sont munis de projections naturelles

$$\pi_q^{q+s} : J_{q+s}(Z/X) \rightarrow J_q(Z/X).$$

Lorsque Z est le fibré trivial $X \times Y$, nous noterons $J_q(X \rightarrow Y)$ l'espace des jets de sections de $X \times Y$ sur X .

Remarque 1.1. *La construction usuelle des espaces de jets donne des variétés algébriques $J_q(Z/X)$ munies de leurs faisceaux structuraux $\mathcal{O}_{J_q(Z/X)}$. Ici suivant [18], nous considérons l'espace Z annelé par l'image directe du faisceau $\mathcal{O}_{J_q(Z/X)}$.*

Lemme 1.2. *Les constructions des espaces de jets et du tangent relatif (ou "vertical") commutent i.e. il existe un isomorphisme canonique*

$$T(J_q(Z/X))_{/X} \simeq J_q((TZ/X)_{/X})$$

Preuve. – Cette formule n'est qu'une version de la commutativité des dérivations partielles. Vérifions la lorsque Z est affine au-dessus de X . La construction du tangent relatif se fait de la manière suivante. On plonge Z dans $X \times \mathbb{C}^N$ et on note I l'idéal définissant l'image de Z . Soient z_1, \dots, z_N des coordonnées sur \mathbb{C}^N , le tangent relatif de $X \times \mathbb{C}^N$ est l'espace vectoriel trivial sur cet espace : $(X \times \mathbb{C}^N) \times \mathbb{C}^N$ avec les coordonnées dz_1, \dots, dz_N sur les fibres. Pour $f \in \mathcal{O}_X[z_1, \dots, z_N]$ on notera df la fonction $\sum \frac{\partial f}{\partial z_i} dz_i$. Le tangent relatif de Z sur X est l'espace vectoriel sur Z défini par l'idéal $I + dI$.

Lorsque X est un revêtement non ramifié d'un ouvert de \mathbb{C}^n , l'espace $J_q((TZ/X)_{/X})$ est défini par les équations suivantes :

$$D_j df = \sum_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial z_i} dz_i + \sum_{i,k} \frac{\partial^2 f}{\partial z_k \partial z_i} z_k^{\epsilon_j} dz_i + \sum_i \frac{\partial f}{\partial z_i} (dz_i)^{\epsilon_j}$$

pour toutes les équations $f \in I$. D'un autre côté, l'espace $T(J_q(Z/X))_{/X}$ est définie par les équations :

$$dD_j f = \sum_i \frac{\partial^2 f}{\partial x_j \partial z_i} dz_i + \sum_{i,k} \frac{\partial^2 f}{\partial z_k \partial z_i} z_k^{\epsilon_j} dz_i + \sum_i \frac{\partial f}{\partial z_i} d(z_i^{\epsilon_j}).$$

L'isomorphisme pour $q = 1$ est donné par $(dz_i)^{\epsilon_j} = d(z_i^{\epsilon_j})$. Des formules analogues donnent les isomorphismes pour $q > 1$. \square

Définition 1.3. *Soit Y_q une sous-variété de $J_q(Z/X)$ donnée par un idéal I_q . Le prolongement d'ordre 1 de Y_q est la sous-variété de $J_{q+1}(Z/X)$ définie par l'idéal $I_q + \sum D_i I_q$. Cette variété sera notée $pr_1 Y_q$ et son idéal $pr_1 I_q$. On définit par itération les prolongements d'ordre k , $pr_k I_q$.*

Remarque 1.4. *On n'a pas forcément $\pi_q^{q+s} pr_s I_q \neq I_q$.*

On définit l'espace des jets (d'ordre infini) de sections de Z sur X comme la pro-variété affine sur Z

$$J(Z/X) = \varprojlim J_q(Z/X),$$

c'est-à-dire Z annelée par $\mathcal{O}_{J(Z/X)} = \varinjlim \mathcal{O}_{J_q(Z/X)}$. Ces anneaux sont filtrés par l'ordre des équations et muni d'une connexion

$$D : \mathcal{O}_{J(Z/X)} \rightarrow \mathcal{O}_{J(Z/X)} \otimes_{\mathcal{O}_X} \Omega_X^1$$

définie en coordonnées locales par $Df = \sum D_i f \otimes dx_i$.

On a alors la définition suivante de “systèmes d’équations différentielles portant sur les sections de Z sur X ” appelés par la suite \mathcal{D} -sous-variétés de $J(Z/X)$ ou plus brièvement \mathcal{D} -variétés.

Définition 1.5. Une \mathcal{D} -(sous)-variété de $J(Z/X)$ est une sous-variété \mathcal{Y} définie par un faisceau d’idéaux \mathcal{I} de $\mathcal{O}_{J(Z/X)}$ tel que :

- (1) \mathcal{I} est pseudo-cohérent, i.e. les idéaux $\mathcal{I}_q = \mathcal{I} \cap \mathcal{O}_{J_q(Z/X)}$ sont cohérents,
- (2) \mathcal{I} est différentiel, i.e. $D\mathcal{I} \subset \mathcal{I}\Omega_X^1$.

Le faisceau d’anneaux de \mathcal{Y} , $\mathcal{O}_{\mathcal{Y}} = \mathcal{O}_{J^*(Z/X)}/\mathcal{I}$ est donc muni d’une connexion induite $D : \mathcal{O}_{\mathcal{Y}} \rightarrow \mathcal{O}_{\mathcal{Y}} \otimes_{\mathcal{O}_X} \Omega_X^1$. On pourra définir les \mathcal{D} -variétés générales : on recollera des espaces définis comme ci-dessus en respectant les connexions. Nous n’en aurons pas besoin.

Une solution (resp. formelle) de \mathcal{Y} en un point $x \in X$ est un morphisme f de $\mathcal{O}_{\mathcal{Y}}$ dans $\mathcal{O}_{X,x}^{an}$ (resp. $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$) au-dessus de la restriction $\mathcal{O}_X \rightarrow \mathcal{O}_{X,x}^{an}$ (resp. $\widehat{\mathcal{O}}_{X,x}$) et différentiel i.e. $d \circ f = f \circ D$. Les solutions correspondent aux sections de Z vérifiant les équations différentielles définissant \mathcal{Y} .

Pour finir, rappelons les résultats suivants sur les \mathcal{D} -variétés.

Lemme 1.6 (Ritt [28]). Si \mathcal{I} est un idéal différentiel alors son radical \mathcal{I}^{red} est aussi différentiel.

Lemme 1.7 ([18]). Si \mathcal{Y} est une \mathcal{D} -variété réduite, $\mathcal{O}_{\mathcal{Y}}$ est sans torsion sur \mathcal{O}_X .

Théorème 1.8 (Ritt-Raudenbush [28]). Soit \mathcal{Y} une \mathcal{D} -variété réduite définie par \mathcal{I} et $\mathcal{I}_q = \mathcal{I} \cap \mathcal{O}_{J_q^*(Z/X)}$ l’idéal des équations d’ordre q . Il existe un entier q tel que \mathcal{I} soit l’idéal différentiel réduit engendré par \mathcal{I}_q .

Théorème 1.9 ([28]). Soit \mathcal{Y} une \mathcal{D} -variété réduite définie par \mathcal{I} et \mathcal{Y}_q l’espace défini par $\mathcal{I}_q = \mathcal{I} \cap \mathcal{O}_{J_q^*(Z/X)}$. Il existe un entier q et une hypersurface $S \subset \mathcal{Y}_q$ tels que par chaque points de $\mathcal{Y}_q - S$ passe une solution convergente.

Ces théorèmes ont été généralisés par B. Malgrange dans la situation mixte d’une variété analytique Z sur X analytique lisse et \mathcal{Y} définie par des équations aux dérivées partielles polynomiales en les dérivées. Dans cette situation, B. Malgrange montre un résultat *a priori* plus fort que celui de Ritt que nous rappelons ici dans le cas “tout algébrique”.

Théorème 1.10 (d’involutivité générique [27, 19]). Soit \mathcal{Y} une \mathcal{D} -variété réduite définie par \mathcal{I} et \mathcal{Y}_q l’espace défini par $\mathcal{I}_q = \mathcal{I} \cap \mathcal{O}_{J_q^*(Z/X)}$. Il existe un entier q et une hypersurface $S \subset \mathcal{Y}_q$ tels que \mathcal{Y}_q soit involutif en dehors de S .

L’involutivité est une condition de régularité d’un système d’équation aux dérivées partielles sous laquelle on a un théorème d’existence de solutions convergentes : le théorème de Cartan-Kähler. Nous ne rappellerons pas cette condition et renvoyons aux références du théorème.

1.2. \mathcal{D} -groupoïdes de Lie algébriques et \mathcal{D} -algèbres de Lie.

1.2.1. *\mathcal{D} -groupoïdes de Lie algébriques.* Nous allons maintenant rappeler la définition de \mathcal{D} -groupoïde de Lie algébrique sur une variété algébrique lisse X sur \mathbb{C} . L’espace $J_q(X \rightarrow X)$ et son ouvert $J_q^*(X \rightarrow X)$ des jets inversibles (défini par $\det(y_i^{\epsilon_j}) \neq 0$) seront notés J_q et J_q^* lorsqu’aucune confusion ne pourra être faite sur X .

Ces espaces sont naturellement munis de deux projections sur X , la *source* s et le *but* t , correspondant aux projections de $X \times X$ sur le premier et le deuxième facteur, d’une *composition* partielle associative

$$c : (J_q, t) \times_X (J_q, s) \rightarrow J_q$$

induite par la composition des applications formelles de X dans elle-même et d'une application *identité*

$$e : X \rightarrow J_q$$

donnée par les jets d'ordre q de l'identité. L'espace des jets inversibles est de plus muni d'une *inversion*

$$i : J_q^* \rightarrow J_q^*$$

induite par l'inversion des difféomorphismes formels de X . Ces applications font de J_q^* un groupoïde agissant sur X . Elles sont compatibles aux projections naturelles π_q^{q+s} et donne une structure de groupoïde sur $J^* = \varprojlim J_q$, c'est-à-dire sur $X \times X$ muni de l'anneau $\mathcal{O}_{J^*} = \varinjlim \mathcal{O}_{J_q^*}$.

Définition 1.11. *Un sous-groupoïde de J_q^* est une sous-variété Y_q donnée par un faisceau cohérent d'idéaux I_q satisfaisant :*

- (1) $I_q \subset \ker e^*$,
- (2) $i^* I_q \subset I_q$,
- (3) $c^* I_q \subset \pi_1^* I_q + \pi_2^* I_q$,

π désignant les projections de $(J_q, t) \times_X (J_q, s)$ sur J_q .

On a la version algébrique d'un résultat classique de géométrie différentielle.

Proposition 1.12 ([18]). *Si Y_q un sous-groupoïde de J_q^* alors $pr_1 Y_q$ est un sous-groupoïde de J_{q+1}^* .*

Remarque 1.13. *Soient Y_q un sous-groupoïde définie par I_q et \mathcal{Y} la \mathcal{D} -variété définie par $\mathcal{I} = \cup pr_s I_q$. Notons \mathcal{Y}_q la sous-variété définie par $\mathcal{I} \cap \mathcal{O}_{J_q^*}$. A priori \mathcal{Y}_q n'est pas un sous-groupoïde de $J_q^*(X \rightarrow X)$ mais seulement en dehors d'une sous-variété S i.e. \mathcal{Y}_q est un sous-groupoïde de $J_q^*(X - S \rightarrow X - S)$*

Cette remarque montre que la définition naturelle suivante : “une \mathcal{D} -variété \mathcal{Y} est un sous-groupoïde de J^* si il existe k tel que pour tout $q \geq k$ \mathcal{Y}_q est un sous-groupoïde de J_q^* ” est très restrictive. De plus certains pseudo-groupes de transformations, comme les pseudo-groupes d'invariances de fonctions rationnelles, ne rentrent dans le cadre de cette définition qu'en dehors d'une sous-variété fermée de codimension au moins un (dans le cas précédent : le lieu d'indétermination).

Définition 1.14. *Soit S une hypersurface de X . Un sous-groupoïde de $J_q^*(X \rightarrow X)$ à singularités sur S est une sous-variété fermée donnée par un faisceau cohérent d'idéaux I_q telle que la trace de la variété sur $J_q^*(X - S \rightarrow X - S)$ décrive un sous-groupoïde.*

Définition 1.15. *Un \mathcal{D} -groupoïde de Lie sur X est une \mathcal{D} -variété réduite \mathcal{Y} de J^* donnée par un idéal \mathcal{I} vérifiant : il existe une hypersurface S de X et un entier k tels que pour tout $q \geq k$, \mathcal{Y}_q est un sous-groupoïde de J_q^* à singularités sur S .*

Remarque 1.16. *Dans les conditions de la définition précédente, pour tout entier q , \mathcal{Y}_q est un sous-groupoïde singulier. En effet fixons un entier q_0 tel que \mathcal{Y}_{q_0} soit un groupoïde singulier sur S et prenons $q < q_0$. Par définition $\pi_q^{q_0}$ est dominant donc surjectif en dehors d'un ensemble algébrique S' de \mathcal{Y}_q , on a donc*

$$c(\mathcal{Y}_q - (S' \cup \pi_1^{-1} S \cup \pi_2^{-1} S) \times_X \mathcal{Y}_q - (S' \cup \pi_1^{-1} S \cup \pi_2^{-1} S)) \subset \pi_q^{q_0} \mathcal{Y}_{q_0} \subset \mathcal{Y}_q.$$

Des arguments classiques (voir par exemple la preuve du lemme 4.3.3 de [18]) montrent alors que \mathcal{Y}_q est un groupoïde à singularités sur une variété S'' contenant S .

Nous allons rappeler quelques résultats sur l'action d'un \mathcal{D} -groupoïde de Lie \mathcal{Y} sur J^* par composition au but. Nous noterons $c_{\mathcal{Y}}$ la restriction de c sur $(J^*, t) \times_X (\mathcal{Y}, s)$ à valeurs dans J^* .

Définition 1.17. *Un invariant différentiel d'ordre q pour \mathcal{Y} est une fonction rationnelle F sur J_q^* telle que $F \circ c\mathcal{Y} = F \circ \pi$ (π désignant la première projection de $J_q^* \times_X \mathcal{Y}_q$ sur J_q^*).*

Remarque 1.18. *N'importe quelle fonction sur X que l'on remonte sur J_q^* par la projection source est un invariant.*

On dira qu'un ensemble d'invariants différentiels $\{F_i\}_{1 \leq i \leq p}$ définis sur un ouvert de Zariski U forment un système complet d'invariants pour \mathcal{Y} si \mathcal{Y} est la \mathcal{D} -variété réduite définie par l'adhérence de Zariski de la \mathcal{D} -variété définie par les équations $F_i - F_i \circ e \circ s$ au-dessus de U .

Le théorème suivant est prouvé d'une manière analogue au théorème de Chevalley-Kolchin dans ([27], 467–469 proposition 2.36 du chapitre 3). Il résulte aussi de l'existence d'un quotient générique pour une relation d'équivalence ([11], théorème 8.1).

Théorème 1.19 ([27, 11]). *Si \mathcal{Y} un \mathcal{D} -groupeïde de Lie agissant sur un variété X alors il admet un système complet d'invariants différentiels.*

Dans le contexte de cet article, le théorème 8.1 de [11] s'applique comme suit. On se place sur J_q^* (q assez grand pour que \mathcal{Y}_q satisfasse aux hypothèses du théorème de Ritt-Raudenbush) et on considère la relation d'équivalence $\alpha \sim \beta$ si $s(\alpha) = s(\beta)$ et $\beta \circ \alpha^{-1} \in \mathcal{Y}_q$. Le résultat précédent donne l'existence d'un ouvert de Zariski $U \subset J^*$ et d'une variété quotient de U par la relation d'équivalence. En tirant en arrière des fonctions rationnelles du quotient, on obtient un système complet d'invariants différentiels.

1.2.2. *\mathcal{D} -algèbres de Lie.* Une \mathcal{D} -algèbre de Lie sur X est un faisceau d'algèbres de Lie de champs de vecteurs défini par un système d'équations aux dérivées partielles. La définition que nous allons rappeler met l'accent sur les équations définissant l'algèbre.

Un espace vectoriel V sur X est défini de la manière suivante. Lorsque X est affine, un espace vectoriel est un sous-espace d'un espace vectoriel trivial $X \times \mathbb{C}^n$ défini par des équations linéaires sur les fibres. Lorsque X n'est pas affine, on demande que V soit localement de la forme précédente et que les recollements soient linéaires sur les fibres. Cette définition autorise les fibres à changer de dimension.

Les espaces $J_q(TX/X)$ sont des espaces vectoriels sur X . Nous allons construire un crochet sur les sections de ces espaces généralisant le crochet de Lie des sections de TX . Ce crochet est le crochet de Spencer et la construction que nous allons donner est celle de [18].

Nous noterons $R_q(X)$ (ou juste R_q) l'espace des repères d'ordre q sur X qui s'identifie au sous-espace de J_q^* défini en fixant une valeur à l'application source. Cet espace est un fibré principal sur X de groupe structural le groupe des jets d'ordre q de biholomorphismes de $(\mathbb{C}^n, 0)$ noté Γ_q^n . L'application $\lambda : R_q \times R_q \rightarrow J_q^*$ qui à deux repères r_q et s_q associe le jet $s_q \circ r_q^{-1}$ s'identifie au quotient sous l'action diagonale de Γ_q^n sur les deux facteurs. Cette application induit une application du tangent relatif $T(R_q \times R_q)_{/R_q}|_{diag}$ le long de la diagonale sur le tangent vertical $T(J_q^*)_{/X}|_{id}$ le long de l'identité. Le lemme 1.2 identifie ce dernier espace vectoriel à $J_q(TX/X)$ et permet de projeter le crochet de Lie de TR_q sur un crochet sur les sections de $J_q(TX/X)$. C'est le crochet de Spencer.

Définitions 1.20. *Une sous-algèbre de Lie de $J_q(TX/X)$ est un sous-espace vectoriel dont les sections analytiques locales sont stables sous le crochet de Spencer.*

Un \mathcal{D} -(sous)-espace vectoriel \mathcal{L} de $J_q(TX/X)$ est une \mathcal{D} -variété définie par des équations linéaires.

Une \mathcal{D} -(sous)-algèbre de Lie \mathcal{L} de $J_q(TX/X)$ est un \mathcal{D} -espace vectoriel tel que les espaces \mathcal{L}_q soient des sous-algèbres de Lie de $J_q(TX/X)$.

On construit une algèbre de Lie LY_q à partir d'un groupoïde de Lie singulier Y_q en considérant le tangent relatif à la projection source $TY_{q/X}|_{id}$ ou son image dans $J_q(TX/X)$ (par le lemme 1.2). La stabilité des sections du linéarisé sous le crochet de Spencer est une conséquence de la stabilité de la variété Y_q sous la composition. Nous renvoyons à [18] pour les détails ainsi que pour la preuve de la proposition suivante.

Proposition 1.21 ([18]). *Si \mathcal{Y} est un \mathcal{D} -groupoïde de Lie, son tangent vertical le long de l'identité $T\mathcal{Y}_{/X}|_{id} \subset J(TX/X)$ est une \mathcal{D} -algèbre de Lie. Elle sera notée $L\mathcal{Y}$.*

1.2.3. *Le groupoïde de Galois d'un feuilletage.*

Définition 1.22. *Un feuilletage (singulier) de X est une \mathcal{D} -algèbre de Lie \mathcal{F} sans torsion sur X et différentiellement engendré par \mathcal{F}_0 .*

Remarque 1.23. *Une \mathcal{D} -algèbre de Lie n'est pas toujours la \mathcal{D} -algèbre de Lie d'un \mathcal{D} -groupoïde de Lie. Prenons par exemple un feuilletage \mathcal{F} de codimension d . D'après le théorème 1.19, si il existe un \mathcal{D} -groupoïde de Lie dont \mathcal{F} est la \mathcal{D} -algèbre de Lie alors le feuilletage admet d intégrales premières rationnelles indépendantes.*

Un feuilletage sans intégrales premières rationnelles est donc un exemple de \mathcal{D} -algèbre de Lie ne provenant pas d'un \mathcal{D} -groupoïde de Lie.

La définition suivante généralise le groupe de Galois différentiel d'une équation linéaire.

Définition 1.24 ([18]). *Soit \mathcal{F} un feuilletage sur X . Le groupoïde de Galois de \mathcal{F} est le plus petit \mathcal{D} -groupoïde de Lie dont la \mathcal{D} -algèbre de Lie contient le feuilletage. Il sera noté $Gal(\mathcal{F})$.*

Autrement dit $Gal(\mathcal{F})$ est le plus petit \mathcal{D} -groupoïde de Lie contenant le pseudo-groupe $Tan(\mathcal{F})$. Par commodité, nous posons la définition suivante.

Définition 1.25. *Soit \mathcal{F} un feuilletage sur X . Un \mathcal{D} -groupoïde de Lie préservant le feuilletage dont la \mathcal{D} -algèbre de Lie contient le feuilletage sera dit admissible pour \mathcal{F} .*

1.3. Forme de Maurer-Cartan d'un \mathcal{D} -groupoïde de Lie et suites de Godbillon-Vey d'un feuilletage. La forme de Maurer-Cartan d'un groupoïde de Lie est une 1-forme sur le groupoïde invariant sous l'action du groupoïde sur lui-même par composition au but. Pour un \mathcal{D} -groupoïde de Lie, la formes de Maurer-Cartan proviennent de la restriction de celle de J^* .

1.3.1. *Forme de Maurer-Cartan de J^* .* L'espace J_q^* n'agit pas sur son espace tangent et la construction de la forme invariante ne peut se faire qu'en considérant l'action de J_{q+1}^* sur le tangent de J_q^* .

Plus précisément, la structure de groupoïde de J_q^* donnée par la composition

$$c : (J_q^*, t) \times_X (J_q^*, s) \rightarrow J_q^*.$$

se prolonge en une structure de groupoïde sur l'espace $J_1^*(J_{q/source}^*)$ des jets de sections de la projection *source* se projetant sur les sections de $J_1^*(X \times X_{source})$. Ce groupoïde agit naturellement sur $TJ_{q/source}^*$. Cette action se comprend plus facilement en utilisant la présentation suivante. Soit φ une section analytique locale de $J_{q/source}^*$ sur un ouvert U dont la composante d'ordre 0, φ_0 est inversible. Par les formules de composition, elle induit un difféomorphisme de l'ouvert de J_q^* des jets de buts dans U sur l'ouvert des jets de but dans $\varphi_0(U)$. Le difféomorphisme induit sur le tangent de J_q^* ne dépend que du premier jet de la section et donne l'action.

Nous noterons Tc cette action :

$$Tc : (TJ_{q/source}^*, t) \times_X (J_1^*(J_{q/source}^*), s) \rightarrow TJ_{q/source}^*.$$

Cette action induit une action de J_{q+1}^* sur $TJ_{q/source}^*$ par l'inclusion canonique $J_{q+1}^* \subset J_1^*(J_{q/source}^*)$ et donne un isomorphisme

$$TJ_{q/source}^*|_{id} \times_X J_{q+1}^* \rightarrow TJ_{q/source}^*.$$

Après identification de $TJ_{q/source}^*|_{id}$ avec $J_q(TX/X)$, l'image de la première projection donne une application

$$\Theta : TJ_{q/source}^* \rightarrow J_q(TX/X)$$

invariante sous J_{q+1}^* .

Définition 1.26. *Cette forme est la forme de Maurer-Cartan de J_{q+1}^* .*

Les formes construites ainsi étant compatibles aux projections π_q^{q+k} , la forme induite sur J^ sera appelée forme de Maurer-Cartan de J^* .*

Remarque 1.27. *Fixons un point $x_0 \in X$ et identifions la sous-variété des jets de source x_0 avec l'espace des repères, $R_q(X)$ ainsi que $J_q(TX/X)|_{x_0}$ avec $J_q(\chi(\mathbb{C}^n, 0))$ l'espace des jets d'ordre q de champs de vecteurs en 0. On obtient alors une forme sur $R_q(X)$ à valeurs dans $J_q(\chi(\mathbb{C}^n, 0))$ invariante sous l'action de J_{q+1}^* . Nous noterons*

$$\Theta|_{x_0} : TR_q(X) \rightarrow J_q(\chi(\mathbb{C}^n, 0))$$

cette forme.

Il existe un second crochet sur $J_q(TX/X)$ différent du crochet de Spencer. Il est à valeurs dans $J_{q-1}(TX/X)$. C'est le crochet fibre à fibre. Il est défini en coordonnées locales par les formules

$$\{u, v\} = j_{q-1}[\tilde{u}, \tilde{v}]$$

où u et v sont des jets en un point $x \in X$, \tilde{u} et \tilde{v} sont des champs formels en x les prolongeant, $[\ , \]$ est le crochet de Lie et j_{q-1} est la prise du jet d'ordre $q-1$.

La forme de Maurer-Cartan vérifie des équations de structure reliant la différentielle relative à la projection *source* et le crochet fibre à fibre sur $J_q(TX/X)$:

$$d_{/s}\pi_{q-1}^q \Theta = -\frac{1}{2}\{\Theta, \Theta\},$$

où π_{q-1}^q est la projection de $J_q(TX/X)$ sur $J_{q-1}(TX/X)$. Nous renvoyons à [13, 29] pour plus de détails.

Ces équations se restreignent aux espaces de jets de source fixée. En choisissant une base de l'espace vectoriel des jets d'ordre q de champs de vecteurs en x_0 et en écrivant $\Theta|_{x_0}$ en coordonnées, on obtient une famille de 1-formes invariantes sur $R_q(X)$. En choisissant la base monomiale $\frac{x^\alpha}{\alpha!} \frac{\partial}{\partial x_i}$, on obtient une suite de formes θ_i^α satisfaisant les identités différentielles :

$$d\theta_i^\alpha = \sum_j \theta_j^0 \wedge \theta_i^{\alpha+\epsilon_j} + \sum_{j, |\beta| \geq 1} \binom{\alpha}{\beta} \theta_j^\beta \wedge \theta_i^{\alpha-\beta+\epsilon_j}$$

pour $|\alpha| \leq q-1$ et $\binom{\alpha}{\beta} = \prod \binom{\alpha_i}{\beta_i}$ si $\alpha_i \geq \beta_i$ et zéro sinon. Nous les appellerons formes de Cartan d'ordre q et les identités précédentes équations de structures d'ordre q .

Le groupe algébrique des jets d'ordre $q+1$ de source et but x_0 , Γ_{q+1}^n , agit sur $R_q(X)$ par composition à la source. La composition au but commutant avec la composition à la source, Γ_{q+1}^n transforme des formes invariantes en des formes invariantes satisfaisant les mêmes identités différentielles. Soit φ un élément de Γ_{q+1}^n , notons s_φ l'action par composition à la source sur $R_q(X)$ et φ^* celle sur $J_q(\chi(\mathbb{C}^n, 0))$. On a la formule suivante :

$$s_\varphi^* \Theta|_{x_0} = \varphi^* \circ \Theta|_{x_0}.$$

1.3.2. *Forme de Maurer-Cartan de \mathcal{Y} .* Considérons maintenant \mathcal{Y} un \mathcal{D} -groupeïde de Lie agissant sur X .

Définition 1.28. *La restriction de Θ sur \mathcal{Y}_{q+1} est à valeurs dans le sous-espace vectoriel $L\mathcal{Y}_q$:*

$$\Theta_{\mathcal{Y}} : T\mathcal{Y}_{q/X} \rightarrow L\mathcal{Y}_q \subset J_q(TX/X).$$

C'est la forme de Maurer-Cartan d'ordre q de \mathcal{Y} .

Dans la suite nous nous restreindrons à l'étude des \mathcal{D} -groupeïdes de Lie transitif et travaillerons dans le cadre de la définition suivante.

Définition 1.29. *Soit \mathcal{Y} un \mathcal{D} -groupeïde de Lie sur X transitif. Fixons une source x_0 régulière pour \mathcal{Y} (i.e. hors du lieu singulier donnée dans la définition 1.15) et notons $R_q(\mathcal{Y})$ l'espace des jets de \mathcal{Y} de source x_0 . On définit une forme invariante sur $R_q\mathcal{Y}$ en restreignant la forme de Maurer-Cartan :*

$$\Theta_{\mathcal{Y}}|_{x_0} : TR_q(\mathcal{Y}) \rightarrow J_q(\chi(\mathbb{C}^n, 0)).$$

Les orbites de l'action de \mathcal{Y}_{q+1} sur $R_q(X)$ sont des sous-variétés décrites par le théorème 1.19. Une orbite particulière est donnée par $R_q(\mathcal{Y})$ mais le groupe Γ_{q+1}^n agissant par composition en x_0 mélangent ces orbites. La restriction de Θ sur une orbite permet de construire un système de formes invariantes satisfaisant des équations de structures particulières.

1.3.3. *Suites de Godbillon-Vey générales.*

Définition 1.30. *Une suite de Godbillon-Vey pour un feuilletage de codimension p est une suite de 1-formes rationnelles $\{\omega_i^\alpha; i \in \{1, \dots, p\}, \alpha \in \mathbb{N}^p\}$ telles que $\{\omega_i^0; i \in \{1, \dots, p\}\}$ définissent le feuilletage et*

$$d\omega_i^\alpha = \sum_j \omega_j^0 \wedge \omega_i^{\alpha+\epsilon_j} + \sum_{j, |\beta| \geq 1} \binom{\alpha}{\beta} \omega_j^\beta \wedge \omega_i^{\alpha-\beta+\epsilon_j}$$

avec $\binom{\alpha}{\beta} = \prod \binom{\alpha_i}{\beta_i}$ si $\alpha_i \geq \beta_i$ et zéro sinon.

Proposition 1.31. *Soit \mathcal{F} un feuilletage singulier de X . Quitte à se placer sur $\tilde{X} \rightarrow X$ une variété finie au-dessus d'un ouvert de Zariski dense de X , il existe toujours une suite de Godbillon-Vey pour \mathcal{F} .*

Cette proposition est classique, nous allons en donner une preuve utilisant les constructions précédente. Nous allons d'abord construire ces formes sur le \mathcal{D} -groupeïde de Lie $Aut(\mathcal{F})$ et les descendre ensuite sur X .

Preuve. – Un feuilletage \mathcal{F} définit un \mathcal{D} -groupeïde de Lie $Aut(\mathcal{F})$: le groupeïde des transformations locales préservant le feuilletage. Pour tout entier q , $\mathcal{F}_q \subset TAut(\mathcal{F})_{q/source}|_{id}$ et l'action de $Aut(\mathcal{F})$ par composition au but permet de prolonger \mathcal{F}_q en un sous-espace vectoriel $\widetilde{\mathcal{F}}_q$ de $TAut(\mathcal{F})_{q/source}$.

Soit x_0 un point régulier de \mathcal{F} (i.e. au voisinage duquel \mathcal{F} est facteur direct). C'est aussi un point régulier de $Aut(\mathcal{F})$. Les jets solutions de $Aut(\mathcal{F})_q$ de sources x_0 forment une sous-variété de $R_q(X)$ noté $R_q(\mathcal{F})$

Définition 1.32. *Les formes sur $R_q(\mathcal{F})$ s'annulant sur $\widetilde{\mathcal{F}}_q$ seront dites transverses à \mathcal{F} .*

On construit une forme transverse de la manière suivante. Soit $N_{\mathcal{F}}$ la \mathcal{D} -algèbre de Lie de $Aut(\mathcal{F})$ et soit $\pi : N_{\mathcal{F}}|_{x_0} \rightarrow V_q$ le quotient par $\mathcal{F}_q|_{x_0}$.

Définition 1.33. *La projection,*

$$\pi \circ \Theta_{Aut(\mathcal{F})}|_{x_0} : TR_q(\mathcal{F}) \rightarrow V$$

est une forme transverse au feuilletage. Elle sera notée $\Theta_{\mathcal{F}}$

Le crochet sur la fibre de $N_{\mathcal{F}}$ en x_0 induit un crochet sur V . La forme transverse vérifie les équations de structure induites :

$$d\Theta_{\mathcal{F}} = -\frac{1}{2} \{\Theta_{\mathcal{F}}, \Theta_{\mathcal{F}}\}.$$

Soit p la codimension du feuilletage. L'espace vectoriel V_q s'identifie à $J_q(\chi(\mathbb{C}^p, 0))$. En écrivant $\Theta_{\mathcal{F}}|_{x_0}$ dans la base monomiale $\frac{x^\alpha}{\alpha!} \frac{\partial}{\partial x_i}$ sur $J_q(\chi(\mathbb{C}^p, 0))$, on obtient une suite de 1-formes invariantes transverse à $\mathcal{F} : \theta_i^\alpha, 1 \leq i \leq p, \alpha \in \mathbb{N}^p$, satisfaisant les équations de structures d'ordre q en dimension p .

Soit $\tilde{X} \rightarrow X$ une variété au-dessus d'un ouvert de Zariski dense de X tel qu'il existe une section $f : \tilde{X} \rightarrow \tilde{X} \times_X R_q(\mathcal{F})$ de la projection *but*. Les formes θ_i^0 s'annulent sur $\tilde{\mathcal{F}}_0$. Par construction ce feuilletage sur $R_0(\mathcal{F}) = X$ est \mathcal{F} . La suite $\{\omega_i^\alpha = f^* \theta_i^\alpha\}$ est une suite de Godbillon-Vey pour \mathcal{F} . \square

1.3.4. Suites de Godbillon-Vey spéciales.

Définition 1.34. Soient \mathcal{Y} un \mathcal{D} -groupeïde de Lie transitif admissible pour un feuilletage \mathcal{F} et $\tilde{X} \rightarrow X$ une variété au-dessus d'un ouvert de Zariski dense de X tel qu'il existe une section $f : \tilde{X} \rightarrow \tilde{X} \times_X R_q(\mathcal{Y})$ de la projection *but*. Les formes $\omega_i^\alpha = f^* \theta_i^\alpha$ seront appelé suite de Godbillon-Vey spécial associée à \mathcal{Y}

Dans le cas trivial $\mathcal{Y} = \text{Aut}(\mathcal{F})$, nous avons appelé la suite de Godbillon-Vey obtenue est générale. Lorsque $\mathcal{Y} = \text{Gal}(\mathcal{F})$, nous dirons qu'elle est minimale. Les cas intermédiaires sont dits spéciaux. Dans la suite de cet article, nous regarderons particulièrement le cas $X = \mathbb{C}^3$. On peut toujours choisir une section à coefficients algébriques de la projection *but* et construire ainsi une suite de formes à coefficients algébriques sur \mathbb{C}^3 .

L'objet de cet article est l'étude d'un feuilletage de codimension deux. La classification locale des pseudogroupes de Lie réguliers agissant sur \mathbb{C}^2 a été donnée par S. Lie [17]. Dans [3], É. Cartan donne une preuve de la classification de S. Lie en utilisant ces équations de structures. Appliquée à la détermination des équations de structures possibles pour les formes à valeurs dans $J_q(\chi(\mathbb{C}^2, 0))$, la preuve de Cartan permet d'obtenir le résultat suivant.

Théorème 1.35. Soit \mathcal{F} un feuilletage de \mathbb{C}^n de codimension deux, défini par une 2-forme fermée γ . Le \mathcal{D} -groupeïde de Lie $\text{Inv}(\gamma)$ d'invariance de cette forme est un \mathcal{D} -groupeïde de Lie admissible pour \mathcal{F} . Si le groupeïde de Galois de \mathcal{F} n'est pas $\text{Inv}(\gamma)$ alors on est dans un des cas suivant :

- $\text{Gal}(\mathcal{F})$ est intransitif : \mathcal{F} admet une intégrale première rationnelle,
- $\text{Gal}(\mathcal{F})$ est imprimitif en codimension un : il existe une 1-forme à coefficients algébriques intégrable s'annulant sur \mathcal{F} ,
- $\text{Gal}(\mathcal{F})$ est transversalement affine : il existe un vecteur de 1-formes à coefficients algébriques $\Omega^0 = \begin{pmatrix} \omega_1^0 \\ \omega_2^0 \end{pmatrix}$ définissant le feuilletage et une matrice de 1-formes à coefficients algébriques Ω^1 de trace nulle telle que :

$$d\Omega^0 = \Omega^1 \wedge \Omega^0 \quad \text{et} \quad d\Omega^1 = \Omega^1 \wedge \Omega^1.$$

Une telle suite sera appelée suite de Godbillon-Vey de type asl_2 ou encore asl_2 -suite.

Nous donnons en annexe la preuve de Cartan de ce théorème.

2. LE GROUPOÏDE DE GALOIS DE P_1

Le feuilletage associé à la première équation de Painlevé, $\frac{d^2 y}{dx^2} = 6y^2 + x$, est donnée par le champ de vecteurs

$$X_1 = \frac{\partial}{\partial x} + y' \frac{\partial}{\partial y} + (6y^2 + x) \frac{\partial}{\partial y'}$$

sur \mathbb{C}^3 avec les coordonnées (x, y, y') .

Ce champ de vecteurs étant de divergence nulle, le feuilletage est défini par la 2-forme fermée $\gamma = i_{X_1} dx \wedge dy \wedge dy'$.

Théorème 2.1. *Le groupoïde de Galois de P_1 est le \mathcal{D} -groupoïde de Lie $\text{Inv}(\gamma)$ laissant la forme γ invariante.*

On considèrera le champ X_1 dans la famille triviale

$$X_\alpha = \frac{\partial}{\partial x} + y' \frac{\partial}{\partial y} + (6y^2 + \alpha^5 x) \frac{\partial}{\partial y'}, \quad \alpha \neq 0.$$

Ce champ est de poids -1 sous l'action de

$$\Sigma = x \frac{\partial}{\partial x} - 2y \frac{\partial}{\partial y} - 3y' \frac{\partial}{\partial y'} - \alpha \frac{\partial}{\partial \alpha}$$

c'est-à-dire que $[\Sigma, X_\alpha] = -X_\alpha$. Le flot de Σ donne une équivalence orbitale entre les différents champs X_α tant que $\alpha \neq 0$. Lorsque $\alpha = 0$, la première équation de Painlevé dégénère sur une équation particulièrement simple.

L'organisation des calculs se fera suivant les idées de J. Drach [8]. Soit π_α la projection algébrique de $\mathbb{C}^3 \times \mathbb{C}_\alpha$ sur \mathbb{C}^3 donnée par le flot de Σ :

$$\pi_\alpha(x, y, y', \alpha) = (\alpha x, \frac{y}{\alpha^2}, \frac{y'}{\alpha^3}, 1).$$

Supposons qu'un des trois systèmes d'équations aux dérivées partielles donné par le théorème 1.35 admette une solution algébrique. En considérant leurs images inverses par π_α et en développant les équations et la solution en puissances de α , on obtient une suite de systèmes plus simples ayant encore des solutions algébriques. Ces équations sont de la forme $X_0 R = *$. On les étudiera dans les coordonnées adaptées $x, y, u = y'^2 - 4y^3$.

Nous noterons $p_\Sigma(\cdot)$ le poids d'une fonction ou d'une forme homogène sous Σ et $\text{deg}_{a,b,\dots}$ les degrés par rapport aux variables a, b, \dots ayant chacune le degré 1.

Un polynôme $P(x, y, y')$ se prolonge en une fraction de poids nul sur $\mathbb{C}^3 \times \mathbb{C}_\alpha$ par

$$\pi_\alpha^* P = P(\alpha x, \frac{y}{\alpha^2}, \frac{y'}{\alpha^3}) \in \mathbb{C}(x, y, y', \alpha)$$

et en un polynôme en x, y, y' et α homogène pour Σ en multipliant par une puissance convenable de α . Nous prolongerons les formes de \mathbb{C}^3 , $a dx + b dy + c dy'$, à $\mathbb{C}^3 \times \mathbb{C}_\alpha$ par $(\pi_\alpha^* a) \alpha dx + (\pi_\alpha^* b) \frac{dy}{\alpha^2} + (\pi_\alpha^* c) \frac{dy'}{\alpha^3}$. Une forme intégrable ne se prolongera pas en une forme intégrable mais seulement intégrable modulo $d\alpha$.

Le feuilletage donné par le champ X_1 est défini par les deux 1-formes

$$\omega_1^0 = y' dy' - (6y^2 + x) dy, \quad \omega_2^0 = \frac{dy}{y'} - dx.$$

Nous noterons $\omega_1^0|_\alpha = y' dy' - (6y^2 + \alpha^5 x) dy$ et $\omega_2^0|_\alpha = \frac{dy}{y'} - dx$ leurs prolongements au paramètre α et $\omega_1^0|_0, \omega_2^0|_0$ les restrictions à $\{\alpha = 0\}$. Ces formes forment les vecteurs $\Omega^0, \Omega^0|_\alpha$ et $\Omega^0|_0$.

2.1. Étude préliminaire de l'équation réduite X_0 . Le champ de vecteurs

$$X_0 = \frac{\partial}{\partial x} + y' \frac{\partial}{\partial y} + 6y^2 \frac{\partial}{\partial y'}$$

admet une intégrale première rationnelle $u = y'^2 - 4y^3$ et une autre transcendante $x - \int \frac{1}{4y^3+u} dy$. Nous utiliserons souvent les formules suivantes :

$$(1) \quad \begin{aligned} X_0 \left(\left(x + 2\frac{y}{y'} \right)^{n+1} \right) &= \left(x + 2\frac{y}{y'} \right)^n \frac{(n+1)3u}{y'^2} \\ X_0 \left(\left(7x + 20\frac{y}{y'} - 24\frac{y^4}{y'^3} \right)^{n+1} \right) &= \left(7x + 20\frac{y}{y'} - 24\frac{y^4}{y'^3} \right)^n \frac{(n+1)27u^2}{y'^4}. \end{aligned}$$

Lemme 2.2. *Si η_0 est une 1-forme polynomiale, intégrable, telle que $\eta_0(X_0) = 0$ et $i_{X_0}d\eta_0 = 0$ alors $\eta_0 = f(u)du$ ou $\eta_0 = f(u)(udx - (2xy^2 + y')dy + \frac{1}{3}(xy' + 2y)dy')$*

Preuve. – Écrivons $\eta_0 = a du + b(dy - y'dx)$. Si $b = 0$, on trouve la première expression. Sinon, en écrivant la condition d'intégrabilité de η_0 , on obtient l'équation

$$-X_0 \left(\frac{a}{b} \right) + \frac{6y^2}{y'} \frac{a}{b} - \frac{1}{2y'} = 0.$$

En utilisant les formules (1), on intègre cette équation. On trouve

$$\frac{a}{b} = -\frac{1}{6u}(xy' + 2y).$$

On en déduit que $\eta_0 = f \left(\frac{x+2y/y'}{6u} \right) du - \frac{1}{y'}(dy - y'dx)$. En écrivant la condition $i_{X_0}d\eta_0 = 0$, on trouve que $X_0 f = 0$, donc f est une fonction de u . En développant η_0 , on trouve la seconde expression. \square

Lemme 2.3. *Le feuilletage défini par X_0 n'admet pas de suite de Godbillon-Vey rationnelle de type asl_2 commençant par $\omega_1^0|_0$ et $\omega_2^0|_0$.*

Preuve. – Supposons qu'il existe une matrice de 1-formes $\Omega^1|_0$ de trace nulle satisfaisant :

$$\begin{aligned} d\Omega^0|_0 &= \Omega^1|_0 \wedge \Omega^0|_0 \\ d\Omega^1|_0 &= \Omega^1|_0 \wedge \Omega^1|_0. \end{aligned}$$

On peut supposer en toute généralité que ces formes sont homogènes sous Σ . La première égalité donne

$$\Omega^1|_0 = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{y'^3} & 0 \end{pmatrix} dy + A\omega_1^0|_0 + B\omega_2^0|_0$$

avec $A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = B \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ et $\text{trace } A = \text{trace } B = 0$.

La deuxième égalité donne un premier système d'équations que nous allons résoudre :

$$i_{X_0}d\Omega^1|_0 = [\Omega^1|_0(X_0), \Omega^1|_0].$$

Calculons les deux membres de cette égalité :

$$\begin{aligned} \bullet i_{X_0}d\Omega^1|_0 &= \left(\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1/y'^4 & 0 \end{pmatrix} + X_0A + \frac{1}{y'^2}B \right) \omega_1^0|_0 + X_0B \omega_2^0|_0 \\ \bullet [\Omega^1|_0(X_0), \Omega^1|_0] &= \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1/y'^2 & 0 \end{pmatrix}, A \right] \omega_1^0|_0 + \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1/y'^2 & 0 \end{pmatrix}, B \right] \omega_2^0|_0 \end{aligned}$$

En identifiant les coefficients de $\omega_1^0|_0$ et ceux de $\omega_2^0|_0$, on obtient les deux systèmes suivants,

$$(2a) \quad X_0A = \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{y'^2} & 0 \end{pmatrix}, A \right] - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{3}{y'^4} & 0 \end{pmatrix} - \frac{1}{y'^2}B$$

$$(2b) \quad X_0B = \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ \frac{1}{y'^2} & 0 \end{pmatrix}, B \right].$$

Si $B = \begin{pmatrix} a & b \\ c & -a \end{pmatrix}$, on écrit puis résoud le système (2b) en utilisant les formules (1) :

$$(3) \quad \begin{aligned} X_0 b &= 0 &\Rightarrow b &= b(u), \\ X_0 a &= \frac{-b}{y'^2} &\Rightarrow a &= \frac{-b}{3u}(x + 2y/y'), \\ X_0 c &= \frac{2a}{y'^2} &\Rightarrow c &= \frac{-b}{9u^2}(x + 2y/y')^2, \end{aligned}$$

sous l'hypothèse $b \neq 0$ (les résultats sont analogues lorsque b est nul). On résoud ensuite l'équation (2a). Si $A = \begin{pmatrix} -c & a \\ d & c \end{pmatrix}$, le système donne

$$X_0 d = \frac{-3c}{y'^2} - 3\frac{1}{y'^4} \Rightarrow d = \frac{b}{27u^3}(x + 2y/y')^3 - \frac{1}{9u^2} \left(7x + 20\frac{y}{y'} - 24\frac{y^4}{y'^3} \right).$$

On obtient une contradiction en considérant l'équation suivante :

$$i_{\frac{\partial}{\partial x}} d\Omega^1|_0 = \left[\Omega^1|_0 \left(\frac{\partial}{\partial x} \right), \Omega^1|_0 \right].$$

En identifiant les coefficients de $\omega_1^0|_0$ dans cette équation, on obtient

$$\frac{1}{y'} \frac{\partial B}{\partial y'} + \frac{\partial A}{\partial x} = [A, B],$$

c'est-à-dire,

$$(4a) \quad \frac{1}{y'} \frac{\partial a}{\partial y'} + \frac{\partial c}{\partial x} = ac - db$$

$$(4b) \quad \frac{1}{y'} \frac{\partial b}{\partial y'} + \frac{\partial a}{\partial x} = -2(bc + a^2),$$

$$(4c) \quad \frac{1}{y'} \frac{\partial c}{\partial y'} + \frac{\partial d}{\partial x} = 2(da - c^2).$$

L'équation (4b) s'écrit $2b'(u) - \frac{1}{3u}b(u) = 0$. La seule solution rationnelle est $b = 0$. Dans ce cas $a = a(u)$ et l'équation (4b) donne $a = 0$. Les équations (3) impliquent $c = c(u)$ et $d = \frac{-3c}{y'^2} - \frac{1}{9u^3} \left(7x + 20\frac{y}{y'} - 24\frac{y^4}{y'^3} \right)$. L'équation (4c) se réécrit alors

$$2c'(u) - \frac{7}{9u^3} = -2c^2.$$

Une solution de cette équation ne pouvant pas avoir de pôles d'ordre entier en 0, elle ne peut pas avoir de solution rationnelle. On aboutit à une contradiction qui prouve le lemme. \square

2.2. Le groupoïde de Galois de X_1 est transitif. Le résultat suivant provient de [24], on pourra aussi consulter [8, 14].

Proposition 2.4. *Le champ X_1 n'a pas d'intégrale première rationnelle.*

Preuve. – Si H_1 est une telle intégrale, prolongeons-la en une intégrale algébrique du champ X_α . On peut écrire $H_\alpha = H_0 + H_1\alpha + \dots$ après avoir fait une division suivant les puissances croissantes et multiplié par une puissance convenable de α . On peut supposer que H_0 n'est pas constante. En développant l'équation $X_\alpha H_\alpha = 0$ suivant les puissances de α , on obtient pour $0 \leq i \leq 4$

$$X_i H_i = 0,$$

qui implique $H_i = f_i(u)$ où $u = y'^2 - 4y^3$ et f_i est rationnelle. Le coefficient de α^5 donne

$$X_0 H_5 + x \frac{\partial f_0(u)}{\partial y'} = 0.$$

Dans les coordonnées x, y, u , cette dernière équation s'écrit

$$\left(\frac{\partial}{\partial x} + \sqrt{4y^3 + u} \frac{\partial}{\partial y} \right) \left(H_5^0 + \sqrt{4y^3 + u} H_5^1 \right) = -2x f_0'(u) \sqrt{4y^3 + u}$$

où $H_1 = H_5^0 + \sqrt{4y^3 + u} H_5^1$ et $H_5^i \in \mathbb{C}(x, y, u)$. En identifiant les termes libres de radicaux des deux membres, d'une part, et ceux contenant le radical, d'autre part, on obtient les deux équations suivantes :

$$(5a) \quad \frac{\partial H_5^0}{\partial y} + \frac{\partial H_5^1}{\partial x} = -2x f_0'(u)$$

$$(5b) \quad \frac{\partial H_5^0}{\partial x} + (4y^3 + u) \frac{\partial H_5^1}{\partial y} + 6y^2 H_5^1 = 0.$$

En dérivant (5b) par rapport à x et en utilisant (5a), on obtient

$$(6) \quad \frac{\partial^2 H_5^0}{\partial x^2} - (4y^3 + u) \frac{\partial^2 H_5^0}{\partial y^2} - 6y^2 \frac{\partial H_5^0}{\partial y} = 0.$$

Supposons que H_5^0 ait un pôle d'ordre n par rapport à y en $a \in \overline{\mathbb{C}[x, u]}^{alg}$, la clôture algébrique de $\mathbb{C}[x, u]$. En développant H_5^0 en série autour de a , on obtient une série d'équations différentielles. La première,

$$\left(\frac{\partial a}{\partial x} \right)^2 - (4a^3 + u) = 0,$$

implique $4a^3 = -u$. La suivante donne $12(n+1) = -6a^2$. H_5^0 est donc un polynôme. En écrivant $H_5^0 = \alpha_n y^n + \dots$ dans (6), on obtient $n = 0$ puis

$$H_1^0 = a(u)x + b(u).$$

L'équation (5a) donne $\frac{\partial H_5^1}{\partial x} = -2x f_0'(u)$. En dérivant (5b) par rapport à x , on obtient $\frac{\partial H_5^1}{\partial x} = 0$, ce qui implique $f_0' = 0$. Ceci contredit le choix de H et prouve la proposition. \square

Corollaire 2.5. *Le champ X_1 n'admet pas d'hypersurface algébrique invariante.*

Preuve. – Soit P l'équation d'une hypersurface invariante. Prolongeons P au paramètre α . On obtient un polynôme satisfaisant

$$X_\alpha P = LP$$

On a $p_\Sigma(L) = -1$ d'une part et d'autre part comme $\deg_{\{x, y, y'\}}(X_\alpha) = 1$, $\deg_{\{x, y, y'\}}(L) \leq 1$ et un calcul direct donne $\deg_{\{x\}}(L) \leq 0$. Tout ceci implique que L est nul donc que P est constant. \square

2.3. Le groupoïde de Galois de X_1 est transversalement primitif.

Proposition 2.6. *Le feuilletage donné par X_1 n'est inclus dans aucun feuilletage de codimension un donné par une 1-forme algébrique.*

Supposons qu'il existe une 1-forme algébrique η intégrable, $\eta \wedge d\eta = 0$ et telle que $\eta(X_1) = 0$.

Lemme 2.7. *Une telle forme peut être choisie polynomiale.*

Preuve. – Soit η une telle forme que nous normalisons $\eta = dx + a dy + b dy'$. Soit Z le lieu de ramification de cette forme sur \mathbb{C}^3 . D'après le corollaire 2.5, Z est transverse aux trajectoires de X_1 . Plaçons-nous au voisinage analytique d'un point de Z . N'importe quelle intégrale première au voisinage d'un point de la trajectoire passant par p se prolonge de manière univaluée sur un voisinage de p . La forme η est donc univaluée sur ce voisinage. Le lieu de ramification Z est vide et la forme est rationnelle. \square

Choisissons une de ces formes et prolongeons-la au paramètre α .

Lemme 2.8 ([8]). *La forme η_α peut être choisie telle que $i_{X_\alpha} d\eta_\alpha = 0$.*

Preuve. – Choisissons

$$\eta_\alpha = -(Py' + Q(6y^2 + \alpha^5 x))dx + Pdy + Qdy'$$

avec P et Q premiers entre eux. En écrivant la condition d'intégrabilité, on obtient :

$$QXP - PXQ + 12yQ^2 - P^2 = 0.$$

D'après le théorème de Bezout, il existe donc un polynôme L tel que :

$$\begin{cases} XP + 12yQ = LP \\ XQ + P = LQ \end{cases}$$

En calculant les degrés, on obtient que L doit être de degré 1 en x, y, y' et de poids -1 par rapport à Σ . Donc $L = c\alpha^2 x$ où c est une constante. En calculant les degrés en x , on obtient $c = 0$. Un calcul direct montre que ceci implique le lemme. \square

Preuve de la proposition 2.6. – Quitte à multiplier par un facteur convenable, nous pouvons supposer que η_α s'écrit $\eta_0 + \alpha\eta_1 + \dots$ avec η_i des formes polynomiales et $\eta_0 \neq 0$. Les équations

$$(7) \quad \begin{aligned} \eta_\alpha(X_\alpha) &= 0 \\ i_{X_\alpha} d\eta_\alpha &= 0 \end{aligned}$$

relient les formes η_0 et η_1 . Écrivons la forme η_1 de la manière suivante

$$\eta_1 = a dx + b\omega_1^0|_0 + c\omega_2^1|_0.$$

Le terme d'ordre 0 dans les équations (7) donne $\eta_0(X_0) = 0$ et $i_{X_0} d\eta_0 = 0$. Ces équations sont résolues par le lemme 2.2. Celles d'ordre 1 donne $\eta_0(x \frac{\partial}{\partial y'}) + \eta_1(X_0) = 0$ et $i_{x \frac{\partial}{\partial y'}} d\eta_0 + i_{X_0} d\eta_1 = 0$. En écrivant toutes ces équations dans la base $(dx, \omega_1^0|_0, \omega_2^1|_0)$, on obtient

$$(8) \quad \begin{aligned} a &= -x \eta_0(\frac{\partial}{\partial y'}) \\ i_{x \frac{\partial}{\partial y'}} d\eta_0 &= g \omega_2^0|_0 \\ X_0 c &= X_0 a - \frac{\partial a}{\partial x} - g \\ X_0 b &= -\frac{c}{y'^2} + \frac{1}{y'} \frac{\partial a}{\partial y'} \end{aligned}$$

Dans chaque cas du lemme 2.2, nous allons prouver qu'il n'existe pas de triplet (a, b, c) solution de ces équations tel que la forme η_1 soit polynomiale.

Premier cas, $p_\Sigma \eta_\alpha \equiv 0 \pmod{6}$.

D'après le Lemme 2.2, $\eta_0 = f(u)du$. Les équations portant sur les coefficients de η_1 deviennent

$$\begin{aligned} (9a) \quad & a = -2f(u)y'x \\ (9b) \quad & g = 0 \\ (9c) \quad & X_0c = -12f(u)xy^2 \\ (9d) \quad & X_0b = -\frac{c}{y^2} - \frac{2f(u)x}{y'} - 4f'(u)xy' \end{aligned}$$

On résoud (9c) : $c = 2f(u)(y - xy')$. On obtient ensuite pour l'équation (9d) :

$$X_0b = -4f'(u)xy' - \frac{2f(u)y}{4y^3 + u}.$$

Dans les coordonnées x, y, u , où $b = b_0 + \frac{1}{\sqrt{4y^3 + u}}b_1$ avec b_0 et b_1 des polynômes et $X_0 = \frac{\partial}{\partial x} + \sqrt{4y^3 + u}\frac{\partial}{\partial y}$, l'équation ci-dessus se réécrit :

$$\begin{aligned} (10a) \quad & \frac{\partial b_0}{\partial x} + \frac{\partial b_1}{\partial y} - \frac{6y^2}{4y^3 + u}b_1 = -\frac{2f(u)y}{4y^3 + u} \\ (10b) \quad & \frac{\partial b_1}{\partial x} + (4y^3 + u)\frac{\partial b_0}{\partial y} = -4f'(u)x(4y^3 + u). \end{aligned}$$

En dérivant (10a) par rapport à x et en tenant compte de la dérivée de (10b) par rapport à y , on obtient

$$(11) \quad \frac{\partial^2 b_0}{\partial x^2} - (4y^3 + u)\frac{\partial^2 b_0}{\partial y^2} - 6y^2\frac{\partial b_0}{\partial y} = 24f'(u)y^2x.$$

On en déduit que b_0 est un polynôme d'ordre 1 en y puis

$$b_0 = 4f'(u)xy + a(u)x + b(u) ; \quad \frac{\partial b_1}{\partial x} = 0.$$

En reportant b_0 dans (10a), on obtient

$$(4y^3 + u)\frac{\partial b_1}{\partial y} - 6y^2b_1 = -16f'(u)y^4 - 4a(u)y^3 + (f(u) - 4uf'(u))y - ua(u),$$

ce qui implique que le degré de b_1 en y est inférieur à deux. En posant $b_1 = \alpha_2y^2 + \alpha_1y + \alpha_0$, on obtient le système suivant

$$\left\{ \begin{array}{l} -16f'(u) = 2\alpha_2 \\ -4a(u) = -2\alpha_1 \\ 0 = -6\alpha_0 \\ f(u) - 4uf'(u) = 2\alpha_2u \\ ua(u) = u\alpha_1. \end{array} \right.$$

Ce système implique l'existence d'une constante c telle que $f = \frac{c}{u^{1/2}}$. Or f est un polynôme donc f est nul, ce qui contredit le choix de la forme η_α .

Deuxième cas, $p_\Sigma\eta_\alpha \equiv 1 \pmod{6}$.

D'après le lemme 2.2, $\eta_0 = f(u) \left(\frac{1}{3} \left(x + 2\frac{y}{y'} \right) \omega_1^0|_0 - u \omega_2^0|_0 \right)$. Les équations (8) donnent

$$(12a) \quad a = -\frac{f(u)}{3}(y'x^2 + 2yx)$$

$$(12b) \quad g = -2f(u)uy' - \frac{5f(u)}{3}y'$$

$$(12c) \quad X_0c = -2f(u)y^2x^2 - \left(\frac{7}{3}f(u) - 2f'(u)u \right) y'x$$

$$(12d) \quad X_0b = -\frac{c}{y^2} - \frac{f(u)}{3} \frac{x^2}{y'} - \frac{2f'(u)}{3} y'x^2$$

Étudions l'équation (12c). Le second membre étant d'ordre 2 en x , c est d'ordre au plus 3. Par homogénéité, c est en fait d'ordre 2. Posons $c = c_2x^2 + c_1x + c_0$. On obtient le système suivant

$$\begin{cases} X_0c_2 = -2f(u)y^2 \\ X_0c_1 = -\left(\frac{7}{3}f(u) - 2f'(u)u\right)y' - 2c_2 \\ X_0c_0 = -c_1. \end{cases}$$

On les résoud successivement, $c_2 = \frac{-1}{3}f(u)y'$, $c_1 = -\left(\frac{5}{3}f(u) - 2f'(u)u\right)y$ et $X_0c_0 = \left(\frac{5}{3}f(u) - 2f'(u)u\right)y$. Cette dernière équation n'a pas de solution polynomiale comme le montre le lemme suivant. Ceci prouve que f doit être nulle, en contradiction avec le choix de η_α . Ceci prouve la proposition. \square

Lemme 2.9. *Il n'existe pas de polynôme R satisfaisant $X_0R = y$.*

Preuve. – Supposons qu'il existe un tel polynôme. Comme le second membre est d'ordre 0 en x , R s'écrit $\alpha_1(u)x + \alpha_0(y, y')$. En écrivant l'équation dans les coordonnées (x, y, u) on a

$$\begin{aligned} \frac{\partial R^0}{\partial y} + \frac{\partial R^1}{\partial x} &= 0 \\ \frac{\partial R^0}{\partial x} + (4y^3 + u)\frac{\partial R^1}{\partial y} + 6y^2R^1 &= y. \end{aligned}$$

Ces équations impliquent $(4y^3 + u)\frac{\partial R^1}{\partial y} + 6y^2R^1 = y - \alpha_1(u)$. Cette équation n'a pas de solution polynomiale. \square

2.4. Le groupoïde de Galois n'est pas transversalement affine.

Lemme 2.10. *Soit $\tilde{\Omega}^0, \tilde{\Omega}^1$ une suite de Godbillon-Vey de type asl_2 pour le feuilletage donné par X_1 . Il existe une suite commençant par $\Omega^0 = \begin{pmatrix} \omega_1^0 \\ \omega_2^0 \end{pmatrix}$ pour chaque vecteur de formes vérifiant $\omega_1^0 \wedge \omega_2^0 = i_{X_1} dx \wedge dy \wedge dy'$. S'il existe une asl_2 -suite commençant par Ω^0 alors elle est unique.*

Preuve. – Les formes $\tilde{\Omega}^0$ et $\tilde{\Omega}^1$ satisfont les relations suivantes :

$$\begin{cases} \tilde{\Omega}^0(X_1) = 0, \\ d\tilde{\Omega}^0 = \tilde{\Omega}^1 \wedge \tilde{\Omega}^0, \\ d\tilde{\Omega}^1 = \tilde{\Omega}^1 \wedge \tilde{\Omega}^1, \\ \text{trace } \tilde{\Omega}^1 = 0. \end{cases}$$

En écrivant $\Omega^0 = F\tilde{\Omega}^0$ et $\Omega^1 = dFF^{-1} + F\tilde{\Omega}^1F^{-1}$, on construit une nouvelle suite de Godbillon-Vey. De plus $\Omega_1^0 \wedge \Omega_2^0$ et $\tilde{\Omega}_1^0 \wedge \tilde{\Omega}_2^0$ sont deux formes volumes transverses invariants sous le flot des champs de vecteurs tangents. On en déduit que

$$\omega_1^0 \wedge \omega_2^0 = c \tilde{\omega}_1^0 \wedge \tilde{\omega}_2^0$$

où c est une intégrale première rationnelle donc une constante. Calculons la trace de Ω^1 :

$$\begin{aligned} \text{trace } \Omega^1 &= \text{trace } dFF^{-1} \\ &= \frac{d(\det F)}{\det F} \\ &= \frac{dc}{c} = 0 \end{aligned}$$

et Ω^0 , Ω^1 forme une asl_2 -suite.

Supposons maintenant qu'il existe deux asl_2 -suites : Ω^0 , Ω^1 et Ω^0 , $\tilde{\Omega}^1$. Le groupoïde de Galois du feuilletage est un sous-groupoïde de Lie du groupoïde définie par une de ces suites. Or le lemme A.4 montre qu'un tel feuilletage est contenu dans un feuilletage de codimension un, ce qui contredit la proposition 2.6. \square

Proposition 2.11. *Le feuilletage donné par X_1 n'admet pas de suite de Godbillon-Vey de type asl_2 .*

Le lemme précédent affirme que si le feuilletage donné par X_1 admet une asl_2 -suite alors celle-ci est rationnelle.

Lemme 2.12. *Si elle existe, la asl_2 -suite commençant par $\tilde{\Omega}^0 = \begin{pmatrix} dy' - (6y^2 + x)dx \\ dy - y'dx \end{pmatrix}$ doit être polynomiale.*

Preuve. – Nous allons montrer que le lieu des pôles de la forme $\tilde{\Omega}^1$ est une hypersurface invariante pour le feuilletage. Le lemme 2.5 permettra de conclure. Soit Z l'hypersurface des pôles de $\tilde{\Omega}^1$. On construit un système d'intégrales premières locales (en dehors de Z) en résolvant les systèmes différentiels suivant :

$$\begin{cases} dH = \partial H \tilde{\Omega}^0 \\ d\partial H = -\partial H \tilde{\Omega}^1, \end{cases}$$

où $H = \begin{pmatrix} H_1 \\ H_2 \end{pmatrix}$ et ∂H est une matrice 2×2 . Si Z est transverse aux feuilles, les intégrales premières se prolongent à Z . Comme de plus $dH_1 \wedge dH_2 = (\det \partial H) \tilde{\omega}_1^0 \wedge \tilde{\omega}_2^0$, $\det \partial H$ ne s'annule que le long de feuilles ; on en déduit que Z doit être tangent aux feuilles. Ceci contredit le corollaire 2.5. \square

Corollaire 2.13. *Si elle existe, la asl_2 -suite commençant par $\Omega^0 = \begin{pmatrix} y'dy' - (6y^2 + x)dy \\ \frac{dy}{y'} - dx \end{pmatrix}$ est composée de 1-formes à coefficients dans $\mathbb{C}[x, y, y', 1/y']$.*

Soit Ω^0 , Ω^1 cette suite. On la prolonge au paramètre α de manière à avoir une asl_2 -suite, $\Omega^0|_\alpha$, $\Omega^1|_\alpha$ pour X_α . Ces 1-formes vérifient

$$(13) \quad d\Omega^0|_\alpha = \Omega^1|_\alpha \wedge \Omega^0|_\alpha$$

$$(14) \quad d\Omega^1|_\alpha = \Omega^1|_\alpha \wedge \Omega^1|_\alpha$$

On a $p_\Sigma(\Omega^0|_\alpha) = \begin{pmatrix} -6 \\ 1 \end{pmatrix}$ et $p_\Sigma(\Omega^1|_\alpha) = \begin{pmatrix} 0 & -7 \\ 7 & 0 \end{pmatrix}$. La matrice $\Omega^1|_\alpha$ que nous obtenons ainsi a *a priori* un pôle le long de $\alpha = 0$. Nous allons montrer que ce pôle est nécessairement d'ordre zéro puis conclure avec le lemme 2.3. Développons la matrice $\Omega^1|_\alpha$ en puissance de α :

$$\Omega^1|_\alpha = \frac{1}{\alpha^n} \Xi_n + \frac{1}{\alpha^{n-1}} \Xi_{n-1} + \dots$$

Lemme 2.14. *Si $n > 0$ alors on est dans un des deux cas suivants :*

$$(1) \quad \Xi_n = \begin{pmatrix} 1 & \frac{b}{a} \\ -\frac{a}{b} & -1 \end{pmatrix} (a\omega_1^0|_0 + b\omega_2^0|_0) \text{ avec } a = \frac{c}{9}u^{k-2}(x + 2y/y')^2 \text{ et } b = -\frac{c}{3}u^{k-1}(x + 2y/y') \text{ où } c \in \mathbb{C} \text{ et } k = \frac{5n+8}{6} \in \mathbb{Z},$$

$$(2) \Xi_n = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ cu^k & 0 \end{pmatrix} \omega_1^0|_0 \text{ avec } k = \frac{5n-13}{6} \in \mathbb{Z}.$$

Remarque 2.15. Si $n > 0$ alors $n > 1$. Le seul cas posant problème est le cas (2), $n = 1$ et $k = -2$. En posant $\beta = \alpha^5$, on obtient un champs $X_{\beta^{1/5}}$ donnant X_1 en $\beta = 1$ et une asl_2 -suite donnée par $\Omega_\beta^1 = \frac{1}{\beta^{n/5}}\Xi_n + \dots$. Le corollaire 2.13 implique que n est divisible par 5.

Preuve. – Posons $\Xi_n = \begin{pmatrix} \eta_{11} & \eta_{12} \\ \eta_{21} & -\eta_{11} \end{pmatrix}$. Nous allons distinguer deux cas suivant que η_{11} soit nulle ou non.

Premier cas, $\eta_{11} \neq 0$.

L'égalité $\Xi_n \wedge \Xi_n$ donne $\Xi_n = \begin{pmatrix} 1 & f \\ g & -1 \end{pmatrix} \eta_{11}$. Comme de plus $\Xi_n \wedge \Omega^0|_0 = 0$,

$$\Xi_n = \begin{pmatrix} 1 & b/a \\ -a/b & -1 \end{pmatrix} (a\omega_1^0|_0 + b\omega_2^0|_0).$$

Considérons ensuite l'égalité

$$(15) \quad i_{X_\alpha} d\Omega^1|_\alpha = [\Omega^1|_\alpha(X_\alpha), \Omega^1|_\alpha]$$

avec $\Omega^1|_\alpha(X_\alpha) = \begin{pmatrix} 0 & -\alpha y' \\ \frac{1}{y'^2} & 0 \end{pmatrix}$. En calculant le coefficient de $1/\alpha^n$, on obtient

$$i_{X_0} d\Xi_n = \frac{1}{y'^2} \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \Xi_n \right]$$

Calculons les deux membres de l'égalité

- $i_{X_0} d\Xi_n = \begin{pmatrix} 0 & X_0 \frac{b}{a} \\ -X_0 \frac{a}{b} & 0 \end{pmatrix} (a\omega_1^0|_0 + b\omega_2^0|_0) + \begin{pmatrix} 1 & \frac{b}{a} \\ -\frac{a}{b} & -1 \end{pmatrix} ((X_0 a + \frac{b}{y'^2})\omega_1^0|_0 + X_0 b \omega_2^0|_0),$
- $\left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \Xi_n \right] = \begin{pmatrix} -\frac{b}{a} & 0 \\ \frac{a}{b} & \frac{b}{a} \end{pmatrix} (a\omega_1^0|_0 + b\omega_2^0|_0).$

En identifiant les coefficients de $\omega_1^0|_0$ et $\omega_2^0|_0$ de ces matrices, on obtient le système

$$\begin{cases} X_0 a = \frac{-2b}{y'^2} \\ X_0 b = -\frac{b^2}{a} \frac{1}{y'^2}. \end{cases}$$

On en déduit que $\frac{b^2}{a}$ est une intégrale première homogène de X_0 donc $\frac{b^2}{a} = cu^k$ avec $c \in \mathbb{C}$ et $k \in \mathbb{Z}$. On résoud le système en utilisant les formules (1). En calculant le poids de Ξ_n à partir des formules d'un coté et à partir du poids de Ω_α de l'autre, on obtient la condition sur l'ordre du pôle en α .

Deuxième cas, $\eta_{11} = 0$.

Comme $\Xi_n \wedge \Xi_n = 0$ et $\Xi_n \wedge \Omega^0|_0 = 0$, on a soit $\Xi_n = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ g & 0 \end{pmatrix} \omega_1^0|_0$, soit $\Xi_n = \begin{pmatrix} 0 & f \\ 0 & 0 \end{pmatrix} \omega_2^0|_0$.

En reprenant les équations différentielles données par (15), on obtient le résultat annoncé. \square

Preuve de la proposition 2.11. – Nous allons maintenant calculer Ξ_{n-1} et aboutir à une contradiction.

Premier cas, $\eta_{11} \neq 0$.

Dans ce cas, Ξ_n est égale à $\begin{pmatrix} 1 & b/a \\ -a/b & -1 \end{pmatrix} \eta_{11}$. En écrivant le coefficient de $\frac{1}{\alpha^{n-1}}$ dans (13), on obtient

$$\Xi_{n-1} \wedge \Omega^0|_0 + \Xi_n \wedge \begin{pmatrix} -xdy \\ 0 \end{pmatrix} = 0.$$

Ce qui implique que

$$\Xi_{n-1} = A\omega_1^0|_0 + B\eta_{11} - \begin{pmatrix} a & b \\ -\frac{a^2}{b} & -a \end{pmatrix} xdy$$

avec $A \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + B \begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix} = 0$. En écrivant le coefficient de $\frac{1}{\alpha^{2n-1}}$ dans (14), on obtient

$$\Xi_n \wedge \Xi_{n-1} + \Xi_{n-1} \wedge \Xi_n = 0$$

Ce qui donne $\left[A, \begin{pmatrix} 1 & b/a \\ -a/b & -1 \end{pmatrix} \right] = 0$, c'est-à-dire

$$A = \ell \begin{pmatrix} 1 & b/a \\ -a/b & -1 \end{pmatrix}$$

avec ℓ quelconque. On en déduit ensuite que

$$B = \ell \begin{pmatrix} 0 & -b/a^2 \\ -1/b & 0 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 1 & b/a \\ -a/b & -1 \end{pmatrix}$$

avec t quelconque. Considérons maintenant l'équation différentielle portant sur Ξ_{n-1} que l'on déduit de (15) :

$$i_{X_0} d\Xi_{n-1} + i_x \frac{\partial}{\partial y'} d\Xi_n = \frac{1}{y'^2} \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \Xi_{n-1} \right] - y' \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \Xi_n \right].$$

Calculons les termes ci-dessus :

$$\begin{aligned} \bullet i_{X_0} d\Xi_{n-1} &= \begin{pmatrix} X_0\ell + aX_0t & -\left(\frac{b}{a}\right)^2 \frac{\ell}{y'^2} + bX_0t \\ -2\frac{a}{b}X_0\lambda + \frac{\ell}{y'^2} - \frac{a^2}{b}X_0t & -X_0\ell - aX_0t \end{pmatrix} \omega_1^0|_0 \\ &+ \begin{pmatrix} bX_0t - ay' & -\left(\frac{b}{a}\right)^2 X_0\ell - \ell \left(\frac{b}{a}\right)^3 \frac{1}{y'^2} + \frac{b^2}{a}X_0t - by' \\ -X_0\ell - aX_0t + \frac{a^2}{b}y' & -bX_0t + ay' \end{pmatrix} \omega_2^0|_0 \\ &+ \begin{pmatrix} 2b & \frac{b^2}{a} \\ -3a & -2b \end{pmatrix} \frac{x}{y'^2} dy + xy' \begin{pmatrix} da & db \\ -d\left(\frac{a^2}{b}\right) & -da \end{pmatrix} + t i_{X_0} d\Xi_n, \\ \bullet i_x \frac{\partial}{\partial y'} d\Xi_n &= x \begin{pmatrix} \frac{\partial a}{\partial y'} & \frac{\partial b}{\partial y'} \\ -\frac{\partial(a^2/b)}{\partial y'} & -\frac{\partial a}{\partial y'} \end{pmatrix} \omega_1^0|_0 + x \begin{pmatrix} \frac{\partial b}{\partial y'} & \frac{\partial(b^2/a)}{\partial y'} \\ -\frac{\partial a}{\partial y'} & -\frac{\partial b}{\partial y'} \end{pmatrix} \omega_2^0|_0 \\ &+ \begin{pmatrix} -b & -\frac{b^2}{a} \\ a & b \end{pmatrix} \frac{x}{y'^2} dy - xy' \begin{pmatrix} da & db \\ -d\left(\frac{a^2}{b}\right) & -da \end{pmatrix}, \end{aligned}$$

- $\left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \Xi_{n-1} \right] = \ell \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2 & 0 \end{pmatrix} \omega_1^0|_0 + \ell \begin{pmatrix} (\frac{b}{a})^2 & 0 \\ 0 & -(\frac{b}{a})^2 \end{pmatrix} \omega_2^0|_0 + \begin{pmatrix} b & 0 \\ -2a & -b \end{pmatrix} xdy + t \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \Xi_n \right]$
- $\left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \Xi_n \right] = \begin{pmatrix} -a/b & -2 \\ 0 & a/b \end{pmatrix} (a\omega_1^0|_0 + b\omega_2^0|_0).$

Parmi les équation que l'on obtient en identifiant les coefficients, on trouve les deux équations suivantes

$$\begin{cases} X_0t = 2\frac{a}{b}y' + \frac{b}{a^2}\frac{\ell}{y'^2} - \frac{\partial b}{\partial y'}\frac{x}{b} \\ X_0\ell = -\frac{b}{a}\frac{\ell}{y'^2} - \frac{a^2}{b}y' - b\frac{\partial}{\partial y'}\left(\frac{a}{b}\right)x \end{cases}$$

En remplaçant a et b par leurs valeurs (lemme 2.14), on obtient l'équation suivante pour ℓ :

$$X_0\ell = \frac{3u}{x + 2\frac{y}{y'}}\frac{\ell}{y'^2} + \frac{c}{27}u^{k-3}\left(x + 2\frac{y}{y'}\right)^3 y' + \frac{2c}{9}u^{k-3}x\left(x + 2\frac{y}{y'}\right)^2 y' + \frac{2c}{9}u^{k-2}x\left(x + 2\frac{y}{y'}\right)\frac{y}{y'^2}.$$

On résoud cette dernière équation en posant $\ell = \lambda \frac{x + 2\frac{y}{y'}}{3u} \frac{9}{cu^{k-2}}$. On a alors

$$X_0\lambda = 7y'x^2 + \left(16y + 6u\frac{y}{y'^2}\right)x + \frac{4y^2}{y'}.$$

La fonction λ est donc un polynôme en x de degré inférieur à trois. Par homogénéité sous Σ , λ est de degré 2. On résoud les équations portant sur les coefficients de λ et on obtient finalement

$$\ell = \frac{x + 2\frac{y}{y'}}{3u} \frac{9}{cu^{k-2}} \left(7yx^2 + 4\frac{y^2}{y'}x + d\right)$$

où d est constante. L'équation satisfaite par t est alors

$$\begin{aligned} X_0t = -\left(\frac{y^3}{y'^2} + d\right) \frac{1}{y'^2} \frac{1}{\left(x + 2\frac{y}{y'}\right)^2} + \left(28\frac{y^2}{y'}\right) \frac{1}{y'^2} \frac{1}{x + 2\frac{y}{y'}} \\ + 4(k-1)\frac{y}{u} - 9\frac{y}{y'^2} - \left(2k - \frac{8}{3}\right)\frac{y'}{u} \left(x + 2\frac{y}{y'}\right). \end{aligned}$$

Puisque X_0t a un pôle d'ordre 2 le long de $x + 2\frac{y}{y'} = 0$, t doit avoir un pôle d'ordre 1 :

$$t = \frac{t_{-1}}{x + 2\frac{y}{y'}} + t_0 + t_1 \left(x + 2\frac{y}{y'}\right) + t_2 \left(x + 2\frac{y}{y'}\right)^2$$

On a alors $t_{-1} = -\frac{1}{3u} \left(48\frac{y^3}{y'^2} + d\right)$ et $X_0t_{-1} = \frac{28}{y'^2}\frac{y^2}{y'}$, ce qui est impossible. Il n'y a pas de solution polynomiale à l'équation portant sur t . Il n'existe donc pas de asl_2 -suite pour le feuilletage avec $\eta_{11} \neq 0$.

Deuxième cas, η_{11} est nulle.

Dans ce cas, $\Xi_n = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ cu^k & 0 \end{pmatrix} \omega_1^0|_0$. Calculons Ξ_{n-1} . Les conditions $\Xi_n \wedge \Xi_{n-1} + \Xi_{n-1} \wedge \Xi_n = 0$ et $\Xi_{n-1} \wedge \omega^0|_0 + \Xi_n \wedge \begin{pmatrix} -xdy \\ 0 \end{pmatrix} = 0$ donnent

$$\Xi_{n-1} = \begin{pmatrix} -e & 0 \\ d & e \end{pmatrix} \omega_1^0|_0 + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ e & 0 \end{pmatrix} \omega_2^0|_0 - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ cu^k & 0 \end{pmatrix} xdy.$$

En reprenant l'équation (15) et en remarquant que Ξ_n est fermée, on obtient

$$i_{X_0}d\Xi_{n-1} = \frac{1}{y'^2} \left[\begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}, \Xi_{n-1} \right] - y' \left[\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}, \Xi_n \right]$$

qui donne

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} -X_0e & 0 \\ X_0d & X_0e \end{pmatrix} \omega_1^0|_0 + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ X_0e & 0 \end{pmatrix} \omega_2^0|_0 + \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ e & 0 \end{pmatrix} \frac{1}{y'^2} \omega_1^0|_0 - \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ cu^k & 0 \end{pmatrix} y' \omega_2^0|_0 \\ = y' \begin{pmatrix} -cu^k & 0 \\ 0 & cu^k \end{pmatrix} \omega_1^0|_0 + \frac{1}{y'^2} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 2e & 0 \end{pmatrix} \omega_1^0|_0. \end{aligned}$$

Ce qui donne les équations suivantes $X_0e = cu^k y'$ et $X_0d = \frac{3e}{y'^2}$, c'est-à-dire $c = cu^k y$ et $X_0d = 3cu^k \frac{y}{y'^2}$.

Lemme 2.16. *L'équation $X_0R = \frac{y}{y'^2}$ n'a pas de solution rationnelle.*

Preuve. – On déduit de cette équation que $X_0 \frac{\partial R}{\partial x} = 0$. D'un autre coté le poids sous Σ de R doit être égal à 4 donc $\frac{\partial R}{\partial x} = 0$. En écrivant l'équation dans les coordonnées x, y, u , on obtient :

$$(4y^3 + u) \frac{\partial R_1}{\partial y} + 6y^2 R_1 = \frac{y}{4y^3 + u},$$

où $R = R_0(y, u) + y' R_1(y, u)$. Si cette équation admet une solution rationnelle, elle s'écrit $R_1 = \frac{P}{4y^3 + u}$ avec P polynomiale. En calculant le coefficient du terme de plus haut degré en y dans l'équation satisfaite par P , on vérifie P ne peut pas être polynomiale. \square

L'équation sur d n'a de solution rationnelle que si c est nul, ce qui contredit le choix de n . La matrice de 1-forme $\Omega^1|_\alpha$ ne peut donc pas avoir de pôle en α . Mais d'après le lemme 2.3, elle ne peut pas non plus avoir de pôle. Il n'existe donc pas de matrice de formes à coefficients rationnels satisfaisant les équations de $\Omega^1|_\alpha$. Ceci prouve qu'il n'existe pas de asl_2 -suite pour le feuilletage donné par la première équation de Painlevé. \square

3. IRRÉDUCTIBILITÉ DE P_1

Dans cette section, nous allons utiliser le groupoïde de Galois du feuilletage défini par P_1 pour montrer son irréductibilité. Nous commencerons par définir ce que nous entendons par feuilletage réductible. En utilisant les notions de “type différentiel” et de “degré typique de transcendance différentielle” de Kolchin, nous montrerons ensuite que le groupoïde de Galois d'un feuilletage réductible est plus petit que le groupoïde de Galois de P_1 .

3.1. Feuilletages réductibles. Dans [31], une solution particulière d'une équation différentielle d'ordre deux est dite réductible si on peut l'exprimer rationnellement après avoir résolu successivement des équations différentielles linéaires (ou associées à un groupe algébrique) et des équations d'ordre un. Cette définition d'irréductibilité ne concerne que les solutions particulières de l'équation indépendamment de l'équation. Dans l'esprit de la définition du groupoïde de Galois, nous allons définir une notion de réductibilité “globale” du feuilletage *i.e.* de réductibilité de la solution générale.

Soit \mathcal{F} un feuilletage de codimension deux. Les feuilletages que nous considérerons comme plus simples que \mathcal{F} sont les feuilletages de codimension un d'une part et les feuilletages donnés par une connexion linéaire (ou associée à un groupe algébrique) de l'autre ainsi que leurs versions relative le long d'un feuilletage de codimension un. Dans un autre contexte, ce type d'extension est étudié dans [6].

Soient $(K, \partial_1, \dots, \partial_n)$ un corps différentiel. On notera T_K le K -espace vectoriel engendré par les ∂ , T_K^* son dual et $\{d_1, \dots, d_n\}$ la base duale des ∂

Définition 3.1 ([6]). *On dira que une extension différentielle $K \subset L$ est une extension fortement normale de K relative en codimension q si il existe un sous-corps Q de K engendré par q éléments fonctionnellement indépendants tel que si on note \underline{K} le corps K muni des dérivations $T_{\underline{K}} = \bigcap_{h \in Q} \ker dh$ et \overline{Q}^{alg} la clôture algébrique de Q , l'extension $\underline{K} \otimes \overline{Q}^{alg} \subset \underline{L} \otimes \overline{Q}^{alg}$ est fortement normale.*

Une extension fortement normale à un groupe de Galois. Dans [6] les dérivations n'appartenant pas à $T_{\underline{K}}$ sont prise en considération pour étudier l'extension ce qui permet de définir un groupe de Galois pour l'extension $K \subset L$, c'est un groupe algébrique différentiel.

Exemple 3.2. *Considérons le champs de vecteurs $X_0 = \frac{\partial}{\partial x} + y' \frac{\partial}{\partial y} + 6y^2 \frac{\partial}{\partial y'}$. Ce champs admet une intégrale première rationnelle $u = y'^2 - 4y^3$ et une intégrale première dans une extension fortement normale relative en codimension un de $\mathbb{C}(x, y, y') : H = x - \int \frac{dy}{\sqrt{4y^3 + u}}$.*

Son groupe de Galois est un sous-groupe algébrique différentiel de $\mathbb{G}_a(\overline{\mathbb{C}(u)}^{alg})$.

Définition 3.3. *Un feuilletage \mathcal{F} de codimension deux sur \mathbb{C}^n est dit réductible si il existe deux intégrales premières H dans une extension différentielle K_p de $\mathbb{C}(x_1, \dots, x_n)$ construite de la manière suivante*

$$\mathbb{C}(x_1, \dots, x_n) = K_0 \subset K_1 \dots \subset K_p$$

telle que les extensions intermédiaires $K_i \subset K_{i+1}$ sont

- *des extensions algébriques,*
- *des extension fortement normales [15]*
- *des extensions fortement normales relatives en codimension un.*
- *des extensions par une intégrale première non constante d'un feuilletage de codimension un, i.e. $K_{i+1} = K_i(\langle H \rangle)$ avec $dH \wedge \omega = 0$ pour une 1-forme intégrable à coefficients dans K_i .*

Cette définition se généralise aisement aux feuilletages de codimension quelconque. Dans le cadre de cet article, le théorème que nous allons prouvé est le suivant.

Théorème 3.4. *Le feuilletage défini par P_1 est irréductible.*

La preuve est donnée dans la section suivante. Dans un premier temps nous prouvons que les feuilletages réductibles admettent des intégrales premières satisfaisant un "gros" système d'équations aux dérivées partielles. La taille de "l'espace des solutions" de ce système est mesuré par le "type d'une extension différentielle" défini dans la section suivante. Le pseudo-groupe d'holonomie du feuilletage fixant les intégrales premières locales (lorsque cela à un sens), ces éléments satisfont aussi un système d'e.d.p. La taille du groupoïde de Galois donne une borne inférieure à la taille de ce système d'e.d.p. Dans le cas du feuilletage donné par P_1 , cette borne est supérieure à la taille de l'espace des intégrales premières particulières d'un feuilletage réductible.

3.2. Types d'une extension différentielle et preuve du théorème 3.4. La définition du type d'une extension de corps différentiels est basée sur un analogue différentiel du polynôme de Hilbert pour les \mathcal{D} -variété introduit par Kolchin sous le nom de "polynôme de transcendance différentielle" ([15], chapitre II). Rappelons d'abord la définition du type d'une \mathcal{D} -variété de sections de Z sur X .

Définition 3.5. *Soient Z une variété sur X et \mathcal{Y} une \mathcal{D} -variété irréductible de $J(Z/X)$. On définit la croissance de \mathcal{Y} comme la suite d'entier $c_\ell = \dim_X \mathcal{Y}_\ell$. Le type de \mathcal{Y} est le monome $a\ell^b$ tel que $c_\ell \sim_\infty a\ell^b$.*

Dans [15] chapitre II-12, le polynôme interpolant la suite c_ℓ pour de grandes valeurs de ℓ est appelé "polynôme de transcendance différentielle". Dans [15] chapitre II-13, les entiers a et b sont appelés "degré typique de transcendance différentielle" et "type différentiel".

Exemple 3.6. La croissance de la \mathcal{D} -variété $J(\mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C}^p)$ est $c_\ell = p \frac{(n+\ell)!}{n!\ell!}$. Son type est $\frac{p}{n!} \ell^n$.

Exemple 3.7. Soient \mathcal{F} un feuilletage de codimension un de \mathbb{C}^n donné par une forme ω et $IP(\mathcal{F})$ la \mathcal{D} -variété des intégrales premières i.e. la sous- \mathcal{D} -variété de $J(\mathbb{C}^n \rightarrow \mathbb{C})$ définie par l'idéal différentiel engendré par les composantes de $dH \wedge \omega$. La croissance de $IP(\mathcal{F})$ est $c_\ell = \ell + 1$.

Exemple 3.8. Soit \mathcal{F} un feuilletage de codimension deux de \mathbb{C}^n . La croissance de la \mathcal{D} -variété des couples intégrales premières est $c_\ell = (\ell + 2)(\ell + 1)$. Si de plus le feuilletage préserve une forme volume transverse, la croissance de la \mathcal{D} -variété des couples d'intégrales premières compatibles au volume est $c_\ell = \frac{1}{2}(\ell + 2)(\ell + 1) + \ell + 1$.

Exemple 3.9. Soit V un espace vectoriel muni d'une connexion intégrable sur X . La croissance de la \mathcal{D} -variété des sections plates de V est $c_\ell = \dim_X V$. Elle est indépendante de ℓ .

La définition donnée par Kolchin dans le cadre des extensions de corps différentiels se déduit de la définition précédente de la manière suivante. Soient $K, (\partial_1, \dots, \partial_n)$ un corps différentiel et L une extension différentiel de K . Choisissons p éléments y_1, \dots, y_p engendrant différentiellement L sur K . Soit \mathcal{I} le noyau du morphisme $K \langle Y_1, \dots, Y_p \rangle \rightarrow L$. Le corps L est alors le corps des fractions de la \mathcal{D} -variété au-dessus de K définie par \mathcal{I} . Notons \mathcal{Y} cette \mathcal{D} -variété.

Lemme-Définition 3.10 ([15]). *Le type $t_{L/K}$ de $K \subset L$ est le type de \mathcal{Y} . Il ne dépend que de l'extension $K \subset L$.*

Preuve. – Soient y_1, \dots, y_p et z_1, \dots, z_q deux systèmes générateurs de L sur K . Notons \mathcal{Y} et \mathcal{Z} les \mathcal{D} -variétés au-dessus de K qu'ils définissent. Par définition, il existe des fractions différentielles telles que $y_j = y_j(z)$. Soit i l'ordre maximal de ces fractions. Elles définissent une application rationnelle dominante de \mathcal{Y}_i sur \mathcal{Z}_0 . Par dérivations on obtient des applications dominantes de $\mathcal{Y}_{i+\ell}$ sur \mathcal{Z}_ℓ . Ce qui implique $c(\mathcal{Y})_{i+\ell} \geq c(\mathcal{Z})_\ell$. De la même manière, $c(\mathcal{Z})_{j+\ell} \geq c(\mathcal{Y})_\ell$. Ceci prouve le lemme. \square

Exemple 3.11. *Le type d'une extension fortement normale est fini.*

Exemple 3.12. Soient $(K, \partial_1, \dots, \partial_n)$, ω une 1-forme sur K (i.e. un élément du dual du K -espace vectoriel engendré par les dérivations) et $L = K \langle H \rangle$ une extension différentielle engendrée par une indéterminée H satisfaisant $dH \wedge \omega = 0$. Le type $t_{L/K}$ est linéaire.

Exemple 3.13. Soient $K \subset L$ une extension fortement normale en codimension un et $\partial_1, \dots, \partial_n$ une base des dérivations telle que $T_{\underline{K}} = K\partial_1 + \dots + K\partial_{n-1}$. L'extension étant fortement normale par rapport à $T_{\underline{K}}$, on peut trouver une base $\{H_1, \dots, H_p\}$ de L sur K telle que $\partial_j H_i$ soit algébrique sur $K(H_1, \dots, H_p)$ pour tout i et $1 \leq j \leq n-1$. Le type de L/K est donc linéaire.

De la même manière que pour le lemme 3.10, on prouve le lemme suivant.

Lemme 3.14. Soit $K \subset K_1 \subset K_2$ une suite d'extensions différentielles. On a l'inégalité suivante :

$$t_{K_2/K} \leq_\infty t_{K_2/K_1} + t_{K_1/K},$$

où \leq_∞ signifie asymptotiquement inférieur.

Preuve du théorème 3.4. – Considérons l'espace $J(\mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^2)$. Le \mathcal{D} -groupeïde de Lie $J^*(\mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3)$ agit sur cet espace par composition à la source. Soit \mathcal{I} un idéal différentiel réduit de $\mathcal{O}_{J(\mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^2)}$ définissant une sous- \mathcal{D} -variété \mathcal{Y} de cet espace. Nous appellerons stabilisateur de \mathcal{I} (ou de \mathcal{Y}) et noterons $Stab(\mathcal{I})$ (ou $Stab(\mathcal{Y})$) le \mathcal{D} -groupeïde de Lie maximal laissant \mathcal{Y} invariante. Notons c_{source} la composition à la source :

$$c_{source} : (J^*(\mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3), t) \times_{\mathbb{C}^3} (J(\mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^2), s) \rightarrow J(\mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^2),$$

l'idéal du stabilisateur de \mathcal{I} est le plus petit idéal différentiel $\mathcal{J} \subset \mathcal{O}_{J^*(\mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^3)}$ tel qu'en dehors d'une hypersurface $S \subset \mathbb{C}^3$ on ait les inclusions suivantes

$$c_{source}^* \mathcal{I} + \mathcal{J} \subset \mathcal{I} + \mathcal{J} \text{ et } c_{source}^* \mathcal{I} + i^* \mathcal{J} \subset \mathcal{I} + \mathcal{J}.$$

À partir de ces inclusions, on montre que J est l'idéal d'un \mathcal{D} -groupeïde de Lie (voir par exemple [4]). Considérons $IP(\mathcal{F})$ la \mathcal{D} -variété des intégrales premières du feuilletage \mathcal{F} défini par P_1 . C'est la sous- \mathcal{D} -variété de $J(\mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^2)$ décrivant les couples d'intégrales premières. Elle est donnée par l'idéal différentiel réduit engendré par les deux équations $X_1 H_1$ et $X_1 H_2$ où (H_1, H_2) sont des coordonnées sur l'espace but. Le stabilisateur de $IP(\mathcal{F})$ est le \mathcal{D} -groupeïde de Lie $Aut(\mathcal{F})$ dont les solutions sont les difféomorphismes formelles Γ satisfaisant les équations différentielles $\Gamma^* X_1 \wedge X_1 = 0$. Soit \mathcal{I} un idéal différentiel premier de $\mathcal{O}_{IP(\mathcal{F})}$ et $\tilde{\mathcal{I}}$ sa préimage dans $\mathcal{O}_{J(\mathbb{C}^3 \rightarrow \mathbb{C}^2)}$. Le stabilisateur de \mathcal{I} est par définition le \mathcal{D} -groupeïde de Lie $Stab(\tilde{\mathcal{I}}) \cap Aut(\mathcal{F})$. Plaçons nous au voisinage d'un point régulier de X_1 et choisissons une coordonnée tangente z et deux coordonnées transverses t_1 et t_2 . Dans ces coordonnées analytiques, l'idéal \mathcal{I} admet un système de générateurs ne dépendant pas de z ([4, 5]). Tous les flots locaux de X_1 laissent donc \mathcal{I} invariant. Autrement dit, $Stab(\mathcal{I})$ est localement admissible, donc admissible. On obtient l'inclusion suivante

$$Gal(\mathcal{F}) \subset \bigcap_{\mathcal{I} \in \text{spec}^{diff}(\mathcal{O}_{IP(\mathcal{F})})} Stab(\mathcal{I})$$

où $\text{spec}^{diff}(\mathcal{O}_{IP(\mathcal{F})})$ est l'ensemble des idéaux différentiels premiers de $\mathcal{O}_{IP(\mathcal{F})}$. Nous avons déjà calculé le \mathcal{D} -groupeïde de Lie $Gal(\mathcal{F})$. Les stabilisateurs des idéaux différentiels de $\mathcal{O}_{IP(\mathcal{F})}$ doivent donc contenir le groupeïde de Lie d'invariance de la 2-forme fermée définissant le feuilletage.

L'existence de deux intégrales premières indépendantes dans une extension différentielle du type réductible (définition 3.3) assure l'existence d'un idéal différentiel "assez gros" dans $\mathcal{O}_{IP(\mathcal{F})}$. En effet, considérons une telle extension $\mathbb{C}(x, y, y') \subset K$ et l'application $\mathcal{O}_{IP(\mathcal{F})} \rightarrow K$ qui envoie H_1, H_2 sur les deux intégrales premières. Le lemme 3.14 nous assure que le type de K est linéaire. Le type de $IP(\mathcal{F})$ étant quadratique, l'application précédente à un noyau non trivial que nous noterons \mathcal{I} . Le type de la \mathcal{D} -variété définie par \mathcal{I} est linéaire.

Considérons le stabilisateur de \mathcal{I} , $Stab(\mathcal{I})$, et le \mathcal{D} -groupeïde de Lie des transformations de \mathbb{C}^3 fibrées sur l'identité en x , $Inv(x)$. La projection sur l'axe des x étant transverse au feuilletage, le \mathcal{D} -groupeïde de Lie $Aut(\mathcal{F}) \cap Inv(x)$ agit simplement transitivement sur la \mathcal{D} -variété $IP(\mathcal{F})$. Par conséquent le \mathcal{D} -groupeïde de Lie $Stab(\mathcal{I}) \cap Inv(x)$ agit simplement sur la \mathcal{D} -variété définie par \mathcal{I} . Son type est donc linéaire. Le groupeïde $Stab(\mathcal{I}) \cap Inv(x)$ est donc strictement plus petit que $Gal(\mathcal{F}) \cap Inv(x)$, ce qui est impossible d'après la définition du groupeïde de Galois. Ceci prouve le théorème. \square

ANNEXE A. CLASSIFICATION DE CARTAN ; PREUVE DU THÉORÈME 1.35

Dans cette annexe, nous reprenons les arguments de [3], pp 134–194, pour prouver le théorème suivant.

Théorème 1.35. *Soit \mathcal{F} un feuilletage de \mathbb{C}^n de codimension deux, défini par une 2-forme fermée γ . Le \mathcal{D} -groupeïde de Lie $\text{Inv}(\gamma)$ d'invariance de cette forme est un \mathcal{D} -groupeïde de Lie admissible pour \mathcal{F} . Si le groupeïde de Galois de \mathcal{F} n'est pas $\text{Inv}(\gamma)$ alors on est dans un des cas suivant :*

- \mathcal{F} admet une intégrale première rationnelle,
- il existe une 1-forme algébrique intégrable s'annulant sur \mathcal{F} ,
- il existe un vecteur de 1-forme $\Omega^0 = \begin{pmatrix} \omega_1^0 \\ \omega_2^0 \end{pmatrix}$ définissant le feuilletage et une matrice de forme Ω^1 de trace nulle tels que :

$$d\Omega^0 = \Omega^1 \wedge \Omega^0 \quad \text{et} \quad d\Omega^1 = \Omega^1 \wedge \Omega^1.$$

Soient x_0 un point régulier du feuilletage, $\Theta_{\mathcal{F}}|_{x_0}$ la forme transverse d'ordre q de \mathcal{F} et $\theta_i^{a,b}$ ses composantes dans la base monomiale sur $J_q(\chi(\mathbb{C}^2, 0))$. Les équations de structures s'écrivent

$$d\theta_i^{a,b} = \sum_{\substack{a_1+a_2=a \\ b_1+b_2=b}} \binom{a}{a_1} \binom{b}{b_1} \theta_1^{a_1, b_1} \wedge \theta_2^{a_2+1, b_2} + \sum_{\substack{a_1+a_2=a \\ b_1+b_2=b}} \binom{a}{a_1} \binom{b}{b_1} \theta_2^{a_1, b_1} \wedge \theta_2^{a_2, b_2+1}.$$

pour $a + b \leq q - 1$. Nous complétons ces formes en une base des formes transverses au feuilletage sur $\text{Aut}(\mathcal{F})_{q+1}|_{x_0} = R_{q+1}(\mathcal{F})$ avec des formes $\omega_i^{a,b}$ pour $a + b = q + 1$ et $i = 1, 2$ satisfaisant les équations de structures d'ordre $q + 1$:

$$d\theta_i^{a,b} = \omega_i^{a+1, b} \wedge \theta_1^{0,0} + \omega_i^{a, b+1} \wedge \theta_2^{0,0} + \dots, \quad a + b = q$$

Ces formes ω sont ne bien définies que modulo les formes d'ordre 0. Les formes θ étant invariantes, les formes ω ne le sont que modulo les formes d'ordre 0. Soit \mathcal{Y} un \mathcal{D} -groupeïde de Lie transitif admissible pour \mathcal{F} et p l'entier minimal tel que $\mathcal{Y}_p \neq \text{Inv}(\gamma)_p$. Nous allons examiner les équations de structures satisfaites par les formes invariantes sur certaines orbites de $\mathcal{Y}_p|_{x_0}$ et en déduire successivement que

- $p \leq 2$,
- si $p = 2$, les équations de structure sont de type asl_2 ,
- si $p = 1$ il existe une combinaison linéaire des formes transverse d'ordre 0 intégrable en restriction à une orbite.

Lemme A.1. *Quitte à modifier la suite des formes de Cartan, les restrictions des formes sur une orbite de $\text{Inv}(\gamma)|_{x_0}$ satisfont $\theta_1^{a+1, b} + \theta_2^{a, b+1} = 0$.*

Preuve. - La forme $t^*\gamma$ est une forme invariante d'ordre 0. Elle est donc égale à $h\theta_1^{0,0} \wedge \theta_2^{0,0}$ où h est un invariant différentiel d'ordre 1 de $\text{Inv}(\gamma)$ donc constant en restriction à une orbite. La forme $\theta_1^{0,0} \wedge \theta_2^{0,0}$ est donc fermé ce qui implique $\theta_1^{1,0} + \theta_2^{0,1} = h\theta_1^{0,0} + k\theta_2^{0,0}$ avec h et k des constantes. En faisant agir le difféomorphisme $f(x_1, x_2) = (x_1 + hx_1^2, x_2 + kx_2^2)$ par composition à la source en x_0 , on trouve une nouvelle suite de formes invariantes commençant par les mêmes formes d'ordre 0 et dont les formes d'ordre 1 sont

$$\theta_1^{1,0} - h\theta_1^{0,0}, \theta_1^{0,1} + k\theta_1^{0,0}, \theta_2^{1,0} + h\theta_2^{0,0}, \theta_2^{0,1} - k\theta_2^{0,0}.$$

La nouvelle suite que nous noterons encore θ vérifie donc $\theta_1^{1,0} + \theta_2^{0,1} = 0$ La restriction à $\text{Inv}(\gamma)|_{x_0}$ de la différentielle extérieure de cette forme est aussi nulle. Celle-ci est égale à

$$(\theta_1^{2,0} + \theta_2^{1,1}) \wedge \theta_1^{0,0} + (\theta_1^{1,1} + \theta_2^{0,2}) \wedge \theta_2^{0,0}.$$

On en déduit que $\theta_1^{2,0} + \theta_2^{1,1} = h\theta_2^{0,0}$ et $\theta_1^{1,1} + \theta_2^{0,2} = -h\theta_1^{0,0}$. En faisant agir le difféomorphisme $f(x_1, x_2) = (x_1 + \frac{h}{2}x_2x_1^2, x_2 - \frac{h}{2}x_1x_2^2)$ en x_0 , on trouve une nouvelle suite de formes invariantes satisfaisant les identités annoncées à l'ordre 2. On construit la suite par récurrence. Comme

$$d(\theta_1^{a+1, b} + \theta_2^{a, b+1}) = (\theta_1^{a+2, b} + \theta_2^{a+1, b+1}) \wedge \theta_1^{0,0} + (\theta_1^{a+1, b+1} + \theta_2^{a, b+2}) \wedge \theta_2^{0,0} + \dots,$$

si le premier membre est nul, on a $\theta_1^{a+2,b} + \theta_2^{a+1,b+1} = h\theta_2^{0,0}$ et $\theta_1^{a+1,b+1} + \theta_2^{a,b+2} = -h\theta_1^{0,0}$. l'action d'un difféomorphisme en x_0 tangent à l'ordre $a + b + 2$ à l'identité permet de construire une suite vérifiant les identités anoncées à l'ordre $a + b + 2$. \square

Soit maintenant \mathcal{Y} un sous- \mathcal{D} -groupeïde de Lie transitif de $Inv(\gamma)$ admissible pour \mathcal{F} .

Lemme A.2. *Si un tel \mathcal{D} -groupeïde de Lie n'admet pas d'équation du premier ordre supplémentaire alors il admet quatre équations supplémentaires d'ordre deux.*

Preuve. – Soit q l'ordre minimale des équations supplémentaires. Considérons sur $J_q^*|_{x_0}$ la base θ_j^α , $1 \leq j \leq n$, $0 \leq |\alpha| \leq q - 1$ des formes (d'ordre $q - 1$) invariantes et ω_j^α , $1 \leq j \leq n$, $|\alpha| = q$ des formes complétant les θ en une base de formes transverses. La condition $\theta_1^{a+1,b} + \theta_2^{a,b+1} = 0$ sur $Inv(\gamma)|_{x_0}$ implique que l'on peut choisir des formes ω satisfaisant $\omega_1^{a+1,b} + \omega_2^{a,b+1} = 0$ pour $a + b = q - 1$.

Soit E un invariant différentiel d'ordre $q > 1$. La forme $dE = B\omega_2^{q,0} + \sum_{i=0}^q A_i\omega_1^{i,q-i} + \dots$ (en n'écrivant pas les formes d'ordre $q - 1$) est invariante sous l'action de \mathcal{Y}_{q+1} . Les formes ω étant invariantes modulo $\theta_1^{0,0}$ et $\theta_2^{0,0}$, les coefficients B et A_i sont des invariants différentiels de \mathcal{Y} . Nous allons maintenant calculer certains termes de la forme ddE restreint sur $\mathcal{Y}_q|_{x_0}$ à partir des équations de structures. Dans un premier temps, regardons les termes contenant des formes d'ordre 1. Ils sont de la forme $\gamma_1 \wedge \theta_1^{1,0} + \gamma_2 \wedge \theta_1^{1,0} + \gamma_3 \wedge \theta_2^{1,0}$. Les formes γ_i s'expriment en fonctions des formes θ et ω . Les termes d'ordre q de ces formes proviennent de la différentielle des termes d'ordre q de dE que l'on calcule grace aux équations de structures. On obtient :

$$\begin{aligned} \gamma_1 &= (q+1)B\omega_2^{q,0} + (q-1)A_q\omega_1^{q,0} + \sum(2i-q-1)A_i\omega_1^{i,q-i} - (q+1)A_0\omega_1^{0,q} + \dots \\ \gamma_2 &= -A_q\omega_2^{q,0} + 2A_{q-1}\omega_1^{q,0} + \sum(q-i+2)A_{i-1}\omega_1^{i,q-i} + (q+1)A_0\omega_1^{1,q-1} + \dots \\ \gamma_3 &= - (q+1)B\omega_1^{q,0} + \sum(i+1)A_i\omega_1^{i,q-i} + A_1\omega_1^{0,q} + \dots \end{aligned}$$

Comme $ddE = 0$, on en déduit l'existence de trois formes identiques aux formes γ_i modulo les formes d'ordre 0 et 1 s'annulant sur $\mathcal{Y}_q|_{x_0}$. Comme elles sont indépendantes de dE , elles proviennent d'invariants différentiels supplémentaires. En refaisant le même calcul pour chacune de ces nouvelles formes, on obtient qu'il existe une forme s'annulant sur $\mathcal{Y}_q|_{x_0}$ ayant un A_i non nul. On en déduit ensuite que l'on peut supposer que ce coefficient est A_0 puis qu'il existe $q+2$ formes s'annulant sur $\mathcal{Y}_q|_{x_0}$ donc $q+2$ invariants différentiels d'ordre q ($q+3$ invariants d'ordre q donnent un invariant d'ordre $q-1$). Montrons maintenant que q est inférieur ou égale à deux. Considérons les $q+2$ invariants différentiels d'ordre q , E_i , et leurs différentielles $dE_i = \sum A_i^j\omega_1^{j,q-j} + B_i\omega_2^{q,0} + \dots$ où les A_i^j sont des invariants différentiels de \mathcal{Y} . Choisissons les combinaisons linéaires de ces formes :

$$\gamma_i = \omega_1^{i,q-i} + \dots \text{ et } \gamma_{-1} = \omega_2^{q,0} + \dots$$

Elles forment un système complètement intégrable de formes s'annulant sur les orbites de \mathcal{Y} et sont de plus invariantes sous l'action de \mathcal{Y} . Ces deux conditions impliquent que $d\gamma_i = \sum c_i^{j,k}\gamma_j \wedge \gamma_k$. En réduisant cette égalité modulo les formes d'ordre inférieur ou égal à $q-1$, on obtient $0 = \sum c_i^{j,k}\omega_1^{j,q-j} \wedge \omega_1^{k,q-k} + \sum c_i^{j,-1}\omega_1^{j,q-j} \wedge \omega_2^{q,0}$. Ces formes étant indépendantes, les coefficients c sont tous nuls. Les formes γ sont donc fermées. Regardons maintenant la différentielle de γ_q . Cette forme contient le terme $\theta_2^{2,0} \wedge \frac{(q-1)(q-2)}{2}\theta_1^{q-2,1}$. La deuxième forme de ce produit extérieur ne se représente dans $d\gamma_q$ que multipliée par une forme d'ordre 1. La forme γ_q étant fermée, ce produit extérieur doit être nul. Ceci implique que q est inférieur ou égale à deux. Si il existe un invariant différentiel il est donc d'ordre inférieur à deux et s'il est d'ordre deux, il y en a quatre. \square

Lemme A.3. *S'il existe un \mathcal{D} -groupeïde de Lie admissible pour \mathcal{F} ayant un invariant d'ordre deux alors le feuilletage est défini par un vecteur de formes Ω^0 et il existe une matrice de formes Ω^1 de trace nulle telle que $d\Omega^0 = \Omega^1 \wedge \Omega^0$ et $d\Omega^1 = \Omega^1 \wedge \Omega^1$.*

Preuve. – D'après le lemme précédent, il y a quatre invariants différentiels d'ordre 2. Considérons les formes données par le lemme précédent et décrivant $\mathcal{Y}_2|_{x_0}$.

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= \omega_2^{2,0} + a_1\theta_2^{1,0} + b_1(\theta_1^{1,0} - \theta_2^{0,1}) + c_1\theta_1^{0,1} + \dots \\ \gamma_2 &= \omega_1^{2,0} + a_2\theta_2^{1,0} + b_2(\theta_1^{1,0} - \theta_2^{0,1}) + c_2\theta_1^{0,1} + \dots \\ \gamma_3 &= \omega_1^{1,1} + a_3\theta_2^{1,0} + b_3(\theta_1^{1,0} - \theta_2^{0,1}) + c_3\theta_2^{1,0} + \dots \\ \gamma_4 &= \omega_1^{0,2} + a_4\theta_2^{1,0} + b_4(\theta_1^{1,0} - \theta_2^{0,1}) + c_4\theta_2^{1,0} + \dots\end{aligned}$$

Ces formes étant invariantes, les coefficients a, b, c sont des invariants différentiels de \mathcal{Y} . Ces formes formant un système complètement intégrable, elles doivent être fermées comme nous l'avons montré au cours de la preuve du lemme précédent. En calculant $d\gamma_1$ modulo les formes d'ordre 0, on obtient

$$\begin{aligned}d\gamma_1 &= \frac{3}{2}(\theta_1^{1,0} - \theta_2^{0,1}) \wedge \omega_2^{2,0} - 3\theta_2^{1,0} \wedge \omega_1^{2,0} + a_1(\theta_1^{1,0} - \theta_2^{0,1}) \wedge \theta_2^{1,0} + da_1 \wedge \theta_2^{1,0} \\ &\quad + 2b_1\theta_2^{1,0} \wedge \theta_1^{0,1} + db_1 \wedge (\theta_1^{1,0} - \theta_2^{0,1}) + c_1\theta_1^{0,1} \wedge (\theta_1^{1,0} - \theta_2^{0,1}) + dc_1 \wedge \theta_1^{0,1}\end{aligned}$$

En examinant les termes contenant des formes d'ordre 2, on obtient les égalités $da_1 = -3\gamma_2$, $db_1 = \frac{3}{2}\gamma_1$ et $dc_1 = 0$. En faisant le remplacement dans l'égalité précédente, on obtient les égalités $c_1 = 0$, $b_2 = \frac{-1}{6}a_1$ et $c_2 = \frac{-2}{3}b_1$. Les mêmes manipulations sur

$$-d\gamma_2 \text{ donnent } da_2 = 2\gamma_3, db_2 = \frac{1}{2}\gamma_2 \text{ et } dc_2 = -\gamma_1 \text{ puis } b_3 = \frac{-1}{4}a_2 \text{ et } c_3 = \frac{-2}{3}a_1,$$

$$-d\gamma_3 \text{ donnent } da_3 = \gamma_4, db_3 = \frac{-1}{2}\gamma_2 \text{ et } dc_3 = 2\gamma_2 \text{ puis } a_4 = 0, b_4 = \frac{-3}{2}a_3 \text{ et } c_4 = \frac{3}{2}a_2,$$

On en déduit que, restreint sur la sous-variété invariante $Z_2 = \{a_1 = b_1 = a_2 = a_3 = 0\}$, les coefficients a, b et c sont nuls. En faisant un bon choix des formes ω , les formes restreintes s'écrivent alors :

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= \omega_2^{2,0} \\ \gamma_2 &= \omega_1^{2,0} + h_2\theta_1^{0,0} \\ \gamma_3 &= \omega_1^{1,1} + h_3\theta_1^{0,0} \\ \gamma_4 &= \omega_1^{0,2} + h_4\theta_1^{0,0}.\end{aligned}$$

Les formes θ restreintes satisfont les équations :

$$\begin{aligned}d(\theta_1^{1,0} - \theta_2^{0,1}) &= 2\theta_2^{1,0} \wedge \theta_1^{0,1} + (h_2 - h_1)\theta_2 \wedge \theta_1 \\ d\theta_1^{0,1} &= \theta_1^{0,1} \wedge (\theta_1^{1,0} - \theta_2^{0,1}) + h_3\theta_2 \wedge \theta_1 \\ d\theta_2^{1,0} &= -\theta_2^{1,0} \wedge (\theta_1^{1,0} - \theta_2^{0,1}) - h_1\theta_2 \wedge \theta_1.\end{aligned}$$

En vérifiant que ces formes sont fermées, on obtient $h_1 = h_2 = h_3 = 0$. Les formes θ restreintes sur $Z_2 = \{a_1 = b_1 = a_2 = a_3 = 0\}$ vérifient les identités annoncées dans la proposition. En choisissant ensuite une section f de Z_2 pour la projection but, on tire les formes sur \mathbb{C}^n : $\Omega = f^*\Theta$. \square

Lemme A.4. *Si un \mathcal{D} -groupeïde de Lie admissible pour \mathcal{F} admet des équations du premier ordre supplémentaires alors il laisse un feuilletage de codimension un invariant.*

Preuve. – Nous allons examiner $\mathcal{Y}_1|_{x_0}$ muni des deux formes invariantes $\theta_1^{0,0}$ et $\theta_2^{0,0}$ que l'on complète en une base avec des formes $\omega_j^{k,\ell}$ pour $j = 1, 2$ et $k + \ell = 1$ satisfaisant les premières équations de structure.

Supposons que \mathcal{Y}_1 est définie par un invariant d'ordre un supplémentaire E . On écrit

$$dE = a\omega_2^{1,0} + b(\omega_1^{1,0} - \omega_2^{0,1}) + c\omega_1^{0,1} + h\theta_1^{0,0} + k\theta_2^{0,0}$$

En choisissant correctement les formes ω , on peut supposer $k_1 = k_2 = 0$. Les coefficients a, b et c étant des invariants, la forme $\gamma = \omega_2^{1,0} + b(\omega_1^{1,0} - \omega_2^{0,1}) + c\omega_1^{0,1}$, obtenue en divisant

par a , est fermée. En calculant $d\gamma$ modulo γ , on obtient $b^2 + c = 0$. En écrivant ensuite que γ est fermée, on obtient

$$0 = db + \omega_2^{1,0} + b(\omega_1^{1,0} - \omega_2^{0,1}) - b^2\omega_1^{0,1}.$$

En restriction à la sous-variété $Z_1 = \{b = 0\}$, la forme $\theta_2^{0,0}$ est intégrable. Le pull-back de cette forme par une section de Z_1 donne une forme algébrique intégrable s'annulant sur le feuilletage.

Supposons que \mathcal{Y}_1 soit donné par deux invariants E_1 et E_2 . Les coefficients des formes ω dans les différentielles dE_1 et dE_2 sont des invariants. En prenant des combinaisons linéaires de ces formes, on trouve les deux formes invariantes

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= \omega_2^{1,0} + a\omega_1^{0,1} + h_1\theta_1^{0,0} + k_1\theta_2^{0,0} \\ \gamma_2 &= (\omega_1^{1,0} - \omega_2^{0,1}) + b\omega_1^{0,1} + h_2\theta_1^{0,0} + k_2\theta_2^{0,0}\end{aligned}$$

En choisissant correctement les formes ω , on peut supposer que $h_1 = k_1 = h_2 = k_2 = 0$. Ces formes s'annulant sur les orbites de \mathcal{Y} , on a $d\gamma_1 = c_1\gamma_1 \wedge \gamma_2$ et $d\gamma_2 = c_2\gamma_1 \wedge \gamma_2$. Le calcul direct à partir des formules donne

$$\begin{aligned}d\gamma_1 &= -\gamma_1 \wedge \gamma_2 + (da - 2a\gamma_2 + b\gamma_1) \wedge \omega_1^{0,1} \\ d\gamma_2 &= (db + 2\gamma_1 - b\gamma_2) \wedge \omega_1^{0,1}.\end{aligned}$$

En se plaçant sur l'hypersurface $Z_1 = \{b = 0\}$, la forme $\theta_2^{0,0}$ est intégrable.

Supposons enfin que \mathcal{Y}_1 soit donnée par trois invariants. En effectuant les manipulations précédentes, on obtient trois formes invariantes s'annulant sur \mathcal{Y}_1

$$\begin{aligned}\gamma_1 &= \omega_2^{1,0} + h_1\theta_1^{0,0} + k_1\theta_2^{0,0} \\ \gamma_2 &= (\omega_1^{1,0} - \omega_2^{0,1}) + h_2\theta_1^{0,0} + k_2\theta_2^{0,0} \\ \gamma_3 &= \omega_1^{0,1} + h_3\theta_1^{0,0} + k_3\theta_2^{0,0}\end{aligned}$$

Quitte à choisir d'autres formes ω , on peut supposer $h_1 = k_1 = k_2 = k_3 = 0$. En calculant les différentiels et en vérifiant que l'on doit obtenir des formules $d\gamma_i = \sum c_i^{j,k} \gamma_j \wedge \gamma_k$, on obtient $h_2 = h_3 = 0$. En restriction à Y_1 , la forme $\theta_2^{0,0}$ est intégrable (même fermée). \square

Dans le cas où \mathcal{Y} admet un invariant d'ordre 0, le théorème 1.19 prouve que le feuilletage admet une intégrale première.

RÉFÉRENCES

- [1] Bialynicki-Birula, A. - *On Galois theory of fields with operators*, Amer. Journ. Math. vol **84** No. 1 (1962) 89–109
- [2] Cartan, É. - *Sur la structure des groupes infinis de transformations*, Ann. Sci. École Normale Sup. **22** (1905) 219–308
- [3] Cartan, É. - *Les sous-groupes des groupes continus de transformations*, Ann. Sci. École Normale Sup. **25** (1908) 57–194
- [4] Casale, G. - *Sur le groupoïde de Galois d'un feuilletage*, Thèse de l'Université Paul Sabatier, Toulouse; disponible sur <http://doctorants.picard.ups-tlse.fr/theses.htm>
- [5] Casale, G. - *Feuilletages de codimension un; groupoïde de Galois et intégrales premières*, à paraître aux Ann. Inst. Fourier (2006)
- [6] Cassidy, P.J. et Singer, M.F. - *Galois theory of parametrized differential equations and linear differential algebraic groups*, à paraître dans le volume spécial Andrey Bolibrukh, de la série "IRMA Lectures in Mathematics and Theoretical Physics" (2005)
- [7] Drach, J. - *Essai sur une théorie générale de l'intégration et sur la classification des transcendentes*, Ann. Sci. Écoles Normale Sup. **15** (1898) 243–384
- [8] Drach, J. - *Sur le groupe de rationalité des équations du second ordre de M. Painlevé*, Bull. Sci. Math. **39** (1915) 149–166
- [9] Drach, J. - *L'équation différentielle de la balistique extérieur et son intégration par quadratures*, Ann. Sci. École Normale Sup. **37** (1920) 1–94

- [10] Drach, J. - *Sur le mouvement d'un solide qui a un point fixe*, C.R. Acad. Sci. Paris **179** (1924) 735–737
- [11] Gabriel, P. - *Construction de préschémas quotients*, dans Schémas en groupes (SGA 63-64) Fasc 2a exposé 5 Lecture Notes in Mathematics **151**, Springer-Verlag (1970) 250–283
- [12] Guillemin, V. et Sternberg, S. - *An algebraic model of transitive differential geometry*, Bull. Amer. Math. Soc. **70** (1964) 16–47
- [13] Guillemin, V. et Sternberg, S. - *Deformation theory of pseudogroup structure*, Memoirs of the Amer. Math. Soc. **64** (1966)
- [14] Ince, E.L. - *Ordinary Differential Equations*, Dover Publication, New York (1944)
- [15] Kolchin, E. - *Differential Algebra and Algebraic Groups*, Academic Press (1973)
- [16] Kumpera, A. et Spencer, D. - *Lie Equations*, Annals of Math. Studies, Princeton University Press (1972)
- [17] Lie, S. - *Theorie der Transformationsgruppen I*, Math. Ann. **16** (1880) - *Transformations Groups*, translated by M. Ackerman, commented by R. Hermann, Lie groups : History, Frontiers and Applications Vol 1 Math. Sci. Press (1975)
- [18] Malgrange, B. - *Le groupoïde de Galois d'un feuilletage*, Monographie **38** vol **2** de L'enseignement mathématique (2001)
- [19] Malgrange, B. - *Systèmes Différentiels Involutifs*, Panoramas et synthèses **19** Soc. Math. France (2005)
- [20] Murata, Y. - *Classical solutions of the third Painlevé equation*, Nagoya Math.J. **139** (1995) 37–65
- [21] Nishioka, K. - *A note on the transcendency of Painlevé's first transcendent*, Nagoya Math. J. **109** (1988) 63–67
- [22] Noumi, M. et Okamoto, K. - *Irreducibility of the second and fourth Painlevé equation*, Funkcial. Ekvac. **40** (1997) 139–163
- [23] Painlevé, P. - *Leçons de Stockholm (1875)*, Oeuvres complètes Tome **1**, éditions du CNRS (1972)
- [24] Painlevé, P. - *Mémoire sur les équations différentielles dont l'intégrale générale est uniforme*, Bull. Soc. Math. **28** (1900) 201–261
- [25] Painlevé, P. - *Démonstration de l'irréductibilité absolue de l'équation $y_{xx} = 6y^2 + x$* , C.R. Acad. Sci. Paris **135** (1902) 641–647
- [26] Picard, É. - *Sur les équations différentielles et les groupes algébriques de transformations*, Ann. Fac. Sci. Université de Toulouse **1** (1887) 1–15
- [27] Pommaret, J-F. - *Differential Galois Theory*, Mathematics and its applications, vol **15** Gordon & Breach Sci. Publishers (1983)
- [28] Ritt, J.F. - *Differential Algebra*, American Mathematical Society Colloquium Publications, Vol. **XXXIII**, American Mathematical Society, New York (1950)
- [29] Singer, I. M. et Sternberg, S. - *The infinite groups of Lie and Cartan. I. The transitive groups.*, J. Analyse Math. **15** (1965) 1–114
- [30] Singer, M.F. - *Liouvillian first integral of differential equations*, Trans. A. M. S. **333** (1992)
- [31] Umemura, H. - *On the irreducibility of the first differential equation of Painlevé*, Alg. Geom. and Com. Alg. in honor of M. Nagata (1987) 771–789
- [32] Umemura, H. - *Galois theory of algebraic and differential equation*, Nagoya Math. J. vol **144** (1996) 1–58 - *Differential Galois theory of infinite dimension*, Nagoya Math. J. vol **144** (1996) 59–135
- [33] Umemura, H. et Watanabe, H. - *Solutions of the second and fourth Painlevé equation*, Nagoya Math. J. **148** (1997) 151–198
- [34] Umemura, H. et Watanabe, H. - *Solution of the third Painlevé equation*, Nagoya Math. J. **151** (1998) 1–24
- [35] Vessiot, E. - *Sur la théorie de Galois et ses diverses généralisations*, Ann. Sci. École Normale Sup. **21** (1904) 9–85
- [36] Vessiot, E. - *Sur la réductibilité et l'intégration des systèmes complets*, Ann. Sci. École Normale Sup. **29** (1912) 209–278
- [37] Watanabe, H. - *Solution of the fifth Painlevé equation*, Hokkaido Mayh. J. **24** (1995) 231–267
- [38] Watanabe, H. - *Birational canonical transformations and classical solutions of the sixth Painlevé equation*, Ann. Scuola Norm. Sup. Pisa Cl. Sci. (4) **27** (1998) 379–425

DEPARTAMENT DE MATEMATIQUES, EDIFICI C, UNIVERSITAT AUTONOMA DE BARCELONA, 08 193
BELLATERRA (BARCELONA), SPAIN

URL : <http://www.picard.ups-tlse.fr/~casale>

E-mail address: casale@picard.ups-tlse.fr

E-mail address: casale@mat.uab.es