

Article soumis à la revue *Natures, Sciences, Sociétés* depuis le 05/12/2007

Titre	<b>Ecobilans de biocarburants : une revue des controverses et des enjeux agronomiques mondiaux</b>
Title	Life-Circle-Analyses of Biofuels: from Controversies to Agricultural Challenges
Auteurs	<b>Bruno DORIN et Vincent GITZ</b> Economistes, CIRAD, Umr Cired, 34398 Montpellier, France – Tel +33 (4) 67 61 75 82 – Fax +33 (4) 67 61 44 15 – Email <a href="mailto:bruno.dorin@cirad.fr">bruno.dorin@cirad.fr</a> ; <a href="mailto:gitz@centre-cired.fr">gitz@centre-cired.fr</a> Cet article a été élaboré dans le cadre du projet « Compétition énergie-alimentation dans l'usage des sols : perspectives et viabilité des biocarburants » développé avec un appui financier du Conseil Français de l'Energie (CFE). Il n'engage que ses auteurs et non leur institution ou bailleur de fonds.
Version	05 décembre 2007 (05 December 2007)
Longueur	35 595 caractères (espace compris) + notes (1 671) + bibliographie (14 711)
Résumé	Cette revue d'écobilans de biocarburants synthétise un ensemble de questions soulevées par l'émergence de la production de biocarburants et la place ambitionnée pour ces derniers dans les consommations énergétiques à venir. Elle montre également que les écobilans réalisés à ce jour doivent être approfondis et harmonisés sur certains aspects méthodologiques, et qu'ils demeurent restreints en nombre tout en étant largement centrés sur quelques agro-industries nord-américaines et ouest- européennes. Il serait bénéfique d'élargir ces analyses à d'autres contextes, biomasses et modes agricoles de production pour deux grandes raisons : (1) la recherche de réservoirs durables de bioénergies l'impose, (2) le résultat des écobilans s'avère fortement sensible, d'une part aux techniques agricoles employées (motorisation, intrants chimiques, irrigation) dans des écosystèmes spécifiques (types de climat et de sol), d'autre part aux arbitrages relatifs à la valorisation des coproduits (alimentation animale, amélioration des sols, coproduction d'énergie).
Abstract	This review of Life-Circle-Analyses of biofuels synthesizes a wide range of questions risen by the increasing production of biofuels and by agendas planning to boost the later in future energy consumption. It also shows that current LCA must be deepened or harmonized on certain methodological aspects, and that they remain restricted in number as well as focused on few North-American and West-European agro-industries. It would be beneficial to expand these analyses into other contexts, biomasses and agricultural modes of production for two main reasons: (1) there is hardly other way to explore and identify sustainable reservoirs of bioenergies, (2) the LCA results turns out to be strongly sensitive, on one hand to the agricultural techniques employed (motorization, chemical inputs, irrigation) in specific ecosystems (types of climate and soil), on the other hand to arbitrations relating to the co-products use (animal feed, soil enhancement, co-production of energy).
Mots clefs	Agriculture ; Biocarburant ; Ecobilan ; ACV
Keyword	Agriculture ; Biofuel ; Bioenergy ; Energy crops ; LCA

# *Ecobilans de biocarburants : une revue des controverses et des enjeux agronomiques mondiaux*

## *1. Introduction*

Au milieu des années 2000, l'Agence Internationale de l'Énergie estime qu'environ 1% des surfaces cultivées sont consacrées à la production de biocarburants (liquides) et que ceux-ci substituent dans une proportion similaire notre consommation mondiale de carburants fossiles. A l'avenir, cette part pourrait considérablement augmenter<sup>1</sup>. D'ambitieux plans sont pour cela en œuvre au Brésil, aux Etats-Unis, ou encore en Europe sur la base d'un engagement fort des Etats (Tréguer, 2007). La fourniture agricole et forestière d'énergie n'est pas nouvelle depuis la révolution industrielle (Fernandes *et al.*, 2007), mais pour les biocarburants, divers facteurs avaient jusque là encouragé puis découragé leur développement (Tableau 1). Parmi leurs bénéfices apparents (Tableau 2), deux sont désormais avancés pour légitimer et encourager une croissance soutenue de leur production ici et là dans le monde : (i) réduire la dépendance des économies aux énergies fossiles, (ii) atténuer les émissions anthropiques de gaz à effet de serre (GES).

Dans la communauté scientifique cependant, et comme nous allons le montrer, ces deux points sont encore débattus. Les auteurs impliqués mobilisent pourtant une même méthodologie, celle de l'analyse de cycle de vie (ACV). Cette dernière, aussi appelée « écobilan »<sup>2</sup>, est apparue dans les années 1970 et s'utilise de plus en plus couramment dans l'industrie depuis l'apparition des normes ISO 14040. Elle vise à évaluer (en particulier) les impacts environnementaux d'un produit, d'un service ou d'un procédé, ceci de leur berceau à leur tombe (*cradle-to-grave*) ou, dans les cas rapportés ci-après, du champ (puits) au réservoir (*well-to-tank*) ou à la roue (*well-to-wheel*). La première étape d'une ACV consiste d'abord à définir les objectifs et le champ de l'étude ; on inventorie ensuite les flux (de matières, d'énergies, de services...) qui entrent et sortent du système considéré, puis après traduction de ces derniers en unités appropriées aux objectifs, on procède à l'interprétation des résultats.

Basé sur une revue assez large de la littérature, cet article poursuit un double objectif : (i) rapporter les résultats d'ACV de biocarburants et expliquer leurs divergences relatives à l'économie d'énergie et d'émission de GES, (ii) élargir le débat pour montrer que les ACV de produits agricoles révèlent puissamment à quels enjeux et arbitrages sont dès aujourd'hui exposées les agricultures du Nord et du Sud<sup>3</sup>.

---

<sup>1</sup> Selon l'IPCC, les bioénergies au sens large pourraient techniquement générer 441 EJ an<sup>-1</sup> à l'horizon 2050 (IPCC, 2001a: 244), voire beaucoup plus (Smeets et Faaij, 2007, Smeets *et al.*, 2007), alors qu'en 2002, elle ne fournissent que 46 EJ (13,4% de l'approvisionnement en énergie primaire), dont 70% sous forme de bois, charbon de bois, résidus de récolte et bouses abondamment utilisés tels quels dans les pays du Sud (Sims *et al.*, 2006).

<sup>2</sup> S'il existe des différences de définition entre ACV et écobilan, elles ne sont pas l'objet d'un net consensus

<sup>3</sup> La partition Nord/Sud que nous entérinons ici par facilité d'écriture est assurément réductrice et par là trompeuse ; par « Sud », nous entendons néanmoins un relatif rapprochement en terme d'écosystèmes (tropicaux et subtropicaux) et de revenus (faibles par tête), ceci comparé aux pays du « Nord »...

Tableau 1. Facteurs de développement des biocarburants dans le monde

	Activation	Désactivation
Innovation technique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• La France expérimente l'utilisation d'éthanol de betterave dans les moteurs thermiques qui viennent de naître (XIXe siècle)</li> <li>• En Allemagne, Rudolf Diesel utilise avec succès des huiles végétales dans ses premiers moteurs (XIXe siècle)</li> <li>• La transformation des biomasses ligno-cellulosiques en carburants serait efficace, rentable et significative dès 2010 (IEA, 2004)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Essor de la pétrochimie et développement international de moteurs fonctionnant à l'énergie fossile (XXe siècle)</li> <li>• Accroissement de la population mondiale et de ses besoins alimentaires (XXe siècle)</li> <li>• Mélange problématique carburant + biocarburant : nécessité d'adapter les moteurs au delà d'un pourcentage d'incorporation, ou encore de fabriquer des dérivés comme l'ETBE</li> </ul>
Prix du pétrole	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Crises pétrolières (années 1970) : le baril de pétrole atteint 38\$ en 1982</li> <li>• Guerre en Irak (2002), demande des pays émergents (Chine, Inde...), cyclones, spéculations... : le baril frôle 80 US\$ en juil. 2006, 100 en nov. 2007</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Contre-choc pétrolier (1985)</li> <li>• Utilisation directe et indirecte d'énergies fossiles tout au long des filières biocarburants : controverses sur leurs rendements énergétiques</li> </ul>
Soutien des revenus agricoles	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Le plan <i>Proalcool</i> au Brésil (1975) offre de nouveaux débouchés aux producteurs de canne à sucre (Audinet, 1998)</li> <li>• Le plan <i>Gazohol</i> aux Etats-Unis (années 1980) offre de nouveaux débouchés aux producteurs de maïs, débouchés renforcés par la loi de 2005 sur l'énergie (objectif de 284 Mhl de biocarburants en 2012)</li> <li>• La réforme de la PAC en Europe (1992) autorise des paiements compensatoires aux céréales et oléagineux cultivés à des fins non-alimentaires sur les terres gelées. L'incitation est renforcée en 2004 par une aide de 45 €/ha aux cultures énergétiques implantées en dehors des jachères</li> <li>• Obligation dans certains États de l'Inde (2001) d'incorporer à l'essence de l'éthanol de canne à sucre (5%), culture très subventionnée avec celles du riz et du blé</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Suppression du monopole public à l'exportation et hausse des cours du sucre de consommation (début années 1990)</li> <li>• Conséquences domestiques d'un renchérissement de prix du maïs grain (élevages de porcs, volailles...) et à l'exportation (flambée de prix de la tortilla de maïs au Mexique...) (c. 2006)</li> <li>• Obligation de recombinaison et d'utiliser l'éthanol avec un carburant fossile (ETBE en France)</li> <li>• Limitation en Europe des surfaces en oléagineux alimentaires (5 Mha pour EU15) et non-alimentaire (1 Mt) par le compromis de Blair House (1993)</li> <li>• Différentiel de prix avec les cultures alimentaires</li> <li>• Différentiel de détaxation entre pays</li> </ul>
Lutte contre la pollution de l'air	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Obligation en Europe de commercialiser du carburant sans plomb (1989) et des véhicules pouvant l'utiliser (1991)</li> <li>• Le <i>Clean Air Act</i> aux Etats-Unis (1990) impose, sauf en été, l'adjonction de biocarburants pour limiter dans les métropoles la pollution du CO<sub>2</sub> et de l'ozone</li> <li>• Interdiction du MTBE en Californie (2003) en raison des risques de pollution des nappes phréatiques</li> <li>• Décision en Europe (1998) de renforcer des normes de restriction des émissions en soufre, benzène et aromatique aux horizons 2000 et 2005</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Concurrence de composés oxygénés issus de l'industrie pétrolière : MTBE et TBA</li> </ul>
Lutte contre l'effet de serre	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Conférence de Rio (1992), Protocole de Kyoto (1997) et ses instruments : droits et marchés d'émissions, MDP...</li> <li>• Directive européenne (2003) recommandant des taux d'incorporation de biocarburants dans l'essence et le gasoil de 2% en 2005 et de 5,75% en 2010 (en 2006, la France se fixe un objectif de 5,75% en 2008, 7% en 2010, 10% en 2015)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Prix du carbone peu élevé sur les marchés d'émission (non ratification du protocole de Kyoto par les Etats-Unis)</li> <li>• Controverses sur le bilan effet de serre des biocarburants, et plus généralement sur leur bilan environnemental (eau, biodiversité...)</li> </ul>

Tableau 2. Avantages et inconvénients apparents des biocarburants

Sources : d'après, essentiellement, CES (2004) et IEA (2004)

	Avantages apparents	Inconvénients apparents
Approvisionnement énergétique	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduction des factures pétrolières</li> <li>• Diversification et décentralisation des approvisionnements énergétiques</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Coûts de production et de distribution plus élevés que les hydrocarbures</li> </ul>
Agriculture Alimentation	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Maintien/Amélioration des revenus et/ou emplois agricoles</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pression inflationniste sur le prix des produits agricoles et alimentaires</li> </ul>
Industrie	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Hausse de l'indice d'octane (éthanol) ou de cétane (biodiesel), meilleure lubricité (biodiesel)</li> <li>• Facilité d'utilisation (adaptation plus onéreuse des véhicules et/ou infrastructures au gaz ou à l'électricité)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Moindre pouvoir calorifique</li> <li>• Adaptation nécessaire des véhicules, carburants et/ou infrastructures au-delà de certains seuils d'incorporation, notamment (éthanol) pour palier l'instabilité du mélange avec l'eau, la corrosion plus rapide de certains métaux, l'augmentation de la volatilité et des risques associés</li> </ul>
Environnement	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Réduction des émissions de GES</li> <li>• Réduction des émissions de CO, HC, particules solides (éthanol, biodiesel), SO<sub>2</sub>, benzène, butadiène, isobutène, toluène, xylène (éthanol), soufre, composés aromatiques (biodiesel)</li> <li>• Valorisation de déchets ou sous-produits : résidus de récolte, déchets forestiers ou municipaux, petit-lait, suif, huiles ou graisses alimentaires...</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Encouragement potentiel à la déforestation</li> <li>• Maintien/Accroissement des pollutions par les intrants agricoles, notamment de N<sub>2</sub>O par les engrais azotés</li> <li>• Augmentation des émissions de NO<sub>x</sub> (éthanol, biodiesel), composés organiques volatiles, acétaldéhydes, PAN (éthanol)</li> </ul>

## 2. La consommation énergétique

En première approche, les biocarburants rétrocedent sous forme liquide de l'énergie solaire captée par photosynthèse durant leur fabrication, et non de l'énergie fossile comme l'essence ou le diesel. Cette économie d'énergie fossile doit cependant être minorée par celle qui est mobilisée directement (via tracteurs, camions, usines...) et indirectement (fabrication d'engrais, pesticides, électricité...) pour produire et distribuer le biocarburant. L'ACV offre un cadre pour évaluer cette énergie consommée en amont ( $E_{in}$ ), rapporter cette dernière à l'énergie fournie en aval ( $E_{out}$ ), et comparer le ratio d'efficacité énergétique ainsi obtenu ( $I = E_{in} / E_{out}$ ) avec celui de l'essence ou du diesel. Ainsi, pour ADEME *et al.* (2002),  $I = 0,49$  pour l'éthanol français de blé ou de betterave contre 1,15 pour l'essence, et  $I = 0,33$  pour l'ester de colza ou de tournesol contre 1,09 pour le gazole (Tableau 3). A service égal, les biocarburants économiseraient donc de substantielles quantités d'énergie fossile (57 et 70% en l'occurrence). Divers autres auteurs confirment ces économies, mais dans des mesures généralement plus modestes, et exception faite de Pimentel et Patzek qui concluent que l'essentiel des biocarburants ont un rendement énergétique désastreux (Tableau 4). Au-delà des vives controverses que ces derniers auteurs ont suscité, controverses que certains jugent inutiles non sans argument<sup>4</sup>, ces écarts plus ou moins importants de résultats s'avèrent pour beaucoup reposer sur des choix divergents relatifs, d'une part aux coproduits, d'autre part au périmètre d'analyse.

La production des biocarburants peut en effet générer un ou plusieurs coproduits (Figure 1) valorisés en alimentation animale (tourteau d'oléagineux, drèche de céréale, vinasse...) ou ailleurs (glycérine, électricité...). L'énergie entrée dans le processus ( $E_{in}$ ) ne sert donc pas à produire que du biocarburant. Pour le calcul de  $I$ , il faut alors déduire a priori de  $E_{in}$  la fraction d'énergie mobilisée pour fabriquer ces coproduits. Cette fraction étant généralement inconnue, ADEME *et al.* ont opté pour une méthode d'allocation simple – dite « massique » –

<sup>4</sup> En reprenant des estimations de Farrell *et al.* (2006: Fig. 2), Dale (in AI, 2006: 31-41) déduit en effet qu'en comparaison de l'essence, l'éthanol de maïs américain permet de diviser par 22 la dépendance de la production de carburant au pétrole, puisque ce biocarburant mobilise avant tout pour sa fabrication d'autres formes d'énergie fossile (charbon et gaz en l'occurrence).

consistant à répartir  $E_{in}$  au prorata des masses de produits obtenus en sortie. Quand la masse de coproduits est importante, cela revient donc à affecter à ces derniers l'essentiel de  $E_{in}$  et à améliorer d'autant l'efficacité énergétique  $I$  du biocarburant. Or selon Sourie et al. (2005) ou Sadones (2006), cette méthode n'est acceptable qu'en pétrochimie où les produits obtenus sont de finalité et de densité énergétique similaires. De fait, la grande majorité des ACV de biocarburants optent pour d'autres méthodes d'allocation de  $E_{in}$ . Chacune d'elles est accompagnée d'un lot de critiques (Farrell *et al.*, 2006: supporting online materials, Hecht, 2007, Kavanagh, 2006, Larson, 2005: 117-8, Shapouri, 2002: 9-10, etc.), qu'elles se basent sur le contenu énergétique des coproduits (pouvoir calorifique, calories alimentaires), les résultats d'une modélisation thermodynamique du procédé industriel (type Aspen Plus), les valeurs de marché des coproduits ou leur valeur de remplacement par un substitut, l'énergie dépensée pour produire un substitut (e.g. tourteau de soja pour drèche) ou pour remplacer le coproduit par un substitut. On peut enfin et aussi, comme l'argumentent Patzek ou encore Woods et Bauen (2003), n'accorder aucun « crédit énergétique » aux coproduits. Ces divergences méthodologiques fournissent une première explication à la variabilité des résultats (Tableau 4), résultats tendant néanmoins à montrer que l'efficacité énergétique des biodiesels surpasse celle des actuels éthanol de céréales : ces derniers valorisent encore mal leurs coproduits dans l'alimentation animale, ou dans la cogénération d'énergie à l'instar de l'éthanol brésilien de canne à sucre avec la bagasse (WADE, 2004).

Concernant le périmètre d'analyse, dans les travaux d'ADEME et al. (2002) comme dans ceux de Shapouri (2004) et bien d'autres, il est précisé que les calculs n'intègrent par exemple pas les flux d'énergie fossile dépensée pour produire des facteurs fixes de production tels qu'équipements et bâtiments agricoles. Pour Pimentel et Patzek (2005), et plus modérément Delucci (2004), il s'agit là d'une importante lacune car dans la production américaine de maïs par exemple, une abondance de tracteurs, semoirs, épandeurs, moissonneuses et autres équipements sont mobilisés. Shapouri avait argumenté en 2004 : « l'information dans ce domaine est ancienne et dépassée : Pimentel, dans son rapport de 2003, a utilisé des données de Slessor et Lewis datant de 1979 pour évaluer l'énergie utilisée pour produire de l'acier, de l'acier inoxydable et du ciment ». Si des bases comme Ecoinvent (Frischknecht *et al.*, 2004) actualisent probablement ces données, force est de constater que l'essentiel des actuelles ACV de biocarburants délimitent pour l'instant une frontière de système excluant les facteurs fixes de production agricoles et industriels (Figure 2). Cela pose question, notamment s'il s'agit de comparer ensuite les résultats avec des biocarburants produits au Sud où dominent des agricultures moins capitalistes car beaucoup plus intensives en travail humain et animal. Dans ce dernier cas cependant (traction animale) se poseraient avec plus d'acuité encore les difficultés de calcul liées aux coproduits, ces derniers étant nombreux : production, parallèlement à la force de travail, de lait, de viande, de cuir, de bouses utilisées comme engrais ou combustible, etc. Autant de difficultés qui devraient être surmontées pour évaluer plus justement l'intérêt de biocarburants produits dans des contextes différents, au plan énergétique comme à celui des émissions en GES.

Tableau 3. Bilan énergétique des carburants et biocarburants selon l'ADEME

Source : d'après ADEME et al. (2002)

(mégajoules utilisés par mégajoules fournis)	Pétrole ↓ Essence MTBE	Pétrole ↓ Gazole	Blé Betterave ↓ Ethanol, ETBE	Colza Tournesol ↓ Huile, EMHV
Carburant « simple » (essence, gazole, éthanol ou huile)	1,15	1,09	0,49	0,20
Carburant « élaboré » (MTBE, ETBE ou EMHV)	1,32	-	0,98	0,33
Répartition par phases :				
- Culture « extraction	0,35	0,55	0,10	0,14
- 1 <sup>ère</sup> transformation (en essence, gazole, éthanol ou huile)	0,69	0,44	0,39	0,04
- 2 <sup>ème</sup> transformation éventuelle (en MTBE, ETBE ou EMHV)	0,17	-	0,49	0,13
- Transport	0,12	0,11	(< 5%)	(< 5%)

Figure 1. Processus de fabrication des biocarburants




Figure 2. Choix et possibles options de délimitation d'une ACV sur l'éthanol de maïs

Source : Wang (2005: Fig. 16)




Tableau 4. Bilan énergétique et bilan effet de serre des biocarburants de 1<sup>ère</sup> génération

Biomasse	Auteurs	Année	Région	[1]	[2]	[3]
<b>1. Ethanol</b>						
Maïs (grain)	(GMC <i>et al.</i> , 2001) in (IEA, 2004)	2001	USA	0,50-0,55 (54%)		3100 (USA c.2002)
	Wang in (IEA, 2004)	2001	USA	0,54-0,57 (52%)	32-25%	
	(Shapouri, 2004)	2004	USA	0,57-0,64 (47%)		
	Levelton in (IEA, 2004)	2000	Canada	0,67 (42%)	38%	
	Marland in (IEA, 2004)	1991	USA	0,78 (32%)	21%	
	(Hill <i>et al.</i> , 2006) (Tilman <i>et al.</i> , 2006)	2006	USA	0,80 (30%)	12%	
	(Graboski, 2002)	2002	USA	0,83 (28%)		
	Levy in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004)	1993	UE	0,85-0,95 (22%)	33-30%	
	(Oliveira <i>et al.</i> , 2005)	2005	USA	0,91 (21%)		
	(Pimentel et Patzek, 2005)	2005	USA	1,29 (- 12%)		
(Pimentel, 2001) in (IEA, 2004)	2001	USA	1,65 (- 43%)	- 30%		
Blé (grain)	(Elsayed <i>et al.</i> , 2003) avec références 1996	2003	UE	0,43-0,50 (60%)		2500 (UE c.2002)
	(ADEME <i>et al.</i> , 2002)	2002	UE	0,49 (57%)	60%	
	Levy in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004)	1993	UE	0,81 (30%)	32-35%	
	(Sourie <i>et al.</i> , 2005)	2005	UE	0,84 (27%)		
	(Richards, 2000) in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004)	2000	UE	0,90 (22%)	29%	
	(Punter <i>et al.</i> , 2004)	2004	UE	0,90 (22%)	7-37%	
	ETSU in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004)	1996	UE	0,98 (15%)	47%	
	(Woods et Bauen, 2003)	2003	UE	0,60-1,45 (11%)		
	UE in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004)	1994	UE	1,03 (10%)	19%	
	Gover & al in (Jeuland <i>et al.</i> , 2004)	1996	UE	1,07 (7%)	41%	
UE in (Jeuland <i>et al.</i> , 2004)	1994	UE	1,26 (- 10%)	1%		
Betterave à sucre	(ADEME <i>et al.</i> , 2002)	2002	UE	0,49 (57%)	61%	5500 (UE c.2002)
	(Elsayed <i>et al.</i> , 2003) à partir Kaltschmitt & al 1997	2003	UE	0,45-0,54 (57%)		
	UE in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004)	1994	UE	0,64 (44%)	50%	
	(GM, 2002) in (IEA, 2004)	2002	UE	0,65 (43%)	41%	
	(Woods et Bauen, 2003)	2003	UE	0,62-0,74 (41%)		
	Levy in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004)	1993	UE	0,56-0,84 (39%)	56-35%	
	(Sourie <i>et al.</i> , 2005)	2005	UE	0,78 (32%)		
UE in (Jeuland <i>et al.</i> , 2004)	1994	UE	0,96 (17%)	25%		
Canne à sucre	(Macedo <i>et al.</i> , 2002) in (IEA, 2004)	2002	Brésil	0,12 (90%)	92%	6500 (Brésil c.2002)
	(Oliveira <i>et al.</i> , 2005)	2005	Brésil	0,27 (77%)		
	(Pimentel et Patzek, 2007)	2007	Brésil	0,72 (37%)		
	(Pimentel et Patzek, 2007)	2007	USA	0,89 (23%)		
<b>2. Biodiesel</b>						
Colza (grain)	(ADEME <i>et al.</i> , 2002)	2002	UE	0,33 (70%)	78%	1200 (UE, c.2002)
	(GM, 2002) in (IEA, 2004)	2002	UE	0,33 (70%)	49%	
	(Richards, 2000) in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004)	2000	UE	0,40 (63%)	58%	
	(Elsayed <i>et al.</i> , 2003) à partir Kaltschmitt & al 1997	2003	UE	0,41-0,46 (60%)		
	Sharmer in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004)	1996	UE	0,41-0,55 (56%)	66-56%	
	(Woods et Bauen, 2003)	2003	UE	0,53 (51%)		
	Levy in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004)	1993	UE	0,52-0,57 (50%)	48-44%	
ETSU in (CONCAWE, 2002) in (IEA, 2004)	1996	UE	0,82 (26%)	56%		
Tournesol (grain)	(ADEME <i>et al.</i> , 2002)	2002	UE	0,32 (71%)	83%	1000 (UE, c.2002)
	(Pimentel et Patzek, 2005)	2005	USA	1,96-2,18 (- 90%)		
Soja (fève)	(Hill <i>et al.</i> , 2006) (Tilman <i>et al.</i> , 2006)	2006	USA	0,52 (52%)	41%	500 (USA, c.2002)
	(Pimentel et Patzek, 2005)	2005	USA	1,08-1,27 (- 8%)		
Palmier	Azevedo, Kaltner in (WWI, 2006)	?	?	0,11 (90%)		

Légende :

[1] Energie dépensée / énergie fournie, du champ à la roue en règle générale (entre parenthèses : économie d'énergie par rapport à un ratio de 1,15 pour l'essence et 1,09 pour le gazole d'après ADEME, 2002)

[2] Réduction d'émission de GES (CO<sub>2</sub>, N<sub>2</sub>O et CH<sub>4</sub> en E<sub>q</sub>CO<sub>2</sub>) par kilomètre parcouru, par rapport à un véhicule « classique » (essence ou diesel selon les cas), du champ à la roue en règle générale

[3] Rendement typique en litre de biocarburant par hectare (circa 2002) d'après IEA (2004: 127)

### 3. L'émission de gaz à effet de serre

Après une analyse standardisée de 6 ACV d'éthanol de maïs américain, Farrell et al. (2006) concluent qu'à l'exception de travaux de Pimentel et Patzek, les autres études (celles de Graboski, Oliveira, Wang et Shapouri) montrent une moindre consommation d'énergie fossile par rapport à l'essence alors que l'émission de GES serait quasi identique. A ce dernier niveau, les biodiesels apparaissent bien plus avantageux, à côté de l'éthanol de canne brésilien et sa cogénération d'énergie (Tableau 4). Comme l'expliquent Hill et al. (2006), la filière biodiesel consomme non seulement moins d'énergie fossile émettrice de dioxyde de carbone ( $\text{CO}_2$ ), notamment durant la phase de transformation industrielle (Tableau 3), mais également moins d'intrants agricoles tels que les engrais azotés qui libèrent du protoxyde d'azote ( $\text{N}_2\text{O}$ ) à pouvoir de réchauffement global (PRG) 310 fois supérieur au  $\text{CO}_2$  (23 pour le méthane –  $\text{CH}_4$ ). Mais à cette moindre consommation d'intrants est aussi associée une moindre productivité de carburant par hectare (Tableau 4)<sup>5</sup> : un handicap certain (besoin de terres plus important pour produire autant) que certains relativisent : coproduction d'aliments pour animaux représentant autant d'espace gagné, pouvoir calorifique plus élevé des huiles, etc. Ce débat entre filières révèle une problématique centrale du changement climatique : l'intensification de l'agriculture augmente d'un côté les rendements de biomasse par hectare (photosynthèse plus importante, déforestation évitée...), mais restitue de l'autre des quantités croissantes de GES ( $\text{N}_2\text{O}$  en particulier, via les engrais azotés) auxquelles s'ajoutent généralement ensuite celles considérables de l'élevage (Steinfeld *et al.*, 2006) qu'une partie de cette biomasse permet d'alimenter et de développer. Filières (végétales, animales) et itinéraires techniques (plus ou moins intensifs) ne peuvent donc être pensés indépendamment (CGGREF, 2006). En France, cette combinaison de filières et d'itinéraires conduit l'agriculture, formatée par un système alimentaire en aval et agroindustriel en amont, à une émission de GES représentant 17% des émissions nationales en 2003, voire 26% (devant les transports à 21%) selon le type de comptabilité (CITEPA, 2005a, b: 92). Le résultat de cette combinaison mérite réflexion, réflexion transcendant largement celle aujourd'hui focalisée sur les possibilités de réduction de GES par les biocarburants.

Par delà ces considérations demeure une incertitude notoire sur les estimations de GES agricoles, spécialement de  $\text{N}_2\text{O}$ . Punter et al. (2004) et d'autres soulignent en effet que ces émissions de  $\text{N}_2\text{O}$  impactent fortement le bilan GES global en raison du PRG élevé (310) tout en variant grandement suivant le climat, le type de sol et bien sûr l'itinéraire technique (Tableau 5). Trois grandes options se présentent aujourd'hui pour évaluer ces émissions : (1) extrapoler des résultats de mesures effectuées au champ dans le cadre d'itinéraires et de contextes agro-climatiques tous spécifiques, (2) mobiliser un modèle biophysique alimenté par de telles mesures pour simuler d'autres situations, (3) appliquer méthode et coefficients génériques fournis par l'IPCC (IPCC, 1996, 2001b). Des auteurs ont comparé le résultat de ces options. Pour ADEME (2002) dont l'évaluation de base repose sur des données anglo-saxonnes (Skiba) provenant d'un nombre limité d'essais effectués avant 1996, l'option IPCC conduit à augmenter significativement les émissions de GES des filières biocarburants : +40-50% pour l'ester de colza ou tournesol, et +10-20% pour l'éthanol de blé (pas de changement significatif avec la betterave). Mais CONCAWE (2004) affirme de son côté que la plage d'incertitude des résultats telle qu'indiquée par l'IPCC (1996) peut être largement dépassée dans le cas de mesures au champ (jusqu'à 10 fois la valeur maximum indiquée par l'IPCC).

<sup>5</sup> d'autant plus qu'il est impératif, pour des raisons agronomiques, d'alterner régulièrement les cultures oléagineuses avec d'autres

Son modèle GREASE conduit par ailleurs à des valeurs moyennes d'émission sensiblement supérieures à celles d'études basées sur l'option IPCC, notamment en raison de simulations sur sols très riches en matières organiques. Enfin, par une approche très différente elle aussi sujette à discussion, un prix Nobel de chimie (Crutzen *et al.*, 2007) invite à réviser considérablement à la hausse les coefficients d'émission en N<sub>2</sub>O agricoles de l'IPCC. En attendant, puisque pratiques agricoles et contextes pédoclimatiques déterminent en grande partie le résultat des bilans, Farrell et al. (2006) ou encore Larson (2005) appellent à multiplier études et références en la matière plutôt que tergiverser sur quelques résultats.

Larson insiste également avec Delucchi (2004) sur l'importance d'intégrer les émissions de gaz à effet climatique indirect (NO<sub>x</sub>, CO...) comme l'a par exemple tenté Kadam (2002) en Inde, et plus encore la dynamique du carbone des sols curieusement exclue de la très grande majorité des actuels écobilans de biocarburants. Cette dynamique est affectée par le changement d'occupation des terres (déstockage de carbone après mise en culture de forêts, de pâtures, voire de jachères) qui dépend lui-même des marchés et des politiques, mais aussi par les pratiques culturales, ce qui corrobore l'importance d'intégrer ces dernières dans les réflexions et prospectives relatives au climat. Des auteurs comme McCarl et Schneider (2001) ou Smith et al. (2007) s'y essayent même si l'éventail de données pour conduire de tels exercices demeure pour l'instant limité. Pour Lal (2004), la réduction des émissions de GES – tout comme le plus grand stockage de carbone dans les sols – passe d'abord par le non-labour, la gestion intégrée et économe d'engrais et de pesticides, l'irrigation au goutte-à-goutte ou souterraine (techniques économisant autant l'eau que l'énergie pour la pomper et la distribuer).

Tableau 5. Principaux facteurs d'émissions de GES par l'agriculture

	Emission principale	Commentaires
<b>Changement d'occupation des terres</b>		
<i>Secteur « LULUCF » de IPCC (IPCC, 2003)</i>		
Mise en culture de jachères, de prairies permanentes, de forêts... (par ordre croissant d'impact)	C	- Δ suivant climat et sol - ↘ C <sub>sol</sub> - ↘ C <sub>biomasse</sub> (1 m <sup>3</sup> bois = 1 tonne CO <sub>2</sub> ) - ↘ C <sub>substitution</sub> (e.g. bois de chauffe remplacé par pétrole)
<b>Émissions « agricoles » de l'IPCC</b>		
<i>Secteur « Agriculture » de IPCC (IPCC, 2001b: chapitre 4)</i>		
Brûlage de savane ou déchets agricoles	CO <sub>2</sub>	
Culture de riz	CH <sub>4</sub>	- ↘ avec drainage
Émissions des sols	N <sub>2</sub> O	- Δ suivant climat et sol (↗ avec teneur en MO du sol) - ↗ avec épandage engrais minéraux - ↗ avec pâture d'animaux ou épandage de fumure organique - ↗ avec épandage de résidus - ↗ avec culture de légumineuses
Gestion des déjections animales	CH <sub>4</sub> N <sub>2</sub> O	- ↗ avec température extérieure - Δ suivant pratique (stockage liquide ou solide, épandage journalier ou laissé sur pâture...)
Fermentation entérique	CH <sub>4</sub>	- ↗ avec cellulose de la ration
<b>Autres émissions</b>		
<i>Secteurs IPCC :Energie, Industrie... ou « hors cadre »</i>		
Utilisation d'énergie fossile à la ferme	CO <sub>2</sub>	- Traction, Irrigation, Moisson, Séchage... - Chauffage, Réfrigération...
Production des facteurs de production	CO <sub>2</sub> , N <sub>2</sub> O	- Engrais, Pesticides, Aliments pour animaux..., Énergie - Bâtiments, Matériels...
Transports	CO <sub>2</sub>	- Marchandises, équipement et hommes - En amont voire en aval de la phase de production - Local, national, international

## 4. L'élargissement du débat

Rares sont les écobilans de biocarburants étendant leur analyse à d'autres impacts environnementaux que l'émission directe de GES, et les quelques tentatives dans ce sens, comme celles d'ADEME et al (2002), Blotnitz et Curran (2006) ou Galbraith et al. (2006), se concluent sur beaucoup d'incertitudes ou d'inconnues, que ce soit en terme de consommation en eau<sup>6</sup>, de biodiversité, d'eutrophisation, d'acidification de la basse atmosphère, de destruction de la couche d'ozone ou de pollution photochimique, de toxicité terrestre et aquatique, etc. Mais la phase agricole s'avère ici encore déterminante voire handicapante comparée aux filières fossiles (Zah *et al.*, 2007), ceci alors que méthodes et références pour procéder aux diagnostics agro-environnementaux demeurent incomplètes ou expérimentales (Bochu, 2002, Cunningham *et al.*, 2003, Doublet, 2006, EEA, 2005, Frischknecht *et al.*, 2004, Vilain, 2000, etc.).

Le développement et l'affirmation de ces diagnostics permettraient pourtant – et aussi – de mieux arbitrer la valorisation des résidus de récolte. Leur utilisation à des fins énergétiques est en effet maintenant encouragée, notamment pour améliorer l'efficacité énergétique des filières actuelles d'éthanol de céréales (cf. supra). Ceci nourrit diverses spéculations à l'échelle planétaire (De La Torre Urgate in Hazell et Pachauri, 2006, IEA, 2004: 140, WWI, 2006: 12) d'autant plus que les techniques de transformation des biomasses ligno-cellulosiques pourraient bientôt s'avérer plus performantes et rentables (biocarburants de 2<sup>nd</sup>e génération valorisant la plante entière)<sup>7</sup>. Lal (2005) averti cependant : l'exportation systématique de toutes les biomasses aériennes hypothéquerait la qualité des sols puisque les résidus actuellement laissés sur champ favorisent le stockage de carbone organique, stimulent l'activité et la diversité des faunes souterraines, atténuent l'érosion ou les pollutions, concourent finalement à soutenir des rendements agricoles élevés et durables.

Dans de nombreuses situations au Sud où on oublie fréquemment que la combustion de résidus de récolte par les ménages substituent déjà de l'énergie fossile, ces résidus servent également à alimenter les animaux, pour finalement fournir des produits et services (trait, lait, viande, œufs, cuir, laine, bouse, etc.) au rendement énergétique et à impact écologique peut-être inférieurs aux élevages industriels. Mais les différences de productivité par animal et l'actuelle restriction d'écobilans dans le domaine (Castellini *et al.*, 2006, Meul *et al.*, 2007, Mishra et Dikshit, 2004, Ogino *et al.*, 2007...) ne permettent pas, là encore, de conclure. Elobeid et al. (2006) avertissent parallèlement qu'un développement accentué aux Etats-Unis des surfaces de maïs énergétique se fera au détriment des productions de porc et de volaille, ainsi que des exportations de tourteaux de soja qui alimentent désormais de nombreux élevages dans le monde. Les produits animaux deviendraient donc plus onéreux dans nos assiettes, ce qui amène une question posée par d'autres : peut-on vraiment nourrir correctement et durablement à la fois 9 milliards d'humains à l'horizon 2050 et au moins trois fois plus de têtes en animaux d'élevage<sup>8</sup> (Collomb, 1999, Dorin et Landy, 2002, Griffon, 2006, MEA, 2005, Parmentier, 2007, Smil, 2000) ? Pour Pretty et al. (2005) ou encore Eshel et Martin (2006), nos modes occidentaux d'alimentation sont déjà coûteux pour le climat : aux Etats-Unis, un régime non végétarien émettrait 1 485 kg d'E<sub>q</sub>CO<sub>2</sub> de plus par personne qu'un régime végétarien fournissant la même quantité de calories, soit 6% des émissions nationales

<sup>6</sup> sur le sujet, voir également Bordet et Michez (2006) ou encore Roberts et al. (2007), Fraiture et al. (2007)

<sup>7</sup> pour un exposé approfondi, voir Cormeau et Gosse, in Tréguer (2007)

<sup>8</sup> Selon Faostat, le stock de ces animaux dépasserait 20 milliards de têtes en 2000, dont 3,3 de gros herbivores et/ou ruminants

de GES. N'oublions pas cependant que ces animaux peuvent fournir d'autres services qu'alimentaires (traction, cuir, fertilisants, etc.) tout en valorisant des espaces comme les prairies dont on connaît la grande importance pour les réservoirs en carbone, biodiversité et eau.

Malgré une hausse des coûts de production pour les éleveurs, le développement des biocarburants pourrait globalement profiter à l'agriculture, en retournant durablement la tendance baissière des prix à la ferme observée pendant plusieurs décennies à l'échelle internationale, mais aussi en créant des emplois dans le secteur. Pour la France cependant, le gain économique net du programme biocarburants est questionné par Sourie et al. (2005) avec, pour l'agriculture, un surplus qui s'effondrerait dès que les cultures énergétiques s'étendent des jachères aux actuelles terres alimentaires. Pour les sociétés au Sud, le bilan économique pourrait être plus favorable, notamment parce que la production locale de biocarburants améliorerait l'accès à l'énergie des populations en zones rurales (De La Torre Urgate in Hazell et Pachauri, 2006, Schmidhuber, 2007). Mais ce bénéfice reste suspendu à diverses conditions (Dufey, 2006, Kojima et Johnson, 2005), notamment deux : (i) la non captation des profits par de gros complexes agroindustriels, (ii) l'augmentation concomitante des productivités à l'hectare. A défaut, comme le simulent Rosegrant et al. (in Hazell et Pachauri, 2006) avec le modèle IMPACT de l'IFPRI, les conséquences sur la sécurité alimentaire des populations seraient dramatiques, tout spécialement en Afrique Subsaharienne.

Cette perspective de conflit d'usage des terres entre alimentation et énergie inquiète aussi Rainelli (2007) même si la source ligno-cellulosique devient rentable. Inquiétude partagée par d'autres qui en viennent, pour cette raison et des considérations écologiques, à préconiser le développement des biocarburants sur les terres « marginales » (i.e. de trop faible qualité de sol ou autre pour la production alimentaire) via des espèces herbacées ou arborées nécessitant peu d'intrants (Hill *et al.*, 2006, Oliveira *et al.*, 2005). D'après Tilman et ses collègues (2006), le rendement en bioénergie d'une combinaison de 18 espèces herbacées établies sur des sols peu fertiles ou dégradés serait, après une décennie, 238% supérieur à celui des actuelles productions de biocarburant, ceci avec peu d'engrais et traitements chimiques (cultures « LIHD » pour *Low Input – High Diversity*) et sans éroder la biodiversité des flores et faunes locales.

Lupin, pâturin, fétuque, pourghère (*jatropha*), miscanthus, panic (*switchgrass*) ou combinaison plus sophistiquée d'espèces sur terres marginales : ces solutions ne seront effectives que si leur rentabilité s'avèrent démontrée, pour le paysan comme pour l'industriel dont le bassin d'approvisionnement ne peut être trop dispersé en raison des coûts de transport. Pour l'heure, c'est plutôt une expansion à grande échelle des cultures énergétiques les plus rentables qui s'organise : canne à sucre et soja en Amérique du Sud, huile de palme en Asie du Sud-est. Cette dynamique au Sud encouragée par une demande solvable croissante de biocarburants du Nord ne peut à son tour qu'encourager une déforestation accrue des forêts tropicales, directement ou par effet domino. Or la conservation des forêts tropicales est un élément clef dans la préservation du système climatique (Gitz et Ciais, 2004, Stern, 2006). Pour le bilan (équivalent) carbone, au Brésil, la canne consacrée à la production d'éthanol éviterait d'émettre  $2 \text{ tC ha}^{-1} \text{ an}^{-1}$  (plus de 4 selon Macedo, 1998) alors que la mise en culture d'une forêt tropicale déstocke  $156 \text{ à } 305 \text{ tC ha}^{-1}$  (forêt secondaire / primaire), et que l'afforestation permet de son côté d'emmagasiner  $4 \text{ à } 8 \text{ tC ha}^{-1} \text{ an}^{-1}$  (Righelato et Spracklen, 2007).

## 5. Conclusion

Les actuels écobilans de biocarburants permettent de rapporter un ensemble de questions soulevées par l'émergence et la possible grande extension à venir de ces productions énergétiques. Ces questions sont nombreuses et profondément complexes. Elles le seraient bien moins si ces mêmes écobilans parvenaient à dépasser deux de leurs limites actuelles : (i) des divergences d'ordre méthodologique qui ne facilitent ni la comparaison des résultats, ni leur appropriation par d'autres alors que les économistes – en particulier – gagneraient à les intégrer dans leur raisonnement (Delucchi, 2004) ; (ii) une restriction en nombre qui plus est largement centrée sur quelques agro-industries nord-américaines et ouest-européennes. Cette double restriction est inquiétante s'il s'agit d'identifier ou d'imaginer des systèmes durables de productions bioénergétiques au Nord comme au Sud de la planète, puisque le résultat des écobilans (efficacité énergétique, émissions de GES, etc.) s'avèrent fortement dépendre, d'une part des techniques agricoles employées (motorisation, intrants chimiques, irrigation) dans des écosystèmes donnés (types de climat et de sol), d'autre part d'arbitrages relatifs à la valorisation des coproduits (production animale, qualité des sols, production d'énergie). Il serait donc bénéfique d'élargir grandement ces actuels écobilans à d'autres contextes, biomasses et modes agricoles de production.

En attendant, si les actuelles productions occidentales de biocarburants apparaissent encore peu performantes aux plans énergétique et climatique (en particulier celles issues de cultures céréalières motorisées et intensives en intrants chimiques), il faut leur reconnaître un mérite indéniable : celui d'avoir suscité dans le secteur agricole des analyses et réflexions en terme d'écobilans. C'était urgent. Mais il reste encore énormément à faire dans le domaine pour mieux penser, sous diverses contraintes pédoclimatiques et économiques, ici et là dans le monde, les productions à venir de biomasses alimentaires et non-alimentaires. Une fois le travail plus avancé, on réalisera peut-être et alors que le dernier demi siècle de « modernisations » ou de « révolutions vertes » agricoles, basé sur une énergie fossile bon marché et une quasi absence de préoccupation écologique, nécessitera d'être réformé en profondeur, notamment au plan des itinéraires techniques agricoles : autant d'agricultures à inventer ou redécouvrir, localement, sur la base d'espèces annuelles et arborescentes à judicieusement combiner pour extraire et valoriser durablement les plus grandes quantités possibles de biomasses au mètre carré.

## Bibliographie

- ADEME, DIREM, Ecobilan *et al.*, 2002. Bilans énergétiques et gaz à effet de serre des filières de production de biocarburants en France. Note de synthèse, Agence de l'Environnement et de la Maîtrise de l'Energie, Paris, Décembre, 19 p.
- AI, 2006. A High Growth Strategy for Ethanol, Report of an Aspen Institute Policy Dialogue, The Aspen Institute, Washington D.C., 86 p.
- Audinet P., 1998. L'état entrepreneur en Inde et au Brésil. Economie du sucre et de l'éthanol, L'Harmattan, Paris, 308 p.
- Blotnitz H.v., Curran M.A., 2006. "A review of assessments conducted on bio-ethanol as a transportation fuel from a net energy, greenhouse gas, and environmental life-cycle perspective", Journal of Cleaner Production, (Accepted for Publication: 1 March 2006),
- Bochu J.-L., 2002. PLANETE : Méthode pour l'analyse énergétique de l'exploitation agricole et l'évaluation des émissions de gaz à effet de serre, Solagro, Toulouse, Octobre, 10 p.
- Bordet J., Michez J.-M., 2006. Mise en oeuvre du plan biocarburant au regard de la protection de la ressource en eau, Rapport CGAAER n° 15, IGE/05/055, Inspection générale de l'environnement, Mai, 81 p.
- Castellini C., Bastianoni S., Granai C. *et al.*, 2006. "Sustainability of poultry production using the emergy approach: Comparison of conventional and organic rearing systems", Agriculture, Ecosystems and Environment, 114, pp. 343-50
- CES, 2004. Les débouchés non alimentaires des produits agricoles : un enjeu pour la France et l'Union Européenne, Rapport présenté au nom de la Section de l'Agriculture et de l'Alimentation par Jean-Claude Pasty, Conseil Economique et Social, Paris, 28 avril, 182 p.
- CGGREF, 2006. Gaz à effet de serre, Bioénergies, Agriculture et Forêt : quels enjeux ?, CGGREF infos, Conseil Général du Génie Rural, des Eaux et des Forêts, 1er trimestre, 12 p.
- CITEPA, 2005a. Inventaire des émissions de gaz à effet de serre en France au titre de la Convention Cadre des Nations Unies sur les Changements Climatiques, Rapport national d'inventaire, Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique, Paris, Décembre, 362 p.
- CITEPA, 2005b. Inventaire des émissions de polluants atmosphériques en France. Secten, Rapport d'inventaire national, Centre Interprofessionnel Technique d'Etudes de la Pollution Atmosphérique, Paris, Février, 248 p.
- Collomb P., 1999. Une voie étroite pour la sécurité alimentaire d'ici à 2050, Economica, Paris, 197 p.
- CONCAWE, 2002. Energy and greenhouse gas balance of biofuels for europe - an update, Report 2/02, CONCAWE Ad Hoc Group on Alternative Fuels, Brussels, April, 24 p.
- CONCAWE, 2004. Well-to-Wheels analysis of future automotive fuels and powertrains in the European context, Well to Wheels Report Version 1b, CONCAWE, EUCAR, JRC, Brussels, January, 60 p.
- Crutzen P.J., Mosier A.R., Smith K.A. *et al.*, 2007. "N<sub>2</sub>O release from agro-biofuel production negates global warming reduction by replacing fossil fuels", Atmospheric Chemistry and Physics Discussions, 7, 1 August, pp. 1191-11205
- Cunningham B., Battersby N., Wehrmeyer W. *et al.*, 2003. "A Sustainability Assessment of a Biolubricant", Journal of Industrial Ecology, 7:3-4, pp. 179-92
- Delucchi M.A., 2004. Conceptual and Methodological Issues in Lifecycle Analyses of Transportation Fuels, Report UCD-ITS-RR-04-45 prepared for the The U.S. Environmental Protection Agency Office of Transportation and Air Quality, Institute of Transportation Studies, 22 p.
- Dorin B., Landy F., 2002. Agriculture et alimentation de l'Inde. Les vertes années (1947-2001), Espaces ruraux, INRA Editions, Paris, 248 p.
- Doublet S., 2006. DIALECTE. Diagnostic Agri-environnemental d'exploitation, Solagro, Toulouse, 6 p.
- Dufey A., 2006. Biofuels production, trade and sustainable development: emerging issues, Sustainable Markets Discussion Paper 2, International Institute for Environment and Development, London, September, 63 p.
- EEA, 2005. Agriculture and environment in EU-15. The IRENA indicator report, European Environmental Agency, Copenhagen, 132 p.
- Elobeid A., Tokgoz S., Hayes D.J. *et al.*, 2006. "The Long-Run Impact of Corn-Based Ethanol on the Grain, Oilseed, and Livestock Sectors: A Preliminary Assessment", CARD Briefing Paper, 06-BP 49, November, pp. 1-16

- Elsayed M.A., Matthews R., Mortimer N.D., 2003. Carbon and Energy Balances for a Range of Biofuels Options, Report Project B/B6/00784/REP, URN 03/386, Sheffield Hallam University, Sheffield, March, 341 p.
- Eshel G., Martin A., 2006. "Diet, Energy, and Global Warming", Earth Interactions, 10:9, pp. 1-17
- Farrell A.E., Plevin R.J., Turner B.T. *et al.*, 2006. "Ethanol Can Contribute to Energy and Environmental Goals", Science, 311, 27 January, pp. 506-8
- Fernandes S.D., Trautmann N.M., Streets D.G. *et al.*, 2007. "Global biofuel use, 1850–200", Global Biogeochemical Cycles, 21:GB2019, pp. 1-15
- Fraiture C.d., Giordano M., Yongsong L., 2007. Biofuels and implications for agricultural water use: blue impacts of green energy, Paper, International Water Management Institute, 27 p.
- Frischknecht R., Althaus H.-J., Doka G. *et al.*, 2004. Ecoinvent 2000. Overview and Methodology, Final report 1, Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Duebendorf, 75 p.
- Galbraith D., Smith P., Mortimer N. *et al.*, 2006. Review of Greenhouse Gas Life Cycle Emissions, Air Pollution Impacts and Economics of Biomass Production and Consumption in Scotland, Environmental Research Report SEERAD Project FF/05/08, Scottish Executive Environment and Rural Affairs, Edinburgh, June 09, 267 p.
- Gitz V., Ciais P., 2004. "Future Expansion Of Agriculture and Pasture Acts to Amplify Atmospheric CO2 Levels in Response to Fossil-Fuel and Land-Use Change Emissions", Climatic Change, 67:2-3, December, pp. 161-84
- GM, 2002. GM Well-to-Wheel Analysis of Energy Use and Greenhouse Gas Emissions of Advanced Fuel/Vehicle Systems. A European Study, Full Background Report, GM, BP, ExxonMobil, TotalFinaElf, Ottobrunn, 27 September, 412 p.
- GMC, ANL, BP *et al.*, 2001. Well-to-Wheel Energy Use and Greenhouse Gas Emissions of Advanced Fuel/Vehicle Systems. North American Analysis, General Motors Corporation, Argonne National Laboratory, BP, ExxonMobil, Shell, June, 47 p.
- Graboski M.S., 2002. Fossil Energy Use in the Manufacture of Corn Ethanol, Report prepared for the National Corn Growers Association, Colorado School of Mines, St. Golden, August, 122 p.
- Griffon M., 2006. Nourrir la planète. Pour une révolution doublement verte, Odile Jacob, Paris, 456 p.
- Hazell P., Pachauri R.K., 2006. Bioenergy and Agriculture: Promises and Challenges, 2020 Focus 14, IFPRI, TERI, Washington D.C., December, 28 p.
- Hecht L., 2007. "Smell of Gigantic Hoax in Government Ethanol Promotion", EIR (Executive Intelligence Review), January, pp. 21-6
- Hill J., Nelson E., Tilman D. *et al.*, 2006. "Environmental, economic, and energetic costs and benefits of biodiesel and ethanol biofuels", PNAS, 103:30, July 25, pp. 11206–10
- IEA, 2004. Biofuels for Transport - An International Perspective, International Energy Agency, Paris, 216 p.
- IPCC, 1996. Revised 1996 IPCC Guidelines for National Greenhouse Gas Inventories. Reference Manual (Volume 3), Intergovernmental Panel on Climate Change, <http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gl/invs6.htm>
- IPCC, 2001a. Climate Change 2001: Mitigation, Cambridge University Press, Cambridge, 752 p.
- IPCC, 2001b. Good Practice Guidance and Uncertainty Management in National Greenhouse Gas Inventories, Intergovernmental Panel on Climate Change, [http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/french/gpgaum\\_fr.htm](http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gp/french/gpgaum_fr.htm)
- IPCC, 2003. Good Practice Guidance for Land Use, Land-Use Change and Forestry, Intergovernmental Panel on Climate Change, [http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpplulucf/gpplulucf\\_contents.htm](http://www.ipcc-nggip.iges.or.jp/public/gpplulucf/gpplulucf_contents.htm)
- Jeuland N., Montagne X., Gautrot X., 2004. "Potentiality of Ethanol as a Fuel for Dedicated Engine", Oil & Gas Science and Technology, 59:6, pp. 559-70
- Kadam K.L., 2002. "Environmental benefits on a life cycle basis of using bagasse-derived ethanol as a gasoline oxygenate in India", Energy Policy, 30, pp. 371-84
- Kavanagh E., 2006. "Looking at Biofuels and Bioenergy (Letters edited by)", Science, 312, 23 June, pp. 1743-8
- Kojima M., Johnson T., 2005. Potential for Biofuels for Transport in Developing Countries, ESMAP Reports, World Bank, Washington D.C., October, 182 p.
- Lal R., 2004. "Carbon emission from farm operations", Environment International, 30, pp. 981– 90
- Lal R., 2005. "World crop residues production and implications of its use as a biofuel", Environment International, 31, pp. 575-84
- Larson E.D., 2005. "Liquid Biofuel Systems for the Transport Sector: a Background Paper", GEF/STRAP Workshop on Liquid Biofuels, New Delhi, 29 August - 01 September, 36 p.
- Macedo I.d.C., 1998. "Greenhouse gas emissions and energy balances in bio-ethanol production and utilization in Brazil (1996)", Biomass and Bioenergy, 14:1, pp. 77-81
- Macedo I.d.C., Leal M.R.L.V., Silva J.E.A.R.d., 2002. Greenhouse Gas (GHG) Emissions in the Production and Use of Ethanol Brazil: Present Situation (2002), NIPE, Campinas, December, 47 p.

- McCarl B.A., Schneider U.A., 2001. "Greenhouse Gas Mitigation in U.S. Agriculture and Forestry", Science, 294, 21 December, pp. 2481-2
- MEA, 2005. Ecosystems and Human Well-being: Synthesis, Millennium Ecosystem Assessment, World Resources Institute, Washington D.C., 155 p.
- Meul M., Nevens F., Reheul D. *et al.*, 2007. "Energy use efficiency of specialised dairy, arable and pig farms in Flanders", Agriculture, Ecosystems and Environment, 119, pp. 135-44
- Mishra S.N., Dikshit A.K., 2004. Environment and Livestock in India. With a Comparative Study of The Indian and US Dairy System, Manohar, New Delhi, 196 p.
- Ogino A., Orito H., Shimada K. *et al.*, 2007. "Evaluating environmental impacts of the Japanese beef cow-calf system by the life cycle assessment method", Animal Science Journal, 78, pp. 424-32
- Oliveira M.E.D.D., Vaughan B.E., Rykiel E.J., 2005. "Ethanol as Fuel: Energy, Carbon Dioxide Balances, and Ecological Footprint", BioScience, 55:7, July, pp. 593-602
- Parmentier B., 2007. Nourrir l'humanité. Les grands problèmes de l'agriculture mondiale au XXIe siècle, La Découverte, Paris, 275 p.
- Pimentel D., 2001. "Biomass Utilization, Limits of", in Encyclopedia of Physical Science and Technology, Academic Press, pp. 13 p.
- Pimentel D., Patzek T., 2007. "Ethanol Production: Energy and Economic Issues Related to U.S. and Brazilian Sugarcane", Natural Resources Research, 16:3, September, pp. 235-42
- Pimentel D., Patzek T.W., 2005. "Ethanol Production Using Corn, Switchgrass, and Wood; Biodiesel Production Using Soybean and Sunflower", Natural Resources Research, 14:1, March, pp. 65-76
- Pretty J.N., Ball A.S., Lang T. *et al.*, 2005. "Farm costs and food miles: An assessment of the full cost of the UK weekly food basket", Food Policy, 30, pp. 1-19
- Punter G., Rickeard D., Larivé J.-F. *et al.*, 2004. Well-to-Wheel Evaluation for Production of Ethanol from Wheat, Report FWG-P-04-024, Low Carbon Vehicle Partnership, October, 40 p.
- Rainelli P., 2007. L'avenir des biocarburants et incidences sur l'équilibre des marchés agricoles, Policy Paper 25, Notre Europe, Paris, Mars, 32 p.
- Richards I.R., 2000. Energy balances in the growth of oilseed rape for biodiesel and of wheat for bioethanol., Levington Agriculture Report, British Association for Bio Fuels and Oils, Suffolk, June, 38 p.
- Righelato R., Spracklen D.V., 2007. "Carbon Mitigation by Biofuels or by Saving and Restoring Forests?" Science, 317:907, 17 August, pp. 902
- Roberts M.G., Male T.D., Toombs T.P., 2007. Potential Impacts of Biofuels Expansion on Natural Resources. A Case Study of the Ogallala Aquifer Region, Environmental Defence, New York, 18 p.
- Sadones P., 2006. Les agrocarburants, Rapport EDEN 2006, Energie Durable en Normandie, Yvetot, 10 p.
- Schmidhuber J., 2007. Biofuels: An emerging threat to Europe's Food Security?, Policy Paper, Notre Europe, Paris, May, 40 p.
- Shapouri H., 2002. The Energy Balance of Corn Ethanol: An Update, United States Department of Agriculture, Washington D.C., July, 19 p.
- Shapouri H., 2004. The 2001 Net Energy Balance of Corn-Ethanol (Preliminary), <http://www.bioproducts-bioenergy.gov/pdfs/net%20energy%20balance.pdf>
- Sims R.E.H., Hastings A., Schlamadinger B. *et al.*, 2006. "Energy crops: current status and future prospects", Global Change Biology, 12, pp. 1-23
- Smeets E.M.W., Faaij A.P.C., 2007. "Bioenergy potentials from forestry in 2050. An assessment of the drivers that determine the potentials", Climatic Change, 81, pp. 353-90
- Smeets E.M.W., Faaij A.P.C., Lewandowski I.M. *et al.*, 2007. "A bottom-up assessment and review of global bio-energy potentials to 2050", Progress in Energy and Combustion Science, 33, pp. 56-106
- Smil V., 2000. Feeding the World. A Challenge for the Twenty-First Century, MIT Press, Cambridge, 360 p.
- Smith P., Martino D., Cai Z. *et al.*, 2007. "Policy and technological constraints to implementation of greenhouse gas mitigation options in agriculture", Agriculture, Ecosystems and Environment, 118, pp. 6-28
- Sourie J.C., Tréguer D., Rozakis S., 2005. "L'ambivalence des filières biocarburants", INRA Sciences Sociales, 20:2, Décembre, pp. 1-8
- Steinfeld H., Gerber P., Wassenaar T. *et al.*, 2006. Livestock's long shadow environmental issues and options, Food and Agricultural Organization of the United Nations, Rome, 407 p.
- Stern N., 2006. Stern Review on the economics of climate change, HM Treasury, Cabinet Office, London, 30 October, 671 p.
- Tilman D., Hill J., Lehman C., 2006. "Carbon-Negative Biofuels from Low-Input High-Diversity Grassland Biomass", Science, 314, 8 December, pp. 1598-600
- Tréguer D. (Dir.), 2007. L'avenir à moyen terme des biocarburants : enjeux politiques, économiques, environnementaux et technologiques, Déméter 2008, Club Déméter, Paris, 97-302 p.
- Vilain L. (Dir.), 2000. La méthode IDEA. Indicateurs de durabilité des exploitations agricoles. Guide d'utilisation, Educagri éditions, Dijon

- WADE, 2004. Bagasse Cogeneration. Global Review and Potential, Report, World Alliance for Decentralized Energy, June, 72 p.
- Wang M., 2005. "Updated Energy and Greenhouse Gas Emission Results of Fuel Ethanol", The 15th International Symposium on Alcohol Fuels, San Diego, 26-28 September, 24 p.
- Woods J., Bauen A., 2003. Technology Status Review and Carbon Abatement Potential of Renewable Transport Fuels in the UK, Report B/U2/00785/REP, URN 03/982, Department of Trade and Industry, London, 138 p.
- WWI, 2006. Biofuels for transportation. Global potential and implications for sustainable agriculture and energy in the 21st century. Extended summary, Worldwatch Institute, Washington D.C., June, 38 p.
- Zah R., Böni H., Gauch M. *et al.*, 2007. Ökobilanz von Energieprodukten. Ökologische Bewertung von Biotreibstoffen, Schlussbericht, Empa, St. Gallen, Mai, 206 p.