Effets d'anisotropie par homogénéisation dans un problème à frontière libre

Guy Bayada, Sébastien Martin, Carlos Vazquez

► To cite this version:

Guy Bayada, Sébastien Martin, Carlos Vazquez. Effets d'anisotropie par homogénéisation dans un problème à frontière libre. 2004. hal-00085966

HAL Id: hal-00085966

<https://hal.science/hal-00085966>

Preprint submitted on 17 Jul 2006

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Anisotropic effects by homogenization in a free boundary problem

Effets d'anisotropie par homogénéisation dans un problème à frontière libre

Guy Bayada ^{a,b} Sébastien Martin ^a Carlos Vazquez ^c

^aMAPLY CNRS-UMR 5585, INSA Lyon, Bât. Léonard de Vinci, F-69621 Villeurbanne Cedex, France.

^bLAMCOS CNRS-UMR 5514, INSA Lyon, Bât. D'Alembert, F-69621 Villeurbanne Cedex, France.

^cDepartment of Mathematics, Faculty of Informatics, University of A Coruña, Campus Elviña, 15071-A Coruña, Spain

Abstract

The Elrod-Adams model is a pressure-saturation formulation which takes into account cavitation phenomena in thin fluid films mechanics. We study the asymptotic behavior of the model, using the two-scale convergence technique, in devices such as journal bearings. Interest is highly motivated by the roughness effects of the surfaces. Anisotropic effects appear on the coefficients, which is usual, but also on the saturation function, since various saturation functions appear through the homogenization process.

Résumé

Le modèle d'Elrod-Adams est une formulation en pression-saturation, qui permet de prendre en compte les phénomènes de cavitation en mécanique des films minces. Nous étudions le comportement asymptotique, par homogénéisation double-échelle, de la solution dans des mécanismes lubrifiés de type coussinet, dont l'intérêt est motivé par la prise en compte des rugosités des surfaces. Les effets d'anisotropie apparaissent sur les coefficients, ce qui est classique, mais aussi sur la saturation.

Mots-clés : lubrification ; cavitation ; frontière libre ; homogénéisation double-échelle ; anisotropie

Abridged English version

We consider a bearing involving two rigid surfaces. The space between the surfaces is very thin and filled with some lubricant. In order to take into account cavitation phenomena, we use the Elrod-Adams model, which introduces a saturation function in the right-hand side of the Reynolds equation:

Email addresses: guy.bayada@insa-lyon.fr, [Tel./Fax. : +33 4 72 43 83 12 / 85 29] (Guy Bayada), sebastien.martin@insa-lyon.fr (Sébastien Martin), carlosv@udc.es (Carlos Vazquez).

$$-\nabla \cdot (h^3 \nabla p) = -\frac{\partial}{\partial x_1} (\theta h), \quad p \geq 0, \quad H(p) \leq \theta \leq 1.$$

The gap h is the normalized distance between the two surfaces, (p, θ) is the pressure-saturation, and H is the Heaviside graph. Actually, the saturation denotes the local ratio of liquid fluid between the two surfaces, so that a free boundary separates non-cavitated areas (in which $p > 0$ and $\theta = 1$) from cavitated areas (in which $p = 0$ and $0 \leq \theta \leq 1$). The weak formulation is given by:

$$(\mathcal{P}) \begin{cases} \text{Find } (p, \theta) \in V_a \times L^\infty(\Omega) \text{ such that} \\ \int_{\Omega} h^3 \nabla p \cdot \nabla v \, dx = \int_{\Omega} \theta h \frac{\partial v}{\partial x_1} \, dx, \quad \forall v \in V_0, \\ p \geq 0, \quad H(p) \leq \theta \leq 1 \quad \text{a.e. in } \Omega, \end{cases}$$

the functional spaces being defined as

$$V_a = \left\{ v \in H^1(\Omega), v \text{ is } 2\pi x_1\text{-periodic, } v|_{\Gamma_0} = 0, v|_{\Gamma_a} = p_a \right\},$$

$$V_0 = \left\{ v \in H^1(\Omega), v \text{ is } 2\pi x_1\text{-periodic, } v|_{\Gamma_0} = 0, v|_{\Gamma_a} = 0 \right\},$$

with $\Omega =]0, 2\pi[\times]0, 1[$, $\Gamma_0 =]0, 2\pi[\times \{0\}$, $\Gamma_a =]0, 2\pi[\times \{1\}$ and $p_a > 0$. h is a regular bounded function which is greater than a strictly positive constant. From the techniques used in [4,5], we prove:

Theorem 0.1 *Problem $(\mathcal{P})$ admits at least one solution (p, θ) . Moreover, the pressure p is unique, and if there exists a set of positive measure such that $p(x_1, x_2) > 0$, for almost every $x_2 \in]0, 1[$, then the saturation θ is unique. In particular, if h can be written as $h(x_1, x_2) = h_1(x_1)h_2(x_2)$ (where h_i is a regular bounded function, greater than a strictly positive constant), problem $(\mathcal{P})$ admits a unique solution.*

The homogenization study is motivated by the roughness of the surfaces due to the manufacturing process. Thus the effective gap, denoted $h_\varepsilon(x) = h(x, x/\varepsilon)$, is highly oscillating. Our purpose is to study the behaviour of the problem when ε tends to 0. In Section 1, we state the homogenized problem in a somewhat general case. Anisotropic effects not only appear on the coefficients but also on the saturation:

Theorem 0.2 *There exists a pressure p_0 , two saturation functions Ξ_1, Ξ_2 such that (p_0, Ξ_1, Ξ_2) is a solution of the homogenized problem:*

$$(\mathcal{P}^*) \begin{cases} \text{Find } (p_0, \Xi_1, \Xi_2) \in V_a \times L^\infty(\Omega) \times L^\infty(\Omega) \text{ such that} \\ \int_{\Omega} \mathcal{A} \cdot \nabla p_0 \nabla \phi = \int_{\Omega} \underline{b}^0 \nabla \phi, \quad \forall \phi \in V_0, \\ p_0 \geq 0 \quad \text{et} \quad p_0 \cdot (1 - \Xi_i) = 0, \quad (i = 1, 2) \quad \text{a.e. in } \Omega, \end{cases}$$

with $\mathcal{A} = \begin{pmatrix} a_{11}^* & a_{12}^* \\ a_{21}^* & a_{22}^* \end{pmatrix}$, $\underline{b}^0 = \begin{pmatrix} \Xi_1 b_1^* \\ \Xi_2 b_2^* \end{pmatrix}$, the coefficients a_{ij}^* and b_i^* being given in definition 1.5.

It is obvious that the homogenized problem is not so clear since we are unable to prove that the two saturation functions belong to $[0, 1]$ in cavitated areas. However we can prove that the homogenized problem has a particular solution with an isotropic saturation belonging to $[0, 1]$, that is:

Theorem 0.3 *$(\mathcal{P}^*)$ admits at least one solution (p_0, Ξ, Ξ) satisfying $H(p_0) \leq \Xi \leq 1$.*

In Section 2, we treat some particular case, i.e. the oblique roughness case, in which two different saturation functions belonging to $[0, 1]$ appear. Interestingly, the transverse / longitudinal roughness case is derived from the previous description and appears to be well posed. At last, in Section 3, a numerical simulation illustrates the behaviour of both pressure and saturation when ε tends to 0.

1. Homogénéisation du modèle d'Elrod-Adams - Cas général

Hypothèse 1 Soient $Y =]0, 1]^2$, a et b deux fonctions définies sur $\Omega \times \mathbb{R}^2$, appartenant à $L^2(\Omega; C(Y))$ ou $L^2(Y; C(\Omega))$, Y -périodiques, bornées, supérieures à une constante strictement positive.

Définition 1.1 Soient a_ε et b_ε définies sur Ω par $a_\varepsilon(x) = a\left(x, \frac{x}{\varepsilon}\right)$ et $b_\varepsilon(x) = b\left(x, \frac{x}{\varepsilon}\right)$. Soit le problème

$$(\mathcal{P}_\varepsilon) \begin{cases} \text{Trouver } (p_\varepsilon, \theta_\varepsilon) \in V_a \times L^\infty(\Omega) \text{ tel que} \\ \int_\Omega a_\varepsilon \nabla p_\varepsilon \cdot \nabla v \, dx = \int_\Omega \theta_\varepsilon b_\varepsilon \frac{\partial v}{\partial x_1} \, dx, \quad \forall v \in V_0, \\ p_\varepsilon \geq 0, \quad H(p_\varepsilon) \leq \theta_\varepsilon \leq 1 \quad \text{p.p. dans } \Omega. \end{cases}$$

Lemme 1.2 Il existe $(p_0, p_1, \theta_0) \in V_a \times L^2(\Omega; H_\#^1(Y)/\mathbb{R}) \times L^2(\Omega \times Y)$ tel que $(p_\varepsilon, \nabla p_\varepsilon, \theta_\varepsilon)$ converge double-échelle, à une sous-suite près, vers $(p_0, \nabla p_0 + \nabla_y p_1, \theta_0)$.

Preuve Les convergences sont issues d'estimations a priori indépendantes de ε (voir [1,10,11]), en norme H^1 pour la pression, en norme L^2 pour la saturation.

En choisissant des fonctions tests particulières dans le problème $(\mathcal{P}_\varepsilon)$ (voir [1,11]), on établit :

Proposition 1.3

- Equation macroscopique : pour tout ϕ appartenant à V_0 ,

$$\int_\Omega \left(\int_Y a \left[\nabla p_0 + \nabla_y p_1 \right] dy \right) \cdot \nabla \phi \, dx = \int_\Omega \left(\int_Y \theta_0 b \, dy \right) \frac{\partial \phi}{\partial x_1} \, dx. \quad (1)$$

- Equation microscopique : pour presque tout $x \in \Omega$, pour tout ψ appartenant à $H_\#^1(Y)$ (voir [1,11] pour la définition de $H_\#^1(Y)$),

$$\int_Y a \left[\nabla p_0 + \nabla_y p_1 \right] \cdot \nabla_y \psi \, dy = \int_Y \theta_0 b \frac{\partial \psi}{\partial y_1} \, dy. \quad (2)$$

Définition 1.4 Les problèmes locaux (resp. notés $(\mathcal{M}_i^*)$, $(\mathcal{N}_i^*)$ et $(\mathcal{N}_i^0)$, $i = 1, 2$) sont ainsi définis :

$$\begin{cases} \text{Trouver } W_i^*, \chi_i^*, \chi_i^0 \in L^2(\Omega; H_\#^1(Y)/\mathbb{R}) \text{ tels que, pour presque tout } x \in \Omega, \text{ pour tout } \psi \in H_\#^1(Y), \\ \int_Y a \nabla_y W_i^* \nabla_y \psi = \int_Y a \frac{\partial \psi}{\partial y_i}, \quad \int_Y a \nabla_y \chi_i^* \nabla_y \psi = \int_Y b \frac{\partial \psi}{\partial y_i}, \quad \int_Y a \nabla_y \chi_i^0 \nabla_y \psi = \int_Y \theta_0 b \frac{\partial \psi}{\partial y_i}. \end{cases}$$

Définition 1.5 $a_{i,j}^* = \widetilde{a} \, \delta_{ij} - \left[a \frac{\partial W_j^*}{\partial y_i} \right]$, $b_i^* = \widetilde{b} \, \delta_{1i} - \left[a \frac{\partial \chi_i^*}{\partial y_i} \right]$, avec $\widetilde{f}(x) = \int_Y f(x, y) \, dy$.

Nous établissons la preuve du théorème 0.2, qui décrit le problème homogénéisé :

Preuve du théorème 0.2 On montre, par les techniques d'éclatement périodique [10], à partir des propriétés des solutions $(p_\varepsilon, \theta_\varepsilon)$, que $p_0 \geq 0$ et $H(p_0) \leq \theta_0 \leq 1$ p.p. dans $\Omega \times Y$. Par ailleurs, le problème local $(\mathcal{M}_i^*)$ (resp. $(\mathcal{N}_i^*)$, $(\mathcal{N}_i^0)$) admet une unique solution W_i^* (resp. χ_i^* , χ_i^0). Par suite, on obtient

$$p_1(x, y) = - \begin{pmatrix} W_1^*(x, y) \\ W_2^*(x, y) \end{pmatrix} \cdot \nabla p_0(x) + \chi_1^0(x, y), \quad \text{dans } L^2(\Omega; H_\#^1(Y)/\mathbb{R}).$$

Le problème homogénéisé est obtenu en remplaçant p_1 par l'expression ci-dessus dans l'équation macroscopique (1), et en définissant les quantités

$$b_i^0 = \widetilde{(\theta_0 b)} \, \delta_{1i} - \left(a \frac{\partial \chi_1^0}{\partial y_i} \right), \quad b_i^* = \widetilde{b} \, \delta_{1i} - \left(a \frac{\partial \chi_1^*}{\partial y_i} \right) \quad \text{et} \quad \Xi_i = b_i^0 / b_i^*.$$

Remarque 1 Dans les zones non-cavites (i.e. $p_0 > 0$, $\Xi_i = 1$), nous obtenons l'quation de Reynolds homognise classique [6,8]. Cependant :

- (a) la proprit ($H(p_0) \leq \Xi_i \leq 1$) n'est pas garantie, i.e. nous ne savons pas montrer que les fonctions de saturation homognises sont infrieures 1 dans les zones de cavitation ! Nous montrons dans la section 2 qu'il est possible, sous des hypothses supplmentaires, de dpasser ces difficults partiellement ou compltement. Par ailleurs, les techniques utilises pour le problme ($\mathcal{P}$) ne permettent plus d'tablir un rsultat d'unicit pour ($\mathcal{P}^*$),
- (b) des algorithmes permettent la rsolution numrique du problme ($\mathcal{P}$) (voir [3,7]), mais ne permettent pas de construire une solution de ($\mathcal{P}^*$) avec deux fonctions de saturation distinctes.

Le thorme 0.3 tablit, parmi les solutions de ($\mathcal{P}^*$), l'existence d'une solution (p_0, Ξ, Ξ) satisfaisant la proprit $H(p_0) \leq \Xi \leq 1$:

Preuve du thorme 0.3 On introduit un problme pnalis ($\mathcal{P}_\eta$), dans lequel la saturation θ est remplace par $H_\eta(p)$, o H_η est une approximation du graphe de Heaviside, par exemple

$$H_\eta(z) = \chi_{] \eta, +\infty[}(z) + \frac{z}{\eta} \chi_{[0, \eta]}(z).$$

Le rsultat est obtenu par homognsation de ($\mathcal{P}_\eta$), puis passage la limite sur le paramtre de pnalisation.

2. Cas particulier : rugosits obliques

En homognsation, la sparation des variables microscopiques permet classiquement d'obtenir des rsultats significatifs ; l'hypothse suivante est inspire de cette remarque.

Hypothse 2 Soit $\alpha \in \mathbb{R}$, a_ε et b_ε deux fonctions telles que

$$\forall x \in \Omega, \begin{cases} a_\varepsilon(x) = a_1 \left(x, \frac{X_1^\alpha(x)}{\varepsilon} \right) a_2 \left(x, \frac{X_2^\alpha(x)}{\varepsilon} \right), \\ b_\varepsilon(x) = b_1 \left(x, \frac{X_1^\alpha(x)}{\varepsilon} \right) b_2 \left(x, \frac{X_2^\alpha(x)}{\varepsilon} \right), \end{cases} \quad \text{avec} \begin{cases} X_1^\alpha(x) = \cos \alpha \, x_1 + \sin \alpha \, x_2, \\ X_2^\alpha(x) = -\sin \alpha \, x_1 + \cos \alpha \, x_2, \end{cases}$$

les fonctions a_i et b_i tant bornes, suprieures une constante strictement positive.

Thorme 2.1 Sous l'hypothse 2, le problme homognis est ainsi dfini :

$$(\mathcal{P}^*) \begin{cases} \text{Trouver } (p_0, \Xi_1, \Xi_2) \in V_a \times L^\infty(\Omega) \times L^\infty(\Omega) \text{ tel que} \\ \int_\Omega \mathcal{A} \cdot \nabla p_0 \nabla v \, dx = \int_\Omega \underline{b}_1^0 \frac{\partial v}{\partial x_1} \, dx + \int_\Omega \underline{b}_2^0 \frac{\partial v}{\partial x_2} \, dx, \quad \forall v \in V_0, \\ p_0 \geq 0, \quad H(p_0) \leq \Xi_i \leq 1, \quad (i = 1, 2) \quad \text{p.p. dans } \Omega \end{cases}$$

avec les expressions

$$\begin{aligned} \mathcal{A}(x) &= \begin{pmatrix} a_1^*(x) & 0 \\ 0 & a_2^*(x) \end{pmatrix} + (a_1^*(x) - a_2^*(x)) \sin \alpha \begin{pmatrix} -\sin \alpha \cos \alpha \\ \cos \alpha \sin \alpha \end{pmatrix}, \\ \underline{b}_1^0(x) &= -\left(b_1^*(x) \Xi_1(x) - b_2^*(x) \Xi_2(x) \right) \sin^2 \alpha + b_1^*(x) \Xi_1(x), \\ \underline{b}_2^0(x) &= \left(b_1^*(x) \Xi_1(x) - b_2^*(x) \Xi_2(x) \right) \sin \alpha \cos \alpha, \end{aligned}$$

et les coefficients homogénéisés ($i, j = 1, 2$ et $j \neq i$) : $a_i^* = \frac{\widetilde{a_j}}{\widetilde{a_i^{-1}}}$ et $b_i^* = \frac{1}{\widetilde{a_i^{-1}}} \left(\frac{\widetilde{b}}{a_i} \right)$

De plus, (p_0, θ_0) étant la limite double-échelle de $(p_\varepsilon, \theta_\varepsilon)$ (solution du problème $(\mathcal{P}^\varepsilon)$), le problème $(\mathcal{P}^*)$ admet une solution (p_0, Ξ_1, Ξ_2) , avec

$$\Xi_i = \frac{1}{\left(\frac{\widetilde{b}}{a_i} \right)} \left(\frac{\widetilde{\theta_0 b}}{a_i} \right), \quad i = 1, 2. \quad (3)$$

Preuve La démonstration s'effectue en trois étapes : 1- Réécriture du problème $(\mathcal{P}_\varepsilon)$ dans le système de coordonnées $X^\alpha = (X_1^\alpha, X_2^\alpha)$, 2- Homogénéisation du problème dans le système de coordonnées X^α , 3- Réécriture du problème homogénéisé dans le système de coordonnées initial.

Remarque 2 L'hypothèse 2 permet de poser un problème homogénéisé dans lequel apparaissent deux fonctions de saturation distinctes satisfaisant la propriété $H(p_0) \leq \Xi_i \leq 1$. Par ailleurs, dans le cas des rugosités transverses et/ou longitudinales ($\alpha = k\pi/2$, $k \in \mathbb{Z}$), le problème homogénéisé est un problème de Reynolds généralisé dans lequel n'intervient qu'une seule fonction de saturation et pour lequel on peut obtenir des résultats d'unicité.

Remarque 3 Une démarche initiale "naïve" consisterait à tenter de déterminer une équation limite satisfaite par les limites faibles de $(p_\varepsilon, \theta_\varepsilon)$ (en norme H^1 pour la pression, L^2 pour la saturation), i.e. (p_0, θ_0) . Or, si la limite faible de la pression intervient effectivement dans l'équation homogénéisée, ce n'est pas la limite faible de la saturation qui joue le rôle de saturation macroscopique : l'équation (3) montre en effet que les saturations limites Ξ_i sont des moyennes de θ_0 pondérées par l'influence des rugosités, même lorsque le problème est bien posé. Cette équation traduit l'anisotropie sur les fonctions de saturation, et donne un lien explicite entre ces fonctions - macroscopiques - et la saturation microscopique θ_0 .

Remarque 4 La formulation du problème de la digue pour des configurations géométriques générales, introduite dans [2,9], est similaire à celle du problème de lubrification. Il est possible d'homogénéiser le problème afin de prendre en compte l'influence de couches stratifiées (coefficient de perméabilité variable et oscillant). L'analyse de configurations avec des strates obliques fait également apparaître des phénomènes de double saturation. Dans le cas -plus général- où la perméabilité est décrite par une matrice non diagonale, il est possible d'établir la non-convergence des zones non-saturées [12].

3. Un exemple de résultat numérique

Un des enjeux est de savoir si la saturation microscopique θ_0 dépend effectivement de la variable y . En effet, si ce n'est pas le cas, il est facile de conclure à l'isotropie des saturations homogénéisées (i.e. $\Xi_1 = \Xi_2$). Néanmoins, les simulations numériques indiquent que cette hypothèse ne peut être retenue (voir FIG. 1).

Les simulations de la FIG. 1 correspondent à un régime de fonctionnement réaliste pour un coussinet [7]. On compare la solution homogénéisée avec les solutions associées à des rugosités transverses ($\varepsilon = 1/N = 1/30, 1/80$). Une coupe est effectuée à x_2 fixé (afin d'observer les effets d'oscillations dans la direction x_1) et permet d'illustrer la convergence de la pression ainsi que le comportement de la saturation. La convergence forte de la pression dans $L^2(\Omega)$ est évidente (l'amplitude des oscillations diminue) et il est

FIG. 1. Pression-saturation - solutions rugueuses et homogénéisée

clair que θ_ε converge dans $L^2(\Omega)$ seulement en un sens faible; en particulier, l'amplitude du gradient explose quand ε tend vers 0, indiquant que $\theta_0(x, y)$ dépend effectivement de la variable y .

Remerciements

Nous remercions F. Murat pour les fructueuses discussions sur le sujet.

Références

- [1] G. Allaire, Homogenization and two-scale convergence. *SIAM J. Math. Anal.*, 23(6) :1482–1518, 1992.
- [2] H.W. Alt, Strömungen durch inhomogene poröse Medien mit freiem Rand. *J. Reine Angew. Math.*, 305 :89–115, 1979.
- [3] H.W. Alt, Numerical solution of steady-state porous flow free boundary problems. *Numer. Math.*, 36(1) :73–98, 1980/81.
- [4] S.J. Alvarez, R. Oujja, On the uniqueness of the solution of an evolution free boundary problem in theory of lubrication. *Nonlinear Anal.*, 54(5) :845–872, 2003.
- [5] S.J. Alvarez, J. Carrillo, A free boundary problem in theory of lubrication. *Comm. Partial Differential Equations*, 19(11-12) :1743–1761, 1994.
- [6] G. Bayada, M. Chambat, Homogenization of the Stokes system in a thin film flow with rapidly varying thickness. *RAIRO Modél. Math. Anal. Numér.*, 23(2) :205–234, 1989.
- [7] G. Bayada, M. Chambat, C. Vazquez, Characteristics method for the formulation and computation of a free boundary cavitation problem. *J. Comput. Appl. Math.*, 98(2) :191–212, 1998.
- [8] G. Bayada, J.B. Faure, A double-scale analysis approach of the Reynolds roughness. Comments and application to the journal bearing. *ASME J. of Tribology*, 111 :323–330, 1989.
- [9] H. Brezis, D. Kinderlehrer, G. Stampacchia, Sur une nouvelle formulation du problème de l'écoulement à travers une digue. *C. R. Acad. Sci. Paris Sér. A-B*, 287(9) :A711–714, 1978.
- [10] D. Cioranescu, A. Damlamian, G. Griso, Periodic unfolding and homogenization. *C. R. Math. Acad. Sci. Paris*, 335(1) :99–104, 2002.
- [11] D. Lukkassen, G. Nguetseng, P. Wall, Two-scale convergence. *Int. J. Pure Appl. Math.*, 2(1) :35–86, 2002.
- [12] J.F. Rodrigues, Some remarks on the homogenization of the dam problem. *Manuscripta Math.*, 46(1-3) :65–82, 1984.