Comportement alimentaire de chèvres pâturant une suberaie emmaquée

Jp Goby, Jj Rochon

► To cite this version:

Jp Goby, Jj Rochon. Comportement alimentaire de chèvres pâturant une suberaie emmaquée. Annales de zootechnie, 1994, 43 (3), pp.294-294. hal-00889033

HAL Id: hal-00889033

<https://hal.science/hal-00889033>

Submitted on 1 Jan 1994

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Comportement alimentaire de chèvres pâturent une suberaie emmaquisée

JP Goby, JJ Rochon

Laboratoire des agroressources méditerranéennes, université de Perpignan,
chemin de la Passio-Viella, 66025 Perpignan, France

La compréhension du comportement alimentaire de chèvres utilisant une suberaie envahie par le maquis permet de gérer leur pâturage sur ce territoire afin à la fois de mieux les nourrir et d'entretenir des zones sensibles aux incendies.

Les observations sont réalisées sur un troupeau de 60 chèvres laitières de race Alpine chamoisée et Saanen, en piémont du massif des Albères (Pyrénées-Orientales). Ces animaux pâturent des parcs clôturés formés d'une partie non débroussaillée, et d'une zone débroussaillée et enherbée. La composition de la ration prélevée et les quantités ingérées sont estimées par la méthode des coups de dents (Bourbouze, 1980) sur un échantillon de 12 chèvres. Trois chèvres issues du troupeau ont été équipées de fistules ruminales. L'évolution de la dégradabilité dans le rumen des 2 aliments ligneux les plus consommés (*Erica arborea*, *Quercus suber*) est suivie selon la méthode *in sacco* (Demarquilly et Chenost, 1969). Le témoin utilisé est la paille traitée à l'ammoniaque. Les mesures ont été répétées 4 fois en relation avec les modifications de la ration : en automne au début (novembre) et à la fin (décembre) de l'exploitation d'un parc emmaquisé avec des bruyères arborescentes, chênes-lièges et autres, et pauvre en plantes herbacées ; en mars après la chute des glands ; en mai avec une offre diversifiée d'aliments d'origine arbustive et herbacée.

Pendant la période de chute des glands ou de croissance rapide de l'herbe, les animaux consomment ces ressources de qualité de préférence aux aliments plus lignifiés. Les quantités ingérées sont importantes (tableau I). Avec la raréfaction de l'offre herbacée ou concentrée, la part des ligneux dans la ration augmente. L'ingestion est d'autant plus élevée que : i) la teneur en fibre est faible et la teneur en azote élevée, teneurs connues pour modifier la digestibilité et l'ingestibilité des rations; ii) l'appétibilité des plantes présentes est élevée, comme l'indique la diminution des quantités ingérées avec la dis-

parition des espèces préférées durant le séjour sur une parcelle.

La dégradabilité ruminale de la matière sèche des ligneux montre une activité des microorganismes accrue au mois de mai, vraisemblablement du fait de la forte teneur en azote fermentescible des jeunes pousses des arbustes et de l'herbe. En mars, la consommation de glands entraîne une diminution de la teneur en fibre de la ration qui provoque une baisse durable du pH ruminal de 1 point. La dégradabilité des ligneux et de la paille traitée est sensiblement réduite.

Bourbouze A (1980) *Fourrages* 82, 121-144

Demarquilly C, Chenost M (1969) *Ann Zootech* 18, 419-436

Tableau I. Caractéristiques de la ration ingérée et dégradabilité des aliments ligneux.

	Novembre	Décembre	Mars	Mai
<i>Composition botanique de la ration ingérée (% MS)</i>				
Bruyère	59	95	0	39
Chêne	27	0	0	17
Autres ligneux	14	5	1	7
Herbacées	0	0	32	37
Glands	0	0	67	0
<i>Quantité ingérée</i>				
MS (g/j)	1300	490	1340	1100
MAT (%)	7	6	10	9
NDF (%)	56	58	11	54
MAT/NDF	0,12	0,10	0,88	0,16
<i>Dégradabilité 48 h in sacco (%)</i>				
Bruyère	40,6	41,2	29,7	47,8
Chêne	38,8	—	31,7	54,6
Paille NH ₃	58,1	71,1	36,6	53,7