



Effet de l'addition de Lithioxine sur la croissance des génisses nourries à l'ensilage de prairie naturelle

Jf Chesnel, Jp Andrieu

► To cite this version:

Jf Chesnel, Jp Andrieu. Effet de l'addition de Lithioxine sur la croissance des génisses nourries à l'ensilage de prairie naturelle. Annales de zootechnie, 1995, 44 (Suppl1), pp.98-98. hal-00889262

HAL Id: hal-00889262

<https://hal.science/hal-00889262>

Submitted on 11 May 2020

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Effet de l'addition de Lithioxine sur la croissance des génisses nourries à l'ensilage de prairie naturelle

JF Chesnel ¹, JP Andrieu ²

¹Néolait-Codislaït, Direction Technique et Recherche, 22120 Yffiniac ; ²INRA, Laboratoire Valeur Alimentaire, Theix, 63122 St-Genès-Champagnelle, France

Dans les régions où la prairie naturelle constitue l'essentiel des ressources fourragères, la qualité de conservation des ensilages directs est souvent insuffisante. Elle peut être améliorée par l'addition de conservateur (JP Andrieu *et al*, 1990, INRA Prod Anim, 3, 67-73).

Trois ensilages ont été préparés à partir d'une même prairie naturelle récoltée au 1er cycle de végétation, en coupe directe, au domaine INRA d'Orcival (F 63210 Rochefort-Montagne) à 1 000 m d'altitude. Les remorques ont été alternées pour chaque traitement : sans conservateur (T0), addition d'acide formique (2/3) + formol (1/3) à la dose de 3,4 l/t de fourrage vert (T1), addition de Lithioxine (formiate de calcium 39 %, nitrite de sodium 23 %, hexaméthylène tétramine 14 %) à la dose de 2 kg/tonne (T2).

Trois lots de 12 génisses de race laitière (Holstein) pesant en moyenne 300 kg ont été constitués et maintenus en stabulation libre dans les mêmes conditions pendant la durée des 9 semaines d'expérience. Pendant l'essai, chaque ensilage a été distribué seul avec un aliment minéral.

Dans l'ensilage T0, la fermentation lactique est dominée par les fermentations productrices d'acide acétique et d'alcool. L'abaissement lent et insuffisant du pH et l'action de la flore butyrique ont favorisé la protéolyse. L'incorporation d'acide formique-formol et de Lithioxine permet une nette amélioration de la qualité de la conservation.

Les quantités de matière sèche, ingérées par les génisses, ne sont pas sensiblement différentes entre traitements. En revanche, le gain de poids vif des génisses ayant reçu l'ensilage sans conservateur est significativement inférieur ($P < 0,05$) à ceux des génisses ayant reçu les ensilages avec conservateur T1 et T2.

L'efficacité alimentaire, qui peut être appréciée par le gain de poids vif par kg de MS ingérée, a été respectivement de 85 g, 120 g et 110 g pour les ensilages T0, T1 et T2. La valeur azotée des ensilages a conditionné pour une large part leur valorisation par les génisses. Compte tenu de son efficacité et des avantages liés à son utilisation (produit solide distribué avec un micro granulateur), la Lithioxine enrichit la gamme des conservateurs d'ensilage.

	T0	T1	T2
<i>Ensilages</i>			
teneur en MS (%)	18,3	20,5	19,5
pH	4,62	3,82	4,0
N soluble (% N total)	67,1	54,4	59,3
acide lactique (g/kg MS)	18,9	69,2	86,4
acide acétique (g/kg MS)	76,5	27,5	40,5
acide butyrique (g/kg MS)	2,1	1,0	1,1
alcools totaux (g/kg MS)	31,5	9,4	11,3
<i>Génisses :</i>			
quantités ingérées (kg MS/jour)	7,03	7,38	7,44
gain de poids vif (g/jour)	595 ^a (± 137)	895 ^b (± 142)	806 ^b (± 145)

Valeurs ^a et ^b différentes à $P < 0,05$