La pyramide de Kheops et quelques équations du quatrième degré

Aimé Lachal

► To cite this version:

Aimé Lachal. La pyramide de Kheops et quelques équations du quatrième degré. *Quadrature*, 2008, 69, pp.36-47. 10.1051/quadrature:2008004 . hal-01362047

HAL Id: hal-01362047

<https://hal.science/hal-01362047>

Submitted on 8 Sep 2016

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

La pyramide de Kheops et quelques équations du quatrième degré

par Aimé Lachal*

I Prologue

Dans un article publié dans l'édition française de la revue australienne Nexus [2], James Colmer présentait une hypothèse originale sur la fonction de la pyramide de Kheops et sur l'existence présumée d'un ensemble de galeries et chambres cachées, symétriques à celles connues. La démarche de J. Colmer, dans sa recherche, passait par un tracé géométrique impliquant une certaine valeur de l'angle formé par la face de la pyramide avec sa base horizontale et la triple intersection d'une circonférence avec deux segments de droites spécifiques.

André Dufour, traducteur pour Nexus France et architecte de métier, ayant eu la charge de traduire cet article, s'aperçut après avoir refait sur ordinateur le tracé géométrique de J. Colmer que ce dernier était faux. Cela n'enlevait rien à l'intérêt de l'hypothèse de J. Colmer, objet principal de l'article, mais posait un problème intéressant de géométrie. Après en avoir fait une note de traducteur publiée simultanément avec l'article traduit de J. Colmer, plusieurs lecteurs, F. De Ligt, J.-F. Pioche et l'auteur du présent article, réagirent au problème en fournissant des valeurs exactes pour l'angle mis en cause par le biais de diverses méthodes calculatoires. Les calculs de F. De Ligt et J.-F. Pioche ont été partiellement rassemblés et commentés par A. Dufour et publiés dans une courte note [3].

Par une démarche empirique, A. Dufour tenta une construction graphique à l'aide d'un logiciel de dessin vectoriel afin d'obtenir la position du sommet de la pyramide requise par la théorie de J. Colmer. Cette approche, qu'il a soumise à l'auteur, repose sur la

construction d'une courbe en polyligne lissée dont l'intersection avec une droite adéquate fournit avec une excellente précision la position du sommet recherché. Il apparaîtra ultérieurement qu'en fait deux sommets conviendront. La figure 19 (qui est l'un des deux graphiques principaux de cet article) correspondant au sommet le plus bas est, à une symétrie près, le tracé initialement proposé par A. Dufour. En adaptant cette construction au cas du sommet le plus élevé, on obtient dans le même esprit le deuxième graphique principal de ce travail, à savoir la figure 20.

Par une approche analytique, l'auteur prouvera alors que la construction d'A. Dufour est parfaitement exacte. Il est intéressant de noter que, bien au-delà d'un exercice de géométrie en apparence élémentaire, ce problème suscitera en fait une analyse mathématique particulièrement riche touchant à des domaines diversifiés.

Tous les éléments des diverses correspondances entre A. Dufour, F. De Ligt, J.-F. Pioche et l'auteur sont rassemblés dans le présent article.

II Description du problème

On se donne un rectangle dont la base est le double de la hauteur, un triangle isocèle dont la base coïncide avec celle du rectangle et un cercle de rayon le quart de la base du rectangle, tangent à un côté vertical du rectangle et dont un diamètre est porté par un côté latéral du triangle (voir figure 1).

Le problème évoqué dans la section I consiste à rechercher une position pour le sommet du triangle qui produise une triple intersection entre une diagonale du rectangle, le cercle et la perpendiculaire au diamètre du cercle porté par le côté latéral mentionné du triangle (voir figure 1). Nous verrons qu'il y a deux solutions possibles à ce problème (voir figures 2 et 3).

* Institut National des Sciences Appliquées de Lyon, Pôle de Mathématiques, Bâtiment Léonard de Vinci, 20 avenue Albert Einstein, 69621 Villeurbanne Cedex, France; aime.lachal@insa-lyon.fr

Figure 1. Données du problème.

Figure 2. La pyramide de Kheops (1).

Figure 3. La pyramide de Kheops (2).

Nous avons ébauché en pointillés sur les figures 2 et 3 l'« étoile infinie » (de sommet S_0^+ ou S_0^-) mentionnée par J. Colmer.

Dans ce travail, nous adopterons plusieurs approches : trigonométrique (section III), analytique (section IV), puis algébrique (section V). Ces diverses approches conduisent toutes à la résolution d'équations du quatrième degré dont les solutions ne sont pas constructibles à la règle et au compas. Malgré l'impossibilité d'une telle construction, nous proposerons néanmoins une construction géométrique originale qui fera l'objet de la section VI.

Figure 4. Notations.

Figure 5. Égalité des pentes dans le triangle (ABC) (1).

On traite le problème dans un cadre plus général pour lequel les dimensions des objets considérés sont quelconques. Les données et notations sont alors les suivantes (voir figure 4).

Soit $(ABCD)$ un rectangle de longueur $AB = L$ et de hauteur $BC = l$. On trace la diagonale (AC) , on place une origine O sur la base (AB) . L'axe (AB) est choisi comme axe des abscisses et sa perpendiculaire en O comme celui des ordonnées. On considère ensuite un cercle mobile de rayon R dont le centre Ω coule le long de l'axe des ordonnées. Le point B est situé à une distance $bR > 0$ de O et la diagonale (AC) a pour équation $y = cx + dR$. On trace enfin une hauteur (H) à une distance $-aR < 0$ de O . On suppose $a, b \geq 1$.

Le cas de la pyramide de Kheops correspond aux valeurs $a = b = 1$, $c = 1/2$ et $d = 3/2$.

III Résolution trigonométrique

On cherche les angles $\theta = \widehat{AB\Omega} \in]0, \pi/2[$ pour lesquels la perpendiculaire à (ΩB) issue de Ω coupe simultanément le cercle $C(\Omega, R)$ et la diagonale (AC) en un point que l'on notera C' . Les sommets S recherchés seront ensuite obtenus comme intersection de (ΩB) et de (H) . Notons que l'on retrouve l'angle θ en C' : $\theta = \widehat{B'C'\Omega}$, B' étant la projection orthogonale

Figure 7. Intersection de (AC) et (L), position haute de F.

Figure 8. Intersection de (AC) et (L), position basse de F.

vérifient les relations $y_F = cx_F + dR = [(bR)/y_\Omega]x_F + y_\Omega$ qui donnent

$$x_F = \frac{y_\Omega^2 - dRy_\Omega}{cy_\Omega - bR}, \quad y_F = \frac{cy_\Omega^2 - bdR^2}{cy_\Omega - bR}.$$

La condition de triple intersection s'énonce selon $F \in C(\Omega, R)$, soit $x_F^2 + (y_F - y_\Omega)^2 = R^2$. Cette équation équivaut, en remplaçant x_F et y_F par leurs expressions ci-dessus, à

$$(y_\Omega^2 + b^2R^2)(y_\Omega - dR)^2 = (cy_\Omega - bR)^2R^2.$$

On arrive finalement à l'équation de degré 4 d'inconnue y_Ω

$$y_\Omega^4 - 2dRy_\Omega^3 + (b^2 - c^2 + d^2)R^2y_\Omega^2 - 2(bd - c)bR^3y_\Omega + (d^2 - 1)b^2R^4 = 0 \quad (3)$$

dont la contre-partie trigonométrique, à rapprocher des équations (1) et (2) en $\cos \theta$ et $\sin \theta$, est obtenue à l'aide de $y_\Omega = bR \tan \theta$:

$$b^2 \tan^4 \theta - 2bd \tan^3 \theta + (b^2 - c^2 + d^2) \tan^2 \theta - 2(bd - c) \tan \theta + (d^2 - 1) = 0.$$

On tire ensuite les ordonnées des sommets correspondants, notés S_0^+ et S_0^- , à l'aide de la relation d'homothétie $y_s = [(a+b)/b]y_\Omega$, qui répondra finalement au problème posé (voir figures 9 et 10).

Figure 9. Première solution.

Figure 10. Deuxième solution.

Dans le contexte de la pyramide de Kheops, les deux équations précédentes s'écrivent

$$4y_\Omega^4 - 12Ry_\Omega^3 + 12R^2y_\Omega^2 - 8R^3y_\Omega + 5R^4 = 0$$

et

$$4 \tan^4 \theta - 12 \tan^3 \theta + 12 \tan^2 \theta - 8 \tan \theta + 5 = 0. \quad (4)$$

Maple fournit les valeurs numériques

$$\tan \theta_0^+ \approx 1.277\,206\,379 \text{ et } \tan \theta_0^- \approx 1.604\,572\,949$$

puis les angles correspondants (identiques à ceux obtenus dans la section III)

$$\theta_0^+ \approx 0.906\,533\,066 \text{ rd et } \theta_0^- \approx 1.013\,478\,912 \text{ rd.}$$

IV.2 Deuxième méthode

D'autres méthodes analytiques équivalentes à la précédente pourraient être envisageables. La suivante requiert plus de calculs que la première méthode, mais nous suggérera une construction géométrique pour situer les sommets recherchés.

Le cercle $C(\Omega, R)$ coulisse le long de l'axe des ordonnées. Soient E^+ et E^- les points d'intersection de $C(\Omega, R)$ avec (AC) : $C(\Omega, R) \cap (AC) = \{E^+, E^-\}$, ce qui suppose que le cercle se déplace entre deux positions tangentes à la diagonale (AC), positions extrêmes pour lesquelles $E^+ = E^-$. Les segments

Figure 11. Intersection du cercle et de la diagonale.

$[\Omega, E^+]$ et $[\Omega, E^-]$ coulisent le long des deux glissières portées par l'axe des ordonnées (Oy) et la diagonale (AC) à l'instar d'une porte de garage (à glissières qui ne seraient pas d'équerre). On trace les perpendiculaires $(\mathcal{K}^+)$ et $(\mathcal{K}^-)$ issues de Ω à (ΩE^+) et (ΩE^-) respectivement, puis on note S^+ et S^- les points d'intersection respectifs de $(\mathcal{H})$ avec $(\mathcal{K}^+)$ et $(\mathcal{K}^-)$: $(\mathcal{H}) \cap (\mathcal{K}^+) = \{S^+\}$ et $(\mathcal{H}) \cap (\mathcal{K}^-) = \{S^-\}$ (voir figure 11).

On cherche les centres Ω_0^+ et Ω_0^- pour que $(\mathcal{K}^+)$ et $(\mathcal{K}^-)$ passent par B (pas simultanément). Les sommets recherchés seront notés S_0^+ et S_0^- .

Les équations de (AC) et $C(\Omega, R)$ étant respectivement $y = cx + dR$ et $x^2 + (y - y_\Omega)^2 = R^2$, la recherche des points d'intersection E^+ et E^- revient à résoudre

$$(c^2 + 1)x^2 - 2c(y_\Omega - dR)x + [y_\Omega^2 - 2dRy_\Omega + (d^2 - 1)R^2] = 0.$$

Le discriminant de cette équation est

$$\begin{aligned} \Delta &= (c^2 - d^2 + 1)R^2 + 2dRy_\Omega - y_\Omega^2 \\ &= (c^2 + 1)R^2 - (y_\Omega - dR)^2. \end{aligned}$$

Il est positif ou nul pour les valeurs de y_Ω comprises entre $(d - \sqrt{c^2 + 1})R$ et $(d + \sqrt{c^2 + 1})R$, ces deux valeurs étant associées aux positions extrêmes du cercle tangentes à (AC) . Les solutions sont

$$x_{E^+} = \frac{c(y_\Omega - dR) + \sqrt{\Delta}}{c^2 + 1}, \quad (5)$$

$$x_{E^-} = \frac{c(y_\Omega - dR) - \sqrt{\Delta}}{c^2 + 1} \quad (6)$$

et les y correspondants ($y = cx + dR$) sont donnés par

$$y_{E^+} = \frac{c^2 y_\Omega + dR + c\sqrt{\Delta}}{c^2 + 1}, \quad (7)$$

$$y_{E^-} = \frac{c^2 y_\Omega + dR - c\sqrt{\Delta}}{c^2 + 1}. \quad (8)$$

Le vecteur $\overrightarrow{\Omega E}$ (on notera E pour E^+ ou E^- indifféremment) ayant pour coordonnées $(x_E, y_E - y_\Omega)$, la perpendiculaire $(\mathcal{K})$ (on notera également $(\mathcal{K})$ pour $(\mathcal{K}^+)$ ou $(\mathcal{K}^-)$) à (ΩE) passant par Ω a pour équation

$$x_E x + (y_E - y_\Omega)(y - y_\Omega) = 0. \quad (9)$$

Le point d'intersection S de $(\mathcal{K})$ avec l'axe ($\mathcal{H}$) d'équation $x = -aR$ a alors pour ordonnée $y_S = y_\Omega + (x_E aR)/(y_E - y_\Omega)$. Les ordonnées des sommets S^+ et S^- associés aux points E^+ et E^- ont ainsi pour expressions, au vu de (5), (6), (7) et (8) :

$$\begin{aligned} y_{S^+} &= \frac{y_\Omega^2 - (ac + d)Ry_\Omega + acdR^2 - (cy_\Omega + aR)\sqrt{\Delta}}{y_\Omega - dR - c\sqrt{\Delta}}, \\ y_{S^-} &= \frac{y_\Omega^2 - (ac + d)Ry_\Omega + acdR^2 + (cy_\Omega + aR)\sqrt{\Delta}}{y_\Omega - dR + c\sqrt{\Delta}}. \end{aligned}$$

Les sommets S recherchés de la pyramide sont les points pour lesquels la droite $(\mathcal{K})$ passe par le point B de la base rectangulaire. Reportant les coordonnées $(bR, 0)$ de B ainsi que la relation $y_E = cx_E + dR$ dans l'équation (9) de $(\mathcal{K})$, on est amené à résoudre l'équation $(cy_\Omega - bR)x_E = y_\Omega^2 - dRy_\Omega$ d'inconnue y_Ω . En utilisant les expressions (5) et (6) de $x_{E^\pm}$, cela donne les équivalences ci-dessous :

$$\begin{aligned} &(cy_\Omega - bR)[c(y_\Omega - dR) \pm \sqrt{\Delta}] \\ &= (c^2 + 1)(y_\Omega^2 - dRy_\Omega) \\ \Leftrightarrow &(c^2 + 1)(y_\Omega^2 - dRy_\Omega) - c(cy_\Omega - bR)(y_\Omega - dR) \\ &= \pm (cy_\Omega - bR)\sqrt{\Delta} \\ \Leftrightarrow &(y_\Omega^2 + (bc - d)Ry_\Omega - bcdR^2)^2 \\ &= (cy_\Omega - bR)^2(-y_\Omega^2 + 2dRy_\Omega + (c^2 - d^2 + 1)R^2) \\ \Leftrightarrow &y_\Omega^4 - 2dRy_\Omega^3 + (b^2 - c^2 + d^2)R^2y_\Omega^2 \\ &- 2(bd - c)bR^3y_\Omega + (d^2 - 1)b^2R^4 = 0. \end{aligned}$$

On retrouve ainsi l'équation (3) obtenue dans la sous-section IV.1.

V Approche algébrique

Dans cette section, nous nous intéressons au cas particulier de la pyramide de Kheops et prouvons que les deux sommets S_0^+ et S_0^- ne sont pas constructibles

à la règle et au compas. Pour cela, nous invoquons une propriété que l'on peut trouver dans le livre de J.C. Carréga [1] (exercice 24) et qui s'énonce comme suit :

Si un polynôme de degré 4, sans terme de degré 3, à coefficients rationnels, ne peut être décomposé en un produit de polynômes non constants à coefficients rationnels et si son polynôme résolvant ne peut non plus être ainsi décomposé, alors les racines du polynôme initial ne sont pas constructibles à la règle et au compas.

Nous considérons ici l'équation (4) réécrite, en posant $\tan \theta = x$, selon

$$4x^4 - 12x^3 + 12x^2 - 8x + 5 = 0. \quad (10)$$

Dans la sous-section V.1, nous construisons l'équation résolvante associée à (10) à partir de laquelle, couplée avec (11), nous déduirons la propriété de non-constructibilité à la règle et au compas. Dans la sous-section V.2, nous présentons, par souci de complétude, la résolution totale de l'équation (11).

V.1 Équation résolvante

En effectuant la translation adéquate $x = y + 3/4$, on transforme (10) en l'équation sans terme de degré 3

$$256y^4 - 96y^2 - 224y + 125 = 0. \quad (11)$$

Introduisons les fonctions symétriques élémentaires des racines y_1, y_2, y_3, y_4 de (11) :

$$\begin{aligned} \sigma_1 &= y_1 + y_2 + y_3 + y_4, \\ \sigma_2 &= y_1y_2 + y_1y_3 + y_1y_4 + y_2y_3 + y_2y_4 + y_3y_4, \\ \sigma_3 &= y_1y_2y_3 + y_1y_2y_4 + y_1y_3y_4 + y_2y_3y_4, \\ \sigma_4 &= y_1y_2y_3y_4. \end{aligned}$$

Ici $\sigma_1 = 0$, $\sigma_2 = -96/256 = -3/8$, $\sigma_3 = 224/256 = 7/8$, $\sigma_4 = 125/256$. Introduisons également les quantités (classiques dans la théorie de l'équation du quatrième degré), en tenant compte de la relation $\sigma_1 = 0$, suivantes :

$$\begin{aligned} z_1 &= -(y_1 + y_2)(y_3 + y_4) = (y_1 + y_2)^2, \\ z_2 &= -(y_1 + y_3)(y_2 + y_4) = (y_1 + y_3)^2, \\ z_3 &= -(y_1 + y_4)(y_2 + y_3) = (y_1 + y_4)^2. \end{aligned}$$

On a clairement

$$z_1 + z_2 + z_3 = -2\sigma_2 = \frac{3}{4}.$$

Ensuite, en écrivant

$$(y_1 + y_2)(y_1 + y_3) = y_1(y_1 + y_2 + y_3) + y_2y_3 = y_2y_3 - y_1y_4$$

ainsi que, de manière analogue, $(y_1 + y_2)(y_1 + y_4) = y_2y_4 - y_1y_3$ et $(y_1 + y_3)(y_1 + y_4) = y_3y_4 - y_1y_2$, on obtient

$$\begin{aligned} z_1z_2 &= y_1^2y_4^2 + y_2^2y_3^2 - 2\sigma_4, \\ z_1z_3 &= y_1^2y_3^2 + y_2^2y_4^2 - 2\sigma_4, \\ z_2z_3 &= y_1^2y_2^2 + y_3^2y_4^2 - 2\sigma_4, \end{aligned}$$

puis

$$z_1z_2 + z_1z_3 + z_2z_3 = \sigma_2^2 - 4\sigma_4 = -\frac{29}{16}.$$

Enfin, observant que

$$\begin{aligned} (y_1 + y_2)(y_1 + y_3)(y_1 + y_4) &= y_1^2(y_1 + y_2 + y_3 + y_4) \\ &\quad + y_1y_2y_3 + y_1y_2y_4 + y_1y_3y_4 + y_2y_3y_4 \\ &= \sigma_3, \end{aligned} \quad (12)$$

on trouve immédiatement

$$z_1z_2z_3 = \sigma_3^2 = \frac{49}{64}.$$

Par conséquent, les nombres z_1, z_2, z_3 sont les solutions de l'équation résolvante (de Descartes) associée à (11)

$$64z^3 - 48z^2 - 116z - 49 = 0. \quad (13)$$

Cherchons à présent si (13) admet une racine de la forme r/s avec r, s deux entiers premiers entre eux et $s > 0$:

$$64r^3 - 48r^2s - 116rs^2 - 49s^3 = 0.$$

On voit que r doit diviser $49 = 7^2$ et que s doit diviser $64 = 2^6$, donc $r \in \{\pm 1, \pm 7, \pm 49\}$ et $s \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64\}$. Il est facile de vérifier qu'aucune des 42 fractions ainsi obtenues n'est solution de (13), donc le polynôme contenu dans (13) ne peut pas se décomposer en le produit d'un polynôme de degré 1 et un de degré 2 à coefficients rationnels.

Cherchons ensuite si (11) admet une racine de la forme p/q avec p, q deux entiers premiers entre eux et $q > 0$:

$$256p^4 - 96p^2q^2 - 224pq^3 + 125q^4 = 0.$$

L'entier p doit donc diviser $125 = 5^3$ et q doit diviser $256 = 2^8$, donc $p \in \{\pm 1, \pm 5, \pm 25, \pm 125\}$ et $q \in \{1, 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256\}$. Aucune des 72 fractions candidates ne convient, donc le polynôme contenu dans (11) ne peut pas se décomposer en le produit d'un polynôme de degré 1 et un de degré 3 à coefficients rationnels.

Il reste à voir s'il pourrait se décomposer en le produit de deux polynômes de degré 2 à coefficients rationnels. Une telle décomposition s'écrit

$$256y^4 - 96y^2 - 224y + 125 \\ = 256(y^2 - \alpha_1 y + \beta_1)(y^2 - \alpha_2 y + \beta_2),$$

pour des rationnels $\alpha_1, \beta_1, \alpha_2, \beta_2$. En identifiant, on trouve $\alpha_2 = -\alpha_1$, $\alpha_1\alpha_2 + \beta_1 + \beta_2 = -96/256 = -3/8$, $\alpha_1\beta_2 + \alpha_2\beta_1 = 224/256 = 7/8$ et $\beta_1\beta_2 = 125/256$. De ces relations, on tire $\alpha_1 = -\alpha_2 = \alpha$ disons, puis $\beta_1 + \beta_2 = \alpha^2 - 3/8$ et $\beta_1 - \beta_2 = -7/(8\alpha)$. On en déduit que

$$\beta_1 = \frac{1}{2}\left(\alpha^2 - \frac{3}{8} - \frac{7}{8\alpha}\right) = \frac{8\alpha^3 - 3\alpha - 7}{16\alpha}$$

et

$$\beta_2 = \frac{1}{2}\left(\alpha^2 - \frac{3}{8} + \frac{7}{8\alpha}\right) = \frac{8\alpha^3 - 3\alpha + 7}{16\alpha}.$$

En reportant ces expressions dans la relation $\beta_1\beta_2 = 125/256$, on obtient l'équation de degré 3 pour α^2 suivante :

$$64\alpha^6 - 48\alpha^4 - 116\alpha^2 - 49 = 0. \quad (14)$$

Remarquons que l'équation (14) n'est autre que la version tricarrée de l'équation résolvante (13) (qui n'a pas de solution rationnelle) et donc le polynôme contenu dans (11) ne peut pas se décomposer en le produit de deux polynômes de degré 2 à coefficients rationnels.

La propriété de non constructibilité à la règle et au compas est finalement prouvée.

V.2 Résolution complète

La translation adéquate $z = w + 1/4$ transforme (13) en l'équation de degré 3 sans terme de degré 2

$$w^3 - 2w - 5/4 = 0.$$

La méthode de Cardan fournit les solutions

$$w_1 = u + v,$$

$$w_2 = uj + v\bar{j} = -\frac{1}{2}[(u+v) - i\sqrt{3}(u-v)],$$

$$w_3 = u\bar{j} + vj = -\frac{1}{2}[(u+v) + i\sqrt{3}(u-v)],$$

où u et v vérifient le système $u^3 + v^3 = 5/4$ et $uv = 2/3$, ce qui donne

$$u = \frac{1}{6} \sqrt[3]{135 + 3\sqrt{489}} \approx 0.9768445587,$$

$$v = \frac{1}{6} \sqrt[3]{135 - 3\sqrt{489}} \approx 0.6824695506.$$

Rappelons que $z_1 = (y_1 + y_2)^2$, $z_2 = (y_1 + y_3)^2$, $z_3 = (y_2 + y_3)^2$, ici avec $z_k = w_k + 1/4$, $1 \leq k \leq 3$. Les y_1, y_2, y_3, y_4 sont donc solutions du système $y_1 + y_2 = \zeta_1$, $y_1 + y_3 = \zeta_2$, $y_2 + y_3 = \zeta_3$ où $\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3$ sont des racines carrées de z_1, z_2, z_3 respectivement, le choix des signes de celles-ci devant satisfaire une contrainte qui va être précisée ci-dessous. En effet, se référant à (12), on trouve que

$$(y_1 + y_2)(y_1 + y_3)(y_2 + y_3) \\ = -(y_1 + y_2)(y_1 + y_3)(y_1 + y_4) = -7/8$$

et la condition sur les signes de $\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3$ est $\zeta_1\zeta_2\zeta_3 = -7/8$. Rappelons maintenant que les racines carrées d'un nombre complexe $\xi + i\eta$ sont

$$\pm \left[\sqrt{\frac{1}{2} \left(\sqrt{\xi^2 + \eta^2} + \xi \right)} + i \operatorname{sgn}(\eta) \sqrt{\frac{1}{2} \left(\sqrt{\xi^2 + \eta^2} - \xi \right)} \right].$$

Posons alors $\rho = |z_2| = |z_3|$. On a, puisque $uv = 2/3$,

$$\rho^2 = \left(\frac{u+v}{2} - \frac{1}{4} \right)^2 + \left(\sqrt{3} \frac{u-v}{2} \right)^2 \\ = u^2 + v^2 - \frac{u+v}{4} - \frac{29}{48} \approx 0.4009947843.$$

On choisira par exemple (on vérifie que $\zeta_1\zeta_2\zeta_3 < 0$)

$$\zeta_1 = -\sqrt{u+v+1/4},$$

$$\zeta_2 = \frac{1}{2} \left[\sqrt{2\rho - (u+v-1/2)} + i\sqrt{2\rho + (u+v-1/2)} \right],$$

$$\zeta_3 = \frac{1}{2} \left[\sqrt{2\rho - (u+v-1/2)} - i\sqrt{2\rho + (u+v-1/2)} \right].$$

On a alors les égalités $\zeta_2 + \zeta_3 = \sqrt{2\rho - (u+v-1/2)}$ et $\zeta_2 - \zeta_3 = i\sqrt{2\rho + (u+v-1/2)}$, et enfin les solutions de (11) s'écrivent (on fera après $x_k = y_k + 3/4$, $1 \leq k \leq 4$, pour récupérer les solutions de (10))

$$y_1 = \frac{1}{2}(\zeta_1 + \zeta_2 - \zeta_3) \\ = \frac{1}{2} \left[-\sqrt{u+v+1/4} + i\sqrt{2\rho + (u+v-1/2)} \right],$$

$$y_2 = \frac{1}{2}(\zeta_1 - \zeta_2 + \zeta_3) \\ = \frac{1}{2} \left[-\sqrt{u+v+1/4} - i\sqrt{2\rho + (u+v-1/2)} \right],$$

$$y_3 = \frac{1}{2}(-\zeta_1 + \zeta_2 + \zeta_3) \\ = \frac{1}{2} \left[\sqrt{u+v+1/4} + \sqrt{2\rho - (u+v-1/2)} \right],$$

$$y_4 = \frac{1}{2}(-\zeta_1 - \zeta_2 - \zeta_3) \\ = \frac{1}{2} \left[\sqrt{u+v+1/4} - \sqrt{2\rho - (u+v-1/2)} \right].$$

Maple donne les valeurs numériques de $\zeta_1, \zeta_2, \zeta_3$:

$$\begin{aligned}\zeta_1 &\approx 1.381\,779\,327, \\ \zeta_2 &\approx 0.1\,636\,832\,850 + 0.7\,787\,485\,298\,i, \\ \zeta_3 &\approx 0.1\,636\,832\,850 - 0.7\,787\,485\,298\,i,\end{aligned}$$

puis celles des solutions de (10) :

$$\begin{aligned}x_1 &\approx 0.0\,591\,103\,365 + 0.7\,787\,485\,298\,i, \\ x_2 &\approx 0.0\,591\,103\,365 - 0.7\,787\,485\,298\,i, \\ x_3 &\approx 1.604\,572\,948, \\ x_4 &\approx 1.277\,206\,378.\end{aligned}$$

VI Une construction géométrique

Malgré l'impossibilité de tracer les sommets S_0^+ et S_0^- à la règle et au compas, nous proposons une construction originale permettant d'obtenir empiriquement ces points comme intersection d'une certaine courbe que nous précisons ci-dessous avec une droite bien spécifique.

En reprenant les notations de la section III, on écrit la tangente des angles $\theta_0^\pm$ associés aux sommets $S_0^\pm$ de deux façons :

$$\tan \theta_0^\pm = \frac{y_{S_0^\pm}}{(a+b)R} = \frac{y_{\Omega_0^\pm}}{bR}$$

qui fournit l'égalité des rapports (c'est aussi le théorème de Thalès !) $y_{S_0^\pm}/y_{\Omega_0^\pm} = (a+b)/b$, soit encore

$$y_{S_0^\pm} = \left(1 + \frac{a}{b}\right)y_{\Omega_0^\pm}.$$

En utilisant les résultats de la sous-section IV.2 (voir les ordonnées de $y_{S^\pm}$), cette observation se formule selon $f^\pm(y) = g(y)$ où l'on a posé $f^\pm(y) = f_1^\pm(y)/f_2^\pm(y)$ avec

$$\begin{aligned}f_1^\pm(y) &= y^2 - (ac + d)Ry + acdR^2 \\ &\quad \mp (cy + aR)\sqrt{(c^2 - d^2 + 1)R^2 + 2dRy - y^2} \\ f_2^\pm(y) &= y - dR \mp c\sqrt{(c^2 - d^2 + 1)R^2 + 2dRy - y^2}\end{aligned}$$

et

$$g(y) = \left(1 + \frac{a}{b}\right)y.$$

Notre construction repose précisément sur les équations $f^+(y) = g(y)$ et $f^-(y) = g(y)$, lesquelles reviennent à chercher graphiquement les points d'intersection des courbes représentatives de f^+ et f^- avec la droite associée à g . Notre méthode de construction consiste alors à tracer les courbes f^+ , f^- et g selon le procédé décrit ci-dessous.

Figure 12. Courbe représentative de f^+ .

– Nous référant à la méthode exposée dans la sous-section IV.2, nous traçons une succession de segments de longueur R dont les extrémités inférieures coulisent le long d'un segment vertical $[\Omega_1^+, \Omega_2^+]$ et les extrémités supérieures le long d'un segment oblique $[\Omega_2^+, G^+]$. Le point Ω_2^+ est l'intersection de l'axe (Oy) et de la diagonale (AC) , et les points Ω_1^+ et G^+ se trouvent à la distance R de Ω_2^+ , Ω_1^+ étant situé sur (Oy) au-dessous de Ω_2^+ et G^+ sur (AC) à droite de Ω_2^+ (voir figure 12). Les extrémités inférieures sont les centres successifs Ω des cercles coulisants et nous choisissons leurs ordonnées y_Ω régulièrement espacées. Nous rabattons alors en abscisses à l'aide d'une rotation d'angle droit $(-\pi/2)$ sur un graphique parallèle de repère $(O'x'y')$ les ordonnées successives y_Ω . Les ordonnées y_{S^+} des sommets S^+ associés aux Ω selon la même méthode du IV.2 (rappelons que les S^+ sont les intersections de la hauteur (H) avec les perpendiculaires issues de Ω aux segments coulisants) sont reportées en ordonnées sur ce nouveau graphique. Ce procédé fournit un échantillon de la courbe représentative de f^+ (voir figure 12), appelée polyligne en CAO. Nous construisons de manière similaire la courbe représentative de f^- à partir d'une succession de segments coulisant entre un segment vertical $[\Omega_1^-, \Omega_2^-]$ et un segment oblique $[\Omega_1^-, G^-]$. Dans ce dernier cas, Ω_1^- est l'intersection de (Oy) et (AC) , puis Ω_2^- et G^- se trouvent à la distance R de Ω_1^- , Ω_2^- étant sur (Oy) au-dessus de Ω_1^- et G^- sur (AC) à gauche de Ω_1^- (voir figure 13).

– Ensuite, nous construisons la droite associée à g en rabattant la distance horizontale $(a+b)R$ (distance entre le point B et la hauteur (H)) en

Figure 13. Courbe représentative de f^- .

Figure 16. Cas de la pyramide de Kheops : symétrie.

Figure 14. Construction de la droite de pente $1 + a/b$. Figure 15. Construction des sommets S_0^+ et S_0^- .

une distance verticale par une rotation d'angle droit ($-\pi/2$) sur le même graphique parallèle ($O'x'y'$), ainsi que la distance horizontale bR (distance entre O et B) par une rotation d'angle plat ($-\pi$) pour cette dernière (voir figure 14).

- Enfin, les intersections des courbes représentatives de f^+ et f^- avec la droite d'équation g fournissent les sommets S_0^+ et S_0^- (voir figure 15).

Figure 17. Cas de la pyramide de Kheops.

Figure 18. Cas de la pyramide de Kheops : translation.

Nous avons jugé intéressant et esthétique d'inclure la construction ainsi décrite au graphique initial, comme cela nous a été suggéré par A. Dufour. Cela donne les graphiques des figures 19 et 20 illustrant le cas de la pyramide de Kheops. Nous détaillons davantage la construction de S_0^+ et S_0^- dans ce dernier cas.

de la pyramide, dont la valeur n'est ni $5^{\circ} 56' 26''$, ni les $5^{\circ} 51' 14''$ proposés par Colmer. Quant à l'angle de $5^{\circ} 49' 53''$ résultant des mesures en coudées rapportées par Matila Ghyka, là aussi un doute subsiste toujours, car les documents anciens font état de plusieurs « coudées » variant de 44,4 cm à 59,2 cm, la coudée royale égyptienne se situant à peu près à mi-chemin entre ces extrêmes. Or des recherches récentes et en cours conduisent à se demander si la pyramide attribuée à Khéops n'est pas en réalité beaucoup plus ancienne, produit d'une civilisation disparue très avancée... Il est temps que l'establishment scientifique accepte de mettre en question ses vieux paradigmes. Affaire à suivre.

Remerciements. L'auteur remercie Jean-François Pioche pour sa contribution à la section III et Frédéric De Ligt pour sa contribution à la sous-section V.1, ainsi que Jean-Claude Carréga pour une lecture attentive

de ce travail et ses encouragements. L'auteur exprime sa reconnaissance tout particulièrement envers André Dufour qui est à l'origine de la construction présentée dans la section VI et plus spécifiquement des graphiques référencés des figures 19 et 20, ainsi que de nombreuses correspondances très fructueuses.

Références

- [1] J.-C. Carréga, *Théorie des corps, la règle et le compas*, Hermann, Paris, 2001.
- [2] J. Colmer, « Des chambres secrètes dans la grande pyramide », *Nexus* **42** (janvier-février 2006) 15–21.
- [3] A. Dufour, « Khéops, J. Colmer et la géométrie », *Nexus* **43** (mars-avril 2006) 78 ; « erratum » (courrier des lecteurs), *Nexus* **44** (mai-juin 2006) 78.