LES DIFFÉRENTES ÉCHELLES DE SENSIBILITÉ DES VÉGÉTAUX AUX POLLUTIONS ATMOSPHÉRIQUES

PAR

J. BOSSAVY

Ingénieur en Chef des Eaux et Forêts à Lyon

J. SCURFIELD signalait en 1960 l'existence de différentes échelles de sensibilité des végétaux présentées par des auteurs de nationalités diverses à la suite d'observations régulières poursuivies durant plusieurs années.

Ces observations effectuées à proximité de centres industriels importants tels ceux du Bassin Sidérurgique de Krivoï Rog près de Rostov, des Monts Métalliques en Bohême, de Pittsburg (USA) laissent supposer des pollutions de caractère général si l'on tient compte de la densité des Usines et de la diversité des fabrications (Aciéries, Cokeries, Produits chimiques).

Les auteurs des communications qu'il nous a été possible d'étudier sont MM. J. FERDA (Tchèque), KRASINSKIJ (Russe), DOBROVOLJSKII (Russe), JENNINGS (USA), W. BORSDORF (Allemagne), ROSSEELS (Belgique).

*
**

Lorsque l'on parle de sensibilité d'un végétal, il convient au préalable de bien s'entendre sur le sens à donner à ce mot, on doit en effet considérer que la résistance ou la sensibilité d'un végétal quel qu'il soit se constate par l'absence ou la présence de nécroses sur les organes végétatifs lorsque ce végétal est plongé dans une atmosphère polluée.

Ces atteintes, lorsqu'elles deviennent visibles, n'entraînent pas obligatoirement le dépérissement et la disparition de l'espèce citée,

C'est ainsi que le genre *Populus*, considéré comme résistant, ne portera que de façon tout à fait exceptionnelle des nécroses alors que les genres *Fraxinus*, *Aesculus*, *Betula*, *Acer* montreront couramment des symptômes d'attaques sans que pour autant leur maintien dans la station doive être considéré comme menacé, car en fait les atteintes aux feuilles de ces essences n'affectent qu'une infime proportion de la surface totale des feuilles du végétal, d'autre part ces organes (feuilles) disparaissent chaque hiver, époque où la pollution est la plus aiguë, l'effet cumulatif ne paraît pas se faire sentir.

Chez les résineux au contraire, la constatation de la sensibilité d'une essence peut souvent traduire une menace de disparition de cette espèce dans un délai plus ou moins long, l'effet cumulatif se manifeste aussi bien durant la saison de végétation que durant la période hivernale et la photosynthèse de ces résineux étant aussi bien le fait de feuilles âgées donc nécrosées, que d'une minorité de feuilles de l'année.

Ceci dit, les différents auteurs cités répartissent les végétaux en trois ou quatre classes selon leur sensibilité reconnue ou établie à la suite d'observations complétées parfois par des dosagers ou analyses.

Les essences végétales soumises à l'observation sont désignées par leurs noms latins, les références données ont donc un caractère universel.

Les observations ont souvent porté sur l'ensemble du tapis végétal (arbres, arbustes, végétaux herbacés): W. BORS DORF pour le fluor, d'autres auteurs ont limité leurs études aux seuls végétaux ligneux.

Le caractère plus général des premières ouvre une voie plus large à l'observation et permet donc de déceler avec plus de facilité et une quasi certitude le fait d'une pollution sans être tenu de compléter l'étude par des analyses ou des dosages, ce qui reste néanmoins souhaitable.

Certains ont limité leurs observations aux seuls peuplements artificiels à proximité des centres industriels, d'autres ont concentré leurs études sur les peuplements naturels (J. FERDA - ROSSELS).

Les premières offrent un intérêt particulier car elles nous permettent d'avoir une certaine connaissance du comportement de quelques essences exotiques en certains points de l'Europe.

Ces études émanent pour cinq d'entre elles de chercheurs de l'Europe Centrale, elles portent donc sur des représentants indigènes de familles végétales courantes en Europe, certes l'espèce souvent signalée n'est pas celle exactement présente dans d'autres régions de l'Europe (tels les Frênes tartare, le Mimosa de tartarie), mais la majorité des familles citées sont de celles dont les représentants se rencontrent couramment dans les forêts françaises.

Le rapprochement de ces différentes échelles nous permet de relever une grande concordance dans les résultats publiés.

En ce qui concerne les résineux, le tableau suivant résume ces observations :

L'accord sur les trois essences les plus sensibles ressort ainsi nettement, *Abies alba*, *Picea excelsa*, *Pinus silvestris* sont de façon unanime reconnues comme étant les résineux les plus sensibles aux fumées chargées de composés du soufre ou du fluor, cette sensibilité étant susceptible d'entraîner leur disparition.

La seule divergence à noter provient du mélèze d'Europe (*Larix europæa*) donné comme sensible par les uns, comme résistant par les autres. Ceci nous paraît explicable en ce sens que les aiguilles de mélèze montrent de façon courante des symptômes d'attaques, mais le repos végétatif annuel avec chute des aiguilles permet à cette essence de se maintenir dans sa station, d'où sa sensibilité réelle qui n'affecte cependant pas sa résistance finale et justifie donc à notre avis son classement parmi les résineux résistants aux pollutions.

En ce qui concerne les feuillus, le problème est autrement complexe, du fait de la variété des familles d'une part et du nombre d'espèces représentées dans chaque famille d'autre part.

L'accord est cependant quasi général sur la sensibilité des genres *Fraxinus*, *Aesculus*, *Betula*, *Acer*, *Tilia* et la résistance des genres *Populus*, *Salix*, *Alnus*, *Ulmus*, *Quercus*, *Celtis* (*australis* plus que *occidentalis*), *Fagus* (à l'état adulte).

JENNINGS étudiant dans la région de Pittsburg (USA) la pollution due aux composés du soufre (SO_2) donne l'échelle suivante de sensibilité croissante :

Ailante, Chêne des marais, Platane, Liquidambar, Erable plane, Tilleuls.

Parmi les communications citées en annexe, nous signalerons l'intérêt particulier de celle présentée par W. BORSDOFF portant sur le comportement de la végétation à proximité de sources de pollution fluorée. Cette étude a donc un caractère spécifique.

La classification présentée fait mention de 59 espèces nommément désignées, alors que les observations ont été étendues à 115 espèces.

Des végétaux aussi communs que le *Dactylis glomerata*, *Arrhenatherum elatius*, *Rumex acetosa*, *Lamium album*, *Poa pratensis*, *Medicago sativa*, *Plantago lanceolata*, *Salvia pratensis* sont inclus dans les échelles de sensibilité.

Parmi les végétaux ligneux, le charme (*Carpinus betulus*), l'érable plane (*Acer platanoïdes*), le sycomore (*Acer pseudoplatanus*) sont donnés comme sensibles au fluor, par contre le fusain (*Evonymus europæa*), le Nerprun (*Rhamnus cathartica*) sont résistants.

ECHELLES DE SENSIBILITÉ DES ESSENCES RÉSINEUSES

	PLANTATIONS ARTIFICIELLES PAR :			PEUPLEMENTS NATURELS PAR :		
	<i>Krussmann</i> —	<i>Krasinskij</i> —	<i>Dobrovoljskii</i> —	<i>Rubner</i> —	<i>Ferdn</i> —	<i>Rosseels</i> —
Sensibles ou peu résistantes	Abies Picea excelsa Pinus silvestris Pseudotsuga douglasii	Picea excelsa Pinus silvestris	Abies alba Pinus silvestris Larix europaea	Abies alba Picea excelsa Pinus silvestris	Abies alba Picea excelsa Pinus silvestris	Abies alba Picea excelsa Pinus silvestris
Relativement résistantes	Taxus baccata Larix europaea	Picea pungens		Taxus baccata Larix europaea	Larix europaea	Larix europaea
Résistantes	Pinus laricio var austriaca Juniperus fitzerianii Cedrus atlantica Sequoia gigantea Chamecyparis Thuya	Juniperus sabina Thuya occidentalis	Juniperus	Pinus laricio var austriaca Pinus cembra	Pinus laricio var austriaca	
Lieux d'observations	Allemagne	U.R.S.S.	Krivoi Rog		Monts Métalliques	Belgique

Les Bouleaux (*Betula verrucosa*), les chênes (*Quercus sessiliflora* et *Quercus pedunculata*), les aubépines (*Crataegus monogyna* et *Crataegus oxyacantha*) sont tenus pour peu sensibles.

Nous nous permettons d'ajouter à cette liste quelques résultats d'observations personnelles à proximité de sources de pollution fluorées.

Des atteintes par les fumées fluorées ont été relevées sur le feuillage des arbres ou arbustes suivants :

Erable à feuille d'obier	{	(<i>Acer opalus</i>)
Erable de Montpellier		(<i>Acer monspessulanum</i>)
Cerisier à grappes		(<i>Prunus padus</i>)
Sureau à grappes		(<i>Sambucus racemosa</i>)

Par contre, ont paru nettement dépourvus de toute atteinte :

l'Amélanchier	{	(<i>Amelanchier vulgaris</i>)
le Cotoneaster		(<i>Cotoneaster vulgaris</i>)
l'Alisier blanc		(<i>Sorbus aria</i>)

Parmi les végétaux herbacés, ont montré une nette sensibilité traduite par la présence de nécroses marginales bien développées et généralisées sur tous les sujets observés :

la Grande gentiane	{	(<i>Gentiana lutea</i>)
le Verâtre		(<i>Veratrum album</i>)
l'Epilobe		(<i>Epilobium angustifolium</i>)
le Préanthe		(<i>Prenanthes purpurea</i>)

Ont montré une absence totale de symptômes et peuvent être considérés comme résistants les genres :

Melampyrum, Luzula, Campanula.

CONCLUSIONS

De cet ensemble de données, il paraît possible de tirer quelques enseignements valables.

Il nous paraît ainsi illusoire et onéreux de continuer à utiliser lors de plantations artificielles en vue de la création de parcs ou espaces verts à proximité des grandes concentrations urbaines ou lors de la constitution de séries de reboisement dans un rayon inférieur à 20 km autour de centres industriels, des essences telles que :

Abies alba, *Picea excelsa*, ou *Pinus silvestris*.

Le choix devra porter de préférence sur les genres :

Cedrus, *Larix*, *Pinus laricio* var. *austriaca*, *Pinus cembra*, *Picea pungens*, *Ginkgo biloba*.

Le feuillu devra être utilisé en larges bandes de protection destinées à jouer le rôle de filtres à l'égard d'une atmosphère polluée, les bandes étant orientées perpendiculairement à la direction des vents dominants.

On aura alors intérêt à s'adresser aux genres suivants :

Populus, Salix, Alnus, Quercus, Ailantus, Celtis, Robinea pseudoacacia, Juglans de préférence aux genres *Fraxinus, Acer, Aesculus, Betula, Tilia*.

Ces données générales ne sauraient cependant être tenues pour toujours valables, de nombreux facteurs tels que la topographie de terrain, la direction des vents dominants, la distance des sources de pollution, et la variété des polluants pouvant fréquemment intervenir pour modifier le comportement de telle ou telle essence en fonction d'une donnée plus ou moins favorable.

Il convient en outre de préciser que des études faites en Allemagne de l'Est par les chercheurs de la Faculté Forestière de Tharandt (Université Technique de Dresde), il ressort que les atteintes aux peuplements naturels peuvent se faire sentir jusqu'à des distances de 30 et 35 km. Cette constatation récente et toute nouvelle n'a pas été sans causer de graves inquiétudes, il convient de l'enregistrer avec la plus grande attention.

BIBLIOGRAPHIE

- W. BORS DORF. — « Phytopathologische Zeitung ». Tome 38, n° 3, 1960.
 DOBROVOLJSKII. — Lesn - Khoz, 1952, F.A. 15, n° 3 684.
 J. FERDA. — Lesn - Prace, 1953, 32, pages 458-464.
 JENNINGS D.E. — Tenth National Shade Tree conference, 1939. Pittsburg, août 1934.
 M. ROSSEELS. — Inspecteur Principal des Eaux et Forêts, Belgique. Congrès International de Sylviculture, 1932.
 3^e Session Internationale des Spécialistes Forestiers en matière de dégâts dus aux fumées — Septembre 1961 — Annales scientifiques de l'Université Technique de Dresde, 11 (1962), Cahier 3.

NOTA. — Les noms latins sont tirés de l'ouvrage de P. FOURNIER (Les quatre flores de France). Ed. P. LECHEVALIER, Paris.