Autoinflammation secondaire à des défauts d'ubiquitination dans la voie NFkB : haploinsuffisance de A20 (HA20) et déficit en Otuline (Otulinopénie)

Isabelle Koné-Paut, Sophie Georgin-Lavialle, Caroline Galeotti, Linda Rossi-Semerano, Véronique Hentgen, Léa Savey, David Saadoun, Guillaume Sarabay, Isabelle Touitou

► To cite this version:

Isabelle Koné-Paut, Sophie Georgin-Lavialle, Caroline Galeotti, Linda Rossi-Semerano, Véronique Hentgen, et al.. Autoinflammation secondaire à des défauts d'ubiquitination dans la voie NFkB : haploinsuffisance de A20 (HA20) et déficit en Otuline (Otulinopénie). *Revue du Rhumatisme*, 2019, 86, pp.358 - 366. 10.1016/j.rhum.2018.09.012 . hal-03486217

HAL Id: hal-03486217

<https://hal.science/hal-03486217>

Submitted on 20 Dec 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial| 4.0 International License

Autoinflammation secondaire à des défauts d'ubiquitination dans la voie NFκB : Haploinsuffisance de A20 (HA20) et déficit en Otuline (Otulinopénie)

Isabelle Koné-Paut ^{a,b,c}, Sophie Georgin Lavalie ^{c,d,e,f}, Caroline Galeotti ^{a,b,c}, Linda Rossi – Semerano ^{a,b,c}, Véronique Hentgen ^{c,g}, Léa Savey ^{c,d,e,f}, David Saadoun ^{c,d,h,i,j}, Guillaume Sarabay ^{c,k,l}, Isabelle Touitou ^{c,k,l}.

^a Service de rhumatologie pédiatrique, CHU de Bicêtre, Assistance publique–hôpitaux de Paris, 94270 Le Kremlin-Bicêtre, France

^b université de Paris SUD, 94270 Le Kremlin-Bicêtre, France

^c Centre national de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose inflammatoire (CEREMAIA), 94270 Le Kremlin-Bicêtre, France

^d Sorbonne Universités, 75006 Paris, France

^eService de médecine interne, Département HospitaloUniversitaire Inflammation-Immunopathologie-Biothérapie (DHU i2B). hôpital Tenon, Assistance publique–hôpitaux de Paris (AP–HP), 4, rue de la Chine, 75020 Paris, France

^fLaboratoire INSERM U_933. 75012 Paris, France

^g Service de pédiatrie générale, Centre hospitalier de Versailles, 179, rue de Versailles, 78150 Le Chesnay, France

^h Département de Médecine Interne et Immunologie Clinique, UMR 7211, Département HospitaloUniversitaire Inflammation-Immunopathologie-Biothérapie (DHU i2B), AP-HP, Groupe Hospitalier Pitié-Salpêtrière, 75005, Paris, France.

ⁱINSERM, UMR_S 959, 75013 Paris, France,

^jCNRS, FRE3632, 75005 Paris, France

^k. Cellules souches, plasticité cellulaire, médecine régénératrice et immunothérapies, INSERM, Université de Montpellier, 34090 Montpellier, France

^lDépartement de génétique médicale, maladies rares et médecine personnalisée, CHU Montpellier, 34295 Montpellier, France

Auteur correspondant :

Pr Isabelle Koné-Paut : Service de rhumatologie pédiatrique, Centre de référence des maladies auto-inflammatoires et de l'amylose (CEREMAIA), CHU de Bicêtre, 78 rue du Général Leclerc, 94270 le Kremlin Bicêtre
isabelle.kone-paut@aphp.fr

Résumé

À côté des voies désormais classiques de l'autoinflammation que sont celles de l'interleukine1 (IL-1) et des interférons, le champ s'élargit avec la description de défauts de régulation négative de la voie NFκB. La voie NFκB, activée dès le contact d'un ligand sur le récepteur 1 du tumor necrosis factor (TNFR1), joue un rôle critique pour engager le processus inflammatoire car elle produit des cytokines majeures comme l'IL-1, l'interleukine 6 et le TNF ; sa régulation négative est essentielle à l'arrêt du processus inflammatoire et dépend du niveau d'ubiquitination des protéines associées au TNFR1 et d'autres composés intermédiaires. A20 et Otuline sont des protéines qui modifient l'ubiquitination et leur défaut peut entraîner une activation de la voie NFκB avec production excessive de cytokines proinflammatoires. L'haploinsuffisance d'A20 comme la maladie de Behçet inclut l'aphtose bipolaire et plus rarement l'uvéïte, mais elle s'en distingue par sa transmission dominante, un début des symptômes plus précoce, et une atteinte digestive sévère au premier plan. Son hétérogénéité clinique est très importante, les patients atteints présentant au cours de leur vie de façon concomitante ou successive des manifestations autoinflammatoires, autoimmunes voire plus rarement un déficit immunitaire discret, essentiellement humoral. Le déficit en Otuline se caractérise par des manifestations systémiques inflammatoires très précoces associées à une panniculite avec lipodystrophie et une colite inflammatoire ; son principal diagnostic différentiel étant le syndrome PRAAS : proteasome autoinflammatory associated syndrome. Le traitement de ces affections est difficile et non codifié à ce jour avec une corticostabilité à haute dose, et une efficacité modeste des anti- TNF et des anti-IL1.

Mots clés

Autoinflammation, HA20, *TNFAIP3*, déficit en Otuline (ORAS), Otulinopénie, NFκB, Behçet, ubiquitination.

1. Introduction

Les manifestations cliniques des maladies autoinflammatoires : poussées systémiques inflammatoires survenant apparemment de façon inopinée, sont dues à un défaut de régulation de l'immunité innée conduisant à une production excessive de cytokines proinflammatoires telles que l'interleukine-1 (IL-1), l'interleukine 18 (IL-18), l'interleukine 6 (IL-6), le TNF alpha (TNF α) et les interférons de type I (IFN) [1–3]. Les maladies monogéniques associées à IL-1 ont été le premier groupe décrit et pour un bon nombre d'entre elles l'utilisation des biothérapies anti IL-1 s'est avérée une révolution pour la qualité et probablement aussi l'espérance de vie des patients aux phénotypes les plus sévères [2]. Au fil du temps et grâce à d'intenses collaborations cliniques et génétiques et du fait du développement des nouvelles techniques de séquençage à haut débit, de nouvelles voies d'autoinflammation sont régulièrement découvertes dont certaines ont des frontières floues avec dépassent les limites avec l'autoimmunité et le déficit immunitaire [1]. Cette revue éclaire sur les défauts de l'ubiquitination, un processus de modification post traductionnelle des protéines, qui modifie leur destin dans la cellule en leur rajoutant (ubiquitination) ou en leur retirant (déubiquitination) des résidus d'ubiquitine [4,5]. Ce mécanisme est particulièrement important dans le fonctionnement de la voie NF κ B (TNF-nuclear factor- κ B), une voie majeure de transcription de cytokines proinflammatoires. Des défauts de certaines protéines ayant des propriétés d'ubiquitination et/ou de déubiquitination (déubiquitinase : DUB) comme A20 et l'otuline, sont responsables respectivement de deux nouvelles entités autoinflammatoires, le syndrome HA20 (haploinsuffisance de TNFAIP3/A20) initialement décrit avec un phénotype assez proche de la maladie de Behçet (MB), mais qui avec le temps semble offrir un spectre clinique plus large alliant autoinflammation et autoimmunité ; et l'otulinopénie qui en plus de comporter une diarrhée chronique présente quelques similarités avec le syndrome PRAAS : proteasome autoinflammatory associated syndrome[4,6–13].

L'otuline est une déubiquitinase, qui hydrolyse les chaînes d'ubiquitine linéaires fixées par le complexe LUBAC (Linear Ubiquitin Chain Assembly Complex) [4,5,7,9]. Le complexe LUBAC est impliqué dans l'ubiquitination de deux éléments clés de la voie NF κ B (RIPK1 et NEMO) et dont les mutations conduisent également à des syndromes autoinflammatoires avec déficit immunitaire [14,15]. Les deux déficits des DUBs : A20 et Otuline, sont donc

responsables d'un défaut de régulation négative de la voie NFκB avec production excessive de cytokines proinflammatoires [4].

2. Physiopathologie (Figure 1)

2.1. Ubiquitination

L'ubiquitination est une modification post traductionnelle des protéines qui joue un rôle régulateur dans les processus de transduction des signaux d'activation en réponse à une stimulation via les récepteurs de l'immunité innée[4,5]. Sous stimulation, les chaînes d'ubiquitine sont assemblées puis attachées à la protéine dont elles doivent moduler la fonction et la destinée ; les chaînes d'ubiquitine existent sous différentes formes, en fonction d'où et comment elles se fixent ; l'ubiquitination commence par l'attachement d'un simple motif d'ubiquitine à une protéine cible suivant un processus enzymatique en 3 étapes qui comportent : une enzyme activatrice d'ubiquitine (E1), une enzyme conjuguant l'ubiquitine (E2), puis une enzyme liant l'ubiquitine (E3 ligase)[4,5]. Les chaînes d'ubiquitine sont générées par l'attachement de monomères d'ubiquitine attachés sur des résidus qui sont soit des lysines (Lys-Ub ; K48, K63) soit des méthionines (Met-Ub, Met1) ; les chaînes d'ubiquitine une fois liées peuvent subir des modifications ultérieures et/ou être détectées par des récepteurs ou des détecteurs qui vont fixer la destinée de leurs cibles [4]. Par exemple les enzymes marquées via des lysines en position 48 (K48) vont subir une dégradation de type UPS (ubiquitin–proteasome system) dans le protéasome ; les déubiquitinases enlèvent les chaînes d'ubiquitine en les hydrolysant sur les protéines modifiées. A20, OTULIN, CYLD, et CEZANNE, sont des DUBs qui régulent négativement la voie NFκB [4,5]. Les polymorphismes de ces DUBs ont été associés variablement à des maladies autoimmunes, des cancers et des maladies neurodégénératives [5,16–19].

2.2. Haploinsuffisance de la protéine A20

La protéine A20 est un régulateur négatif de la voie de signalisation du NFκB ; des polymorphismes du gène *TNFAIP3* ont été trouvés associés à diverses maladies autoimmunes: lupus, polyarthrite rhumatoïde, psoriasis, maladie de Crohn et diabète de type 1[17]. La protéine A20 a une dualité de fonction : par son domaine OTU elle joue un rôle de DUB, et

par son domaine ZF (sept doigts de zinc) elle a une fonction d'ubiquitination (E3 ligase) ; sa fonction DUB consiste à enlever des chaînes d'ubiquitine liées à K63 sur des protéines de signal comme TRAF6 (TNFR-associated factor 6) et RIPK1 (Receptor-interacting serine/threonine-protein kinase 1) dans la voie NFκB[4,17,18]. Dans sa fonction ubiquitination elle lie des chaînes d'ubiquitine liées à K48 sur RIPK1 pour la diriger vers le protéasome pour dégradation ; l'haploinsuffisance de A20 résulte en la perte d'une des copies du gène A20 ; la protéine correspondante ne peut plus être produite en quantité suffisante ce qui altère sa fonction[4,8].

2.3. Otulinopénie

Le complexe LUBAC est une ubiquitinase (E3 ligase) chargée de maintenir la stabilité de nombreuses protéines régulatrices de l'immunité innée comme le récepteur 1 du TNF (TNFR1), les récepteurs toll-like (TLRs), le récepteur de l'interleukine 1 (IL-1R,) le CD40, et des inflammasomes (inflammasome receptor signaling complexes : RSCs) [4,14,15]. Sous l'effet de signaux proinflammatoires, le complexe LUBAC est recruté pour ajouter des chaînes d'ubiquitination linéaire à ses substrats que sont IKK (NEMO), RIPK1, RIPK2, IRAKs, MyD88, et ASC (figure 1). L'ubiquitination linéaire par le complexe LUBAC est indispensable à l'assemblage des inflammasomes[5]. Le complexe LUBAC est formé de HOIP (HOIL-1 interacting protein; *RNF31*) et de deux protéines accessoires HOIL 1 (heme-oxidized IRP2 ubiquitin ligase 1; *RBCK1*) et SHARPIN (heme-oxidized IRP2 ubiquitin ligase 1; *RBCK1*) ; L'otuline (*gumby*; *FAM105B*) est une protéine qui régule négativement la fonction d'ubiquitination linéaire du complexe LUBAC en effectuant une hydrolyse linéaire des chaînes d'ubiquitine liées par une Met1 [4,7,9].

Ainsi, lorsque des mutations touchent les gènes *TNFAIP3* et *OTULIN*, codant respectivement les protéines A20 et otuline, le système d'ubiquitination/dés-ubiquitination des protéines est perturbé et la voie NFκB peut être anormalement activée et aboutir à un phénomène autoinflammatoire [4] (table 1).

3. Epidémiologie

3.1. Haplo insuffisance du gène TNFAIP3 (codant la protéine A20)

L'incidence et la prévalence de cette nouvelle entité autoinflammatoire ne sont pas connues ; à ce jour 51 observations ont été rapportées de façon cosmopolite ; la plupart de ces observations sont dites « Behçet-like » du fait de l'aphtose bipolaire [6,8,10–13,20]. Les patients sont majoritairement de sexe féminin (68 %) d'origine japonaise (60 %), caucasienne (30 %) et turque (10 %) (table 2). Les symptômes commencent dans l'enfance chez la grande majorité des patients (92 %). Parmi les vingt-deux patients appartenant à 9 familles décrites par Kadowaki *et al.*, 9/22 présentaient un tableau Behçet-like et 13/22 des tableaux plus complexes associant des manifestations autoinflammatoires et une autoimmunité permettant de penser que le nombre de cas non encore identifiés pourrait être assez important [12].

3.2. Otulinopénie

Pour l'instant 6 patients seulement ont été décrits, issus de 3 familles consanguines, 2 d'origine turque et une d'origine pakistanaise ; dans une des familles, deux patients sont décédés précocement, probablement du même déficit ; les symptômes ont commencé en période néonatale dans les 3 premiers mois de vie, et un patient avait un tableau ressemblant au PRAAS du fait de la présence de lipodystrophie et de panniculite ; trois des 6 enfants étaient nés prématurés [7,9].

4. Spectre clinique (table 1)

4.1. HA20 (tables 1, 2, 3 et figure 2)

La description initiale de Zhou et al, est plus détaillée dans une publication récente de la même équipe [6,8]. Les 16 patients sont issus de 7 familles dont 5/7 multiplexes avec une transmission dominante. Chez ces patients la maladie commençait tôt dans la vie avec certaines ressemblances avec la MB du fait de la présence d'aphtose bipolaire chez la majorité des patients ainsi que d'une inflammation oculaire [6] (figure 2). Elle s'en distinguait par la présence de poussées fébriles dans la majorité des cas associées à une inflammation biologique chez tous les patients lors des poussées (non habituelle dans la MB où l'inflammation systémique n'accompagne que les poussées de sérite, de vascularite et lors des atteintes digestives qui sont par ailleurs rares dans les populations non asiatiques), la prédominance d'uvéites antérieures et la relative fréquence de colite ulcéreuse associée (6/11

patients) avec diarrhée sanglante. Une autre différence importante est que certains des patients souffraient d'infections ORL et pulmonaires à répétition. Deux patients ont développé une vascularite cérébrale et un patient a présenté une thrombose pulmonaire liée à une vascularite. Certains patients avaient des stigmates d'auto-immunité biologique. Le diagnostic initial était majoritairement une MB mais pour d'autres il s'agissait d'un PFAPA (Periodic Fever Aphthous stomatitis Pharyngitis Adenitis), d'une arthrite juvénile, d'un lupus ou d'une maladie de Crohn [6]. Vingt-deux autres patients avec un HA20 et appartenant à 9 familles sont décrits par Kadowaki *et al.* ; neuf patients d'entre eux présentaient un tableau Behçet-like avec des âges de début dans l'enfance ou l'adolescence, 4/22 avaient débuté comme des PFAPA, 2/22 sous forme d'AJI (arthrite juvénile idiopathique) polyarticulaire; les autres patients présentaient au début une maladie de Kawasaki, une FMF (fièvre méditerranéenne familiale)-like et des aphtoses buccales à répétition[12]. L'association autoimmunité et autoinflammation était présente chez 9/22 patients (en dehors des 9 ayant le tableau Behçet-like) et comportait du psoriasis, des thyroidites autoimmunes, des maladies de Crohn, et un lupus ayant évolué vers un ALPS (syndrome lymphoprolifératif avec autoimmunité). En plus de ces deux séries importantes, 10 autres patients sont décrits avec des tableaux d'aphtose et de fièvre récurrente ce qui porte à 51 le nombre de patients publiés au total à ce jour et résumés dans les tables 2 et 3. Par souci de clarté, une observation bien différente associant un syndrome polymalformatif, une vascularite récurrente à IgA et une autoimmunité mais sans fièvre récurrente due à une large délétion comprenant 60 gènes sur le chromosome 6 p dont *CITED2*, *IFNGRI* et *TNFAIP3* n'a pas été incluse dans la table 3 [21] .

4.2. Otulinopénie (Otulin-related autoinflammatory syndrome :

ORAS)

Le tableau clinique comporte des manifestations inflammatoires systémiques sévères néonatales faites de fièvres prolongées, de gonflements articulaires, d'une diarrhée sévère avec retard de croissance staturopondérale. Les poussées sont longues et ne cèdent pas sans traitement[7,9]. Sur le plan cutané, diverses éruptions sont décrites : érythèmes, pustules, nodules sous cutanés, panniculites et lipodystrophies. La table 1 et la figure 3 résument les atteintes principales des ubiquitinopathies de la voie NFκB par mutation de *TNFAIP3* et *d'OTULIN*.

5. Aspects génétiques

5.1. HA20

Le gène *TNFAIP3* (tumor necrosis factor α -induced protein 3, A20) qui code la protéine A20 se situe sur le chromosome 6 et comporte 9 exons ; le premier exon est non codant ; cinq exons contribuent à la formation du domaine OTU (ovarian tumor), 3 exons au domaine doigts de zinc, le dernier exon étant en partie non codant ; la protéine correspondante comporte deux domaines principaux un domaine OTU (ovarian tumor) en région N terminale qui est essentiel à l'activité déubiquitineuse de A20 (c'est une cystéine C103 qui confère une K63 déubiquitination.) et un domaine C terminal en 7 doigts de zinc (7 ZF) qui lui confère une activité d'ubiquitineuse [3,4,8,17,18]. Les mutations décrites sont pour la plupart des mutations non-sens ou des petites délétions décalant le cadre de lecture, résultant en une troncation du domaine OTU ou dans le domaine ZF altérant la fonction de la protéine A20 ; il n'est pas possible aujourd'hui d'effectuer des corrélations entre le génotype et le phénotype et l'extrême variabilité du tableau clinique et de l'évolution des patients décrits avec HA20 permet de penser que d'autres facteurs comme des gènes modificateurs ou une régulation épigénétique sont probablement impliqués [4]. Il semblerait néanmoins que les patients ayant des mutations dans le domaine ZF d'ubiquitination aient le même phénotype que ceux ayant des mutations dans le domaine OTU [4].

5.2. Otulinopénie

Le gène *OTULIN* (*FAM105B*) comporte 7 exons et est situé sur le chromosome 5 ; l'otulinopénie résulte de mutations récessives (faux sens et petites délétions décalant le cadre de lecture) entraînant une perte de fonction. Damgaard *et al* ont rapporté 3 patients issus d'une même famille consanguine et porteurs d'une mutation homozygote faux sens dans le gène de l'*OTULIN* (c.815T>C; p.Leu272Pro ; L22P dans l'exon 6) ; cette mutation déstabilise l'otuline et diminue sa fonction ; les cellules des patients exprimaient des taux élevés de Met1-Ub en comparaison des contrôles [7]. En plus de cette mutation, deux autres sont décrites dans le domaine OTU par Zhou *et al*, une délétion dans l'exon 5 (c.517delC) et une substitution dans l'exon 6 (c.731A>G) [9].

6. Diagnostics différentiels

6.1. HA2O

6.1.1. Maladies autoinflammatoires polygéniques

6.1.1.1. *Maladie de Behçet (MB)*

Le principal diagnostic différentiel est la MB, particulièrement dans sa forme pédiatrique, il existe cependant des différences représentées sur la figure 4. Un début très précoce, une transmission d'allure dominante et la présence de poussées fébriles doivent faire suspecter un HA2O. Dans la MB sporadique, le début est plus tardif (vers l'âge de 30 ans), les aphtes buccaux et génitaux évoluent en général sans contexte fébrile et inflammatoire et les aphtes buccaux ne laissent pas de cicatrice. Les uvéites du Behçet sporadique sont plutôt postérieures ou totales et rarement antérieures isolées et la vascularite rétinienne prend un aspect hémorragique formant des feuilles de fougère. Les signes digestifs de la MB sont généralement discrets (douleurs abdominales isolées) et il existe rarement une colite hémorragique en rapport avec des ulcérations aphtoïdes au premier plan. L'atteinte articulaire de HA2O (polyarthrite) est très différente des atteintes du Behçet qui sont plutôt des oligoarthrites touchant les membres inférieurs [6].

6.1.1.2. *Syndrome PFAPA*

Un syndrome de fièvre périodique avec adénites cervicales, pharyngite exsudative et aphtes peut éventuellement masquer un HA2O. Dans sa forme habituelle pédiatrique (enfants de moins de cinq ans), l'aphtose buccale reste mineure et il n'y a pas d'aphtose génitale. Les signes digestifs sont réduits à des douleurs abdominales liées à des ganglions mésentériques dans le PFAPA ; on n'y observe ni diarrhée, ni colite. L'évolution du PFAPA est en principe transitoire (quelques mois à années) avec la réserve que ce syndrome est parfois un mode d'entrée dans une pathologie inflammatoire plus complexe : authentique MB voir HA2O [22].

6.1.1.3. *AJI systémique*

La maladie de Still de l'enfant est une maladie autoinflammatoire marquée par des poussées fébriles de durée longue, associée à des éruptions maculeuses et à des atteintes articulaires allant d'arthralgies/myalgies simples à une polyarthrite destructrice. Elle n'a pas de marqueur de diagnostic de certitude fiable. Comme pour le syndrome PFAPA, certains patients

rapportés par Kadowaki sont entrés dans leur maladie par des manifestations « Still-like » et ont évolué au cours du temps vers un profil plus autoimmun de type rhumatisme psoriasique [23].

6.1.2. Les maladies inflammatoires monogéniques du côlon et de l'intestin

À côté des formes familiales de la maladie de Crohn correspondant à des mutations du gène NOD2/CARD15 et dont la reconnaissance est favorisée par l'histologie, un certain nombre de colites ulcéreuses sont liées à des affections monogéniques. Celles-ci débutent en période néonatale ou dans les premiers mois de vie avec une sévérité pouvant parfois nécessiter une greffe de moelle allogénique. Parmi celles-ci il faut évoquer en fonction des signes associés des déficits immunitaires primitifs comme l'IPEX (X-Linked immuno-dysregulation, polyendocrinopathy, enteropathy,) et le XIAP (X-linked inhibitor apoptosis) I, ou des causes autoinflammatoires comme les déficits en IL10 et IL10 R et le déficit en mévalonate kinase.

6.1.3. Les autres maladies autoinflammatoires monogéniques

Les fièvres récurrentes historiques comme le déficit en mévalonate kinase, les cryopyrinopathies, et la FMF peuvent donner des aphtes ; le syndrome TRAPS (TNF Receptor Associated Periodic Syndrome) peut entraîner des poussées de fièvre longues [1]. Il faut bien veiller à faire un arbre généalogique et connaître l'origine géographique des patients.

6.2. Otulinopénie

6.3. Maladies autoinflammatoires polygéniques

Certaines maladies inflammatoires chroniques intestinales à début précoce peuvent ressembler à une otulinopénie [1]. Des dermatoses neutrophiliques et le syndrome de Sweet sont également un diagnostic différentiel avec les signes cutanés[24]

6.4. Maladies autoinflammatoires monogéniques

Le syndrome de Majeed par mutation de *LPIN2* donne une dermatose neutrophilique à début néonatal [1]. Les maladies de Crohn monogénique peuvent mimer une otulinopénie. Enfin, le syndrome autoinflammatoire avec dermatose neutrophilique associé à la pyrine (PAAND),

peut donner une atteinte cutanée, digestive voir cardiaque similaire [25]. Le syndrome PRAAS est lié à des mutations ponctuelles (homozygotes, hétérozygotes composites, doubles hétérozygotes, ou hétérozygotes simples) entraînant une perte de fonction du protéasome constitutif (PMSB4, PMSA3), du protéasome inductible ou immunoprotéasome (PSMB8, PSMB9) ou de la protéine chaperonne (POMP). Toutes les mutations décrites altèrent l'assemblage des différentes sous unités et donc la fonction essentielle qui est de dégrader les protéines [1,2,26]. Les patients présentent une fièvre hectique débutant en période néonatale, des éruptions de type panniculite avec lipoatrophie progressive, de la myosite, des éruptions périorbitaires violacées et des calcifications cérébrales et vasculaires. Une CRP élevée, une hypergammaglobulinémie et une autoimmunité biologique sont fréquentes. Toutefois, l'atteinte digestive sévère de l'otulinopénie n'y est pas présente.

7. Aspects thérapeutiques

Les données sur les traitements appliqués et leur efficacité restent assez limitées et sont extraites d'expériences de cas rétrospectifs.

7.1. HA20

Tous les patients décrits ont nécessité des traitements allant de la colchicine seule (efficace chez 8 patients), jusqu'à des associations de corticoïdes et d'immunosuppresseurs (méthotrexate, azathioprine, thalidomide, cyclophosphamide, tofacitinib). Globalement les corticoïdes étaient efficaces mais avec des niveaux de corticodépendance élevés occasionnant des effets secondaires majeurs. Les biothérapies utilisées étaient l'anakinra, le tocilizumab, et les anti-TNF et étaient considérées comme pouvant avoir un effet sur l'inflammation systémique. Des traitements substitutifs par IgIV ont été utilisés chez les quelques patients avec déficit immunitaire humoral associé [6,8,10–13,20] . Il est probable que pour les patients avec HA20 une approche thérapeutique personnalisée basée en partie sur les taux de cytokines détectées, soit la plus adaptée car il existe probablement une grande variabilité phénotypique qui complexifie l'établissement d'une prise en charge standardisée. Un patient présentant des manifestations sévères à type de vascularite cérébrale a eu une greffe de moelle allogénique puis a récidivé en postgreffe sur un mode lupus-like ; un autre patient est décédé de complications digestives hémorragiques [6,12].

7.2. Otulinopénie

Les patients atteints d'ORAS rapportés dans la littérature ont été traités principalement (5/6) par des anti TNF ; un patient sur les six a été traité par des corticoïdes et de l'anakinra [7,9].

8. Aspects évolutifs

8.1. HA20

Globalement les patients atteints de HA20 évoluent au cours de leur vie en passant d'un profil autoinflammatoire à un profil autoimmun et inversement ; deux patients de la littérature ont évolué vers un syndrome ALPS, syndrome habituellement attribué à des mutations affectant l'apoptose (Fas/FasL)[3,12,19,27]. Le phénotype inflammatoire semble au-devant de la scène et les patients sont généralement réfractaires aux traitements. La variabilité du phénotype au cours de la vie complexifie un peu plus la prise en charge qui semble s'approcher de la médecine personnalisée [4,6,12] .

8.2. Otulinopénie

L'évolution à long terme n'est pas connue mais il semblerait que les patients sous traitement par anti TNF ou anti IL-1 aient récupéré une croissance normale et soient correctement contrôlés sur le plan inflammatoire ; cette affection ne comportant pas de déficit immunitaire, les infections constatées ont été attribuées aux traitements immunosuppresseurs [4,7,9].

9. Conclusion

Cette revue décrivant une nouvelle voie possible pour l'autoinflammation nous rappelle une fois de plus les limites de la médecine purement clinique en revisitant bien des entités comme le syndrome/MB, le syndrome PFAPA et l'arthrite juvénile. Elle nous remet en perspective l'importante intrication de l'autoinflammation avec l'autoimmunité, (c'est-à-dire immunités innée et adaptative) un même défaut apparaissant pouvoir donner chez un même individu au cours de sa vie un PFAPA puis une MB voire un syndrome ALPS. L'extrême hétérogénéité des patients portant parfois une même mutation ouvre aussi la voie à une médecine

personnalisée pour mieux comprendre les mécanismes physiopathologiques faisant intervenir probablement d'autres gènes modificateurs et pour mieux cibler les traitements.

Conflits d'intérêts

IKP, SGL, VH ont reçu dans le passé des émoluments pour des expertises ou des conférences pour les laboratoires Novartis et Sobi sans lien avec cette revue.

Références

- [1] Georgin-Lavialle S, Rodrigues F, Hentgen V, Fayand A, Quartier P, Bader-Meunier B, et al. [Clinical overview of auto-inflammatory diseases]. *Rev Med Interne* 2018;39:214–32. doi:10.1016/j.revmed.2018.01.004.
- [2] Aksentijevich I, McDermott MF. Lessons from characterization and treatment of the autoinflammatory syndromes. *Curr Opin Rheumatol* 2017;29:187–94. doi:10.1097/BOR.0000000000000362.
- [3] Manthiram K, Zhou Q, Aksentijevich I, Kastner DL. The monogenic autoinflammatory diseases define new pathways in human innate immunity and inflammation. *Nat Immunol* 2017;18:832–42. doi:10.1038/ni.3777.
- [4] Aksentijevich I, Zhou Q. NF- κ B Pathway in Autoinflammatory Diseases: Dysregulation of Protein Modifications by Ubiquitin Defines a New Category of Autoinflammatory Diseases. *Front Immunol* 2017;8:399. doi:10.3389/fimmu.2017.00399.
- [5] Kattah MG, Malynn BA, Ma A. Ubiquitin-Modifying Enzymes and Regulation of the Inflammation. *J Mol Biol* 2017;429:3471–85. doi:10.1016/j.jmb.2017.10.001.
- [6] Aeschlimann FA, Batu ED, Canna SW, Go E, Gül A, Hoffmann P, et al. A20 haploinsufficiency (HA20): clinical phenotypes and disease course of patients with a newly recognised NF- κ B-mediated autoinflammatory disease. *Ann Rheum Dis* 2018;77:728–35. doi:10.1136/annrheumdis-2017-212403.
- [7] Damgaard RB, Walker JA, Marco-Casanova P, Morgan NV, Titheradge HL, Elliott PR, et al. The Deubiquitinase OTULIN Is an Essential Negative Regulator of Inflammation and Autoimmunity. *Cell* 2016;166:1215–1230.e20. doi:10.1016/j.cell.2016.07.019.
- [8] Zhou Q, Wang H, Schwartz DM, Stoffels M, Park YH, Zhang Y, et al. Loss-of-function mutations in TNFAIP3 leading to A20 haploinsufficiency cause an early-onset autoinflammatory disease. *Nat Genet* 2016;48:67–73. doi:10.1038/ng.3459.
- [9] Zhou Q, Yu X, Demirkaya E, Deutch N, Stone D, Tsai WL, et al. Biallelic hypomorphic mutations in a linear deubiquitinase define otulipenia, an early-onset autoinflammatory disease. *Proc Natl Acad Sci U S A* 2016;113:10127–32. doi:10.1073/pnas.1612594113.
- [10] Shigemura T, Kaneko N, Kobayashi N, Kobayashi K, Takeuchi Y, Nakano N, et al. Novel heterozygous C243Y A20/TNFAIP3 gene mutation is responsible for chronic inflammation in autosomal-dominant Behçet's disease. *RMD Open* 2016;2:e000223. doi:10.1136/rmdopen-2015-000223.
- [11] Ohnishi H, Kawamoto N, Seishima M, Ohara O, Fukao T. A Japanese family case with juvenile onset Behçet's disease caused by TNFAIP3 mutation. *Allergol Int Off J Jpn Soc Allergol* 2017;66:146–8. doi:10.1016/j.alit.2016.06.006.
- [12] Kadowaki T, Ohnishi H, Kawamoto N, Hori T, Nishimura K, Kobayashi C, et al. Haploinsufficiency of A20 causes autoinflammatory and autoimmune disorders. *J Allergy Clin Immunol* 2018;141:1485–1488.e11. doi:10.1016/j.jaci.2017.10.039.
- [13] Franco-Jarava C, Wang H, Martin-Nalda A, Alvarez de la SD, García-Prat M, Bodet D, et al. TNFAIP3 haploinsufficiency is the cause of autoinflammatory manifestations in a patient with a deletion of 13Mb on chromosome 6. *Clin Immunol Orlando Fla* 2018;191:44–51. doi:10.1016/j.clim.2018.03.009.
- [14] Boisson B, Laplantine E, Dobbs K, Cobat A, Tarantino N, Hazen M, et al. Human HOIP and LUBAC deficiency underlies autoinflammation, immunodeficiency, amylopectinosis, and lymphangiectasia. *J Exp Med* 2015;212:939–51. doi:10.1084/jem.20141130.

- [15] Boisson B, Laplantine E, Prando C, Giliani S, Israelsson E, Xu Z, et al. Immunodeficiency, autoinflammation and amylopectinosis in humans with inherited HOIL-1 and LUBAC deficiency. *Nat Immunol* 2012;13:1178–86. doi:10.1038/ni.2457.
- [16] Cohen P. Immune diseases caused by mutations in kinases and components of the ubiquitin system. *Nat Immunol* 2014;15:521–9. doi:10.1038/ni.2892.
- [17] Ma A, Malynn BA. A20: linking a complex regulator of ubiquitylation to immunity and human disease. *Nat Rev Immunol* 2012;12:774–85. doi:10.1038/nri3313.
- [18] Martin F, Dixit VM. A20 edits ubiquitin and autoimmune paradigms. *Nat Genet* 2011;43:822–3. doi:10.1038/ng.916.
- [19] Takagi M, Ogata S, Ueno H, Yoshida K, Yeh T, Hoshino A, et al. Haploinsufficiency of TNFAIP3 (A20) by germline mutation is involved in autoimmune lymphoproliferative syndrome. *J Allergy Clin Immunol* 2017;139:1914–22. doi:10.1016/j.jaci.2016.09.038.
- [20] Berteau F, Rouvière B, Nau A, Le Berre R, Sarabay G, Touitou I, et al. Response to: “A20 haploinsufficiency (HA20): clinical phenotypes and disease course of patients with a newly recognised NF- κ B-mediated autoinflammatory disease.” *Ann Rheum Dis* 2018. doi:10.1136/annrheumdis-2018-213347.
- [21] Viel S, Cheyssac E, Pescarmona R, Besson L, Till M, Viremouneix L, et al. Large deletion in 6q associated to A20 haploinsufficiency and thoracoabdominal heterotaxy. *Ann Rheum Dis* 2018. doi:10.1136/annrheumdis-2018-213300.
- [22] Hofer M, Pillet P, Cochard M-M, Berg S, Krol P, Kone-Paut I, et al. International periodic fever, aphthous stomatitis, pharyngitis, cervical adenitis syndrome cohort: description of distinct phenotypes in 301 patients. *Rheumatol Oxf Engl* 2014;53:1125–9. doi:10.1093/rheumatology/ket460.
- [23] Cimaz R. Systemic-onset juvenile idiopathic arthritis. *Autoimmun Rev* 2016;15:931–4. doi:10.1016/j.autrev.2016.07.004.
- [24] Shwin KW, Lee C-CR, Goldbach-Mansky R. Dermatologic Manifestations of Monogenic Autoinflammatory Diseases. *Dermatol Clin* 2017;35:21–38. doi:10.1016/j.det.2016.07.005.
- [25] Masters SL, Lagou V, Jéru I, Baker PJ, Van Eyck L, Parry DA, et al. Familial autoinflammation with neutrophilic dermatosis reveals a regulatory mechanism of pyrin activation. *Sci Transl Med* 2016;8:332ra45. doi:10.1126/scitranslmed.aaf1471.
- [26] Brehm A, Liu Y, Sheikh A, Marrero B, Omoyinmi E, Zhou Q, et al. Additive loss-of-function proteasome subunit mutations in CANDLE/PRAAS patients promote type I IFN production. *J Clin Invest* 2015;125:4196–211. doi:10.1172/JCI81260.
- [27] Duncan CJA, Dinnigan E, Theobald R, Grainger A, Skelton AJ, Hussain R, et al. Early-onset autoimmune disease due to a heterozygous loss-of-function mutation in TNFAIP3 (A20). *Ann Rheum Dis* 2018;77:783–6. doi:10.1136/annrheumdis-2016-210944.

Légendes de figures

Figure 1. Mécanismes de l'ubiquitination des protéines.

La voie canonique NFKB est régulée à la fois par K63 (Lys63) et la chaîne linéaire d'ubiquitine (Ub). En aval du récepteur TNFR1 se situent des protéines cibles prédominante pour l'ubiquitination par K63 et les chaînes linéaires Ub comme TRADD, TRAF2, TRAF5 et RIP1. Ces protéines recrutent le complexe NEMO/IKK qui est également cible pour l'ubiquitination. Le complexe IKK ubiquitinylé est moins sensible à sa dégradation par le protéasome. Les chaînes Ub linéaires sont ajoutées par LUBAC. A20 et OTULIN régulent négativement la voie NF-KB en clivant les chaînes K63 et Ub linéaires des molécules cibles, dont RIP1 ; Si RIP1 est débubiquitiné par l'action DUB de A20, cela régule négativement l'action du complexe NEMO/IKK ce qui entraîne moins de libération de NFKB. De plus, A20 à travers son E3 l'activité ligase ajoute des chaînes K48 Ub à Rip1 et IKK γ en les ciblant pour la dégradation accrue par le protéasome. Une diminution de l'expression d'A20, chez les patients avec HA20, ou d'OTULIN chez les patients présentant une otulinopénie / ORAS conduira à l'activation de la voie NFKB, une augmentation de l'expression des transcrits pro-inflammatoires dans les cellules immunitaires et l'inflammation systémique. La diminution de l'expression des sous-unités du complexe LUBAC, chez les patients porteurs de mutations HOIP ou HOIL-1, entraîne une inhibition de la voie NFKB dans les fibroblastes et les lymphocytes B causant l'immunodéficience. Cependant, leurs monocytes produisent les cytokines pro-inflammatoires en excès. Abréviations : TNFR1, Le récepteur du TNF 1; IKK γ / NEMO, inhibiteur du facteur nucléaire kappa B kinase sous-unité gamma ; LUBAK : complexe linéaire d'assemblage de chaînes d'ubiquitine.

Figure 2. Principaux signes cliniques de l'haploinsuffisance A20.

Figure 3. Principaux signes cliniques de l'otulinopénie

Figure 4. Signes cardinaux différenciant HA20 « Behçet-like » et maladie de Behçet

Tables

Table 1. Comparaison des principales caractéristiques du déficit en A20 et de l'otulinopénie

Maladie	HA20	Otulinopénie
Gène	<i>TNFAIP3</i>	<i>OTULIN</i>
Protéine	A20	Otuline
Transmission	Autosomique dominant	Autosomique récessif
Type de mutation	Mutations stop ou faux sens ou délétion ⇒ Perte de fonction	Mutations faux sens et délétion ⇒ Perte de fonction
Répartition	Cosmopolite mais 60 % de Japonais	3 familles originaires de Turquie et du Pakistan
Principaux signes cliniques	Dans près de 85 % des cas : aphthose bipolaire, fièvre Dans près de 50 % des cas : troubles digestifs et cutanés Dans 30 % des cas : arthromyalgies Rares atteintes ophtalmiques	Dans 100 % des cas : fièvre, rash, panniculite nodulaire, arthrites Dans 66 % des cas : diarrhée et douleurs abdominales Dans 50 % des cas : adénopathies et hépatosplénomégalie Dans 33 des cas : pustules
Age de début	Dans les 10 premières années de vie	Dans les 3 premiers mois de vie
Durée des crises	3 à 14 jours	Plus de 10 jours
Inflammation	Oui	Oui

Table 2. Principales caractéristiques du HA20 avec autoinflammation d'après les 51 cas publiés de la littérature

		Fréquence (%)
Démographie	Pays d'origine	
	Japon	60 %
	Caucasien	30 %
	Turquie	10 %
Age de début	Sex ratio : femmes	68.6%
	Minimum 2 mois	92 % dans l'enfance
	Maximum 20 ans	
Durée des crises	Entre 3 et 14 jours. Parfois signes permanents	
Fréquence des crises	Entre 1 et 12/an	
Signes cliniques	Aptose buccale	88 %
	Fièvre récurrente	78 %
	Aptose génitale	68 %
	Troubles digestifs	57 %
	Signes cutanés	45 %
	Signes musculo-squelettiques	31 %
	Signes ophtalmologiques	10 %
	Manifestations cardiovasculaires	8 %
	Déficit immunitaire	6 %
	Atteinte du système nerveux central	4 %
Anomalies biologiques	Autoanticorps (n = 17) dont: - antithyroïdiens (n = 8) - antinucléaires (n = 4)	33 %
Traitements efficaces	Colchicine (n = 8)	15.7 %
	Infliximab (n = 6)	11.7 %
	Anakinra (n = 2) et adalimumab (n = 2)	8 %

Table 3 : Manifestations cliniques des patients avec HA20, revue de la littérature.

No Pts /Sexe [ref]	Age de début	Aphthose	Signes cutanés	Signes digestifs	Signes articulaires	Signes oculaires	Signes neurologiques	Signes cardio-vasculaires	Infections	Auto-immunité
16/13F3G [6]	7 mois à 16 ans	16/16 Buccale 16/16 Génitale 15/16 Périnéale 2/16	8/16 Acné 2/16 Folliculite 4/16 Pustules 4/16 Abscess cutanés 2/16 Rash malaire 1/16 Papules 1/16 Stevens Johnson 1/16	9/16 Colite ulcéreuse 6/16 Malabsorption 1/16 Perte poids, anorexie 1/16	9/16 Arthralgies 2/16 Polyarthrite 7/16	3/16 Uvéite antérieure 2/16 Vascularite rétinienne nécroisante 1/16	1/16 Vascularite du SNC avec chorée 1/16	3/16 Péricardite 2/16 Embolie pulmonaire 1/16	2/16 Virales et bactériennes (déficit en sous classes d'IgG et lymphopénie)	6/16 ANA 4/10 Anti DNA 2/6 LAC 6/7 Anti cardiolipin 1/16
6/5F1G [10]	8 ans à 17 ans	6/6 Buccale 6/6 Génitale	6/6 Folliculite 4/6 Ulcération périnéale 1/6	1/6 Colite ulcéreuse 1/6	0	0	0	0	0	Syndrome néphrotique

			4/6	Erythème noueux 4/6													
3/2F1G [11]	9 mois à 11 ans	3/3 Buccale 2/3 Génitale 1 /3	0/3	Erythème 1/6	3/3 Colites ulcéreuses 3/3	2/3 Polyarthrite 2/3	3/3 Uvéite ant 1/3 Ulcère de la conjonctive 1/3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3/2F1G [20]	6 mois à 6 ans	Buccale 3/3 Génitale 2/3	Folliculite 1/3 Réaction locale injection vaccin pneumocoque 1/3 Urticaire 1/3	Colite ulcéreuse 3/3	Arthrites 2/3	Epislérite 1/3	0	Phlébite membres inférieurs (1/3 avec 2 épisodes)	Pneumonie sous anti IL1 1/3	ANCA 1/3 Hashimoto 1/3							
22/13F1G [12]	2 mois à 20 ans	22/22 Buccale 17/22 Génitale 12/22	8/22		12/22	3/22	0	1/22	0					0	8/22	Anti thyroïdiens 7/22 AAN 1/22

**Fièvre
(78%)**

1-Aptose bipolaire (88%)

2-Signes digestifs (57%)

Diarrhée sanglante, douleur

3-Atteinte cutanée (45%)

Pustules, acné, folliculite, vésicules

4-Arthromyalgies (31%)

5-Atteinte ophtalmique (10%)

Uvéite antérieure, vasculite rétinienne

7-Atteinte système nerveux central (4%)

6-Atteinte cardiaque (8%) péricardite

Fièvre
CRP élevée
Polynucléose
Elevation des IgG
Auto anticorps

Diarrhée

Panniculite

Arthrites

Traitements efficaces
Corticoïdes + ou moins
Infliximab ++

HA20

Début presque toujours pédiatrique autosomique dominant

Aphtes ou ulcérations
buccales
Avec cicatrice

Abcès cutanés

Polyarthrites

Uvéite antérieure

Constante en poussée
Avec CRP élevée

Uvéite postérieure ou totale

Occasionnelle en poussée
CRP+ si sérite, thrombose

Colites fréquentes
Sévères, sanglantes
Au devant de la scène

Discrète
Colites rares
Hors Japon

Quasi constante, sévère

Variable

Aphtes buccaux
Pas de cicatrice

Oligoarthrites
Enthésites/SPA

Pustules
Aphtes
cutané