Republication de : Facteurs organisationnels associés à la réalisation d'une césarienne dans une population à bas risque

C. Duvillier, A. Rousseau, C. Bouyer, F. Goffinet, P. Rozenberg

► To cite this version:

C. Duvillier, A. Rousseau, C. Bouyer, F. Goffinet, P. Rozenberg. Reproduction de : Facteurs organisationnels associés à la réalisation d'une césarienne dans une population à bas risque. La Revue Sage-Femme, 2019, 18, pp.14 - 23. 10.1016/j.sagf.2019.01.003 . hal-03486312

HAL Id: hal-03486312

<https://hal.science/hal-03486312>

Submitted on 20 Dec 2021

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Distributed under a Creative Commons Attribution - NonCommercial| 4.0 International License

Disponible en ligne sur

ScienceDirect
www.sciencedirect.com

Elsevier Masson France

EM|consulte
www.em-consulte.com

Mise au point

Facteurs organisationnels associés à la réalisation d'une césarienne dans une population à bas risque

Impact of organizational factors on the cesarean delivery occurrence in a low-risk population

C. Du villier^a, A. Rousseau^a, C. Bouyer^b, F. Goffinet^c, P. Rozenberg^{a,b,d,*}^a Unité de recherche EA 7285, université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines, 2, avenue de la source de la Bièvre, 78180 Montigny-le Bretonneux, France^b Réseau maternité en yvelines et périnatalité active (MYPA), Pavillon Courtois, 20, rue Armagis, 78100 Saint-Germain-en-Laye, France^c Maternité Port-Royal, Assistance publique-Hôpitaux de Paris, 123, boulevard de Port-Royal, 75014 Paris, France^d Service d'obstétrique et gynécologie, centre hospitalier Poissy/Saint-germain, 10, rue du Champ-Gaillard, 78300 Poissy, France

INFO ARTICLE

 Historique de l'article :
 Reçu le 18 mai 2018

 Mots clés :
 Césarienne
 Facteurs organisationnels
 Population à bas risque
 Classification de Robson

 Keywords:
 Cesarean delivery
 Organizational determinants
 Low-risk population
 Robson classification

R É S U M É

Objectif. – Il existe des différences considérables du taux de césariennes entre les maternités d'une même région. Le taux de césarienne a augmenté ces dernières années dans la population à bas risque. L'objectif de cette étude était d'étudier l'impact des facteurs organisationnels sur le taux de césarienne dans une population à bas risque.

Méthodes. – Nous avons réalisé une étude de cohorte rétrospective en population dans les dix maternités du réseau MYPA de 2009 à 2015. Nous avons sélectionné une population à bas risque en ne conservant que les groupes 1 et 3 de la classification de Robson. Le critère de jugement principal était l'accouchement par césarienne. Les facteurs organisationnels étudiés ont regroupé les caractéristiques structurelles des maternités (universitaire ou non, public ou privée, nombre d'accouchement annuel, unité de soins intensifs maternels, unité de soins intensifs néonataux, nombre de salle de naissance) et l'organisation de l'équipe soignante (nombre de sages-femmes et d'obstétriciens, mode de garde, charge de travail et réalisation d'une revue de morbi-mortalité). Nous avons réalisé une analyse multiniveau à intercept aléatoire, univariée puis multivariée en retenant les variables ayant un $p < 0,20$.

Résultats. – Notre population d'étude a inclus 64 100 femmes. Le taux de césarienne a varié de 5,5 à 11,3 % parmi les 10 maternités. En analyse univariée, les variables organisationnelles significativement associées à la réalisation d'une césarienne étaient le statut de la maternité (centre hospitalier universitaire, centre hospitalier public non universitaire et établissement privé) et la réalisation d'une revue de morbi-mortalité. Cependant, après ajustement, aucun de ces facteurs organisationnels n'était significativement associé à la réalisation d'une césarienne. Lorsque l'analyse multivariée a été restreinte au sous-groupe des nullipares, le statut privé de la maternité était significativement associé à un taux plus élevé de césariennes (OR = 1,39 [1,09–1,76]). De même, la probabilité de césarienne était plus importante lorsque le nombre d'accouchement par salle de naissance augmentait (OR = 1,15 [1,01–1,31]). Pour le sous-groupe des multipares, aucune variable n'était significativement associée à la réalisation d'une césarienne.

Conclusion. – Dans notre population globale à bas risque, aucun facteur organisationnel n'apparaissait associé à une augmentation du taux de césarienne. En revanche, dans la population des nullipares à bas risque, le statut privé du centre et un nombre élevé d'accouchement par salle de naissance étaient associés à un plus grand nombre de césariennes. Augmenter le nombre de salles de naissance pourrait donc être une piste pour tenter de réduire le nombre de césariennes. Les travaux à venir devraient également chercher à identifier les facteurs spécifiques permettant de réduire les différences de taux de césarienne entre maternités privées et publiques.

© 2018 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

* Auteur correspondant.

Adresse e-mail : prozenberg@chi-poissy-st-germain.fr (P. Rozenberg).

A B S T R A C T

Objective. – Huge differences in cesarean delivery rate exist between maternities in a same region. In recent years, the cesarean delivery rate has increased in the low-risk population. The objective of this study was to assess the impact of organizational factors on the cesarean delivery occurrence in a low-risk population.

Methods. – We performed a population-based cohort study in the MYPA perinatal network from 2009 to 2015. A low-risk population was selected, keeping only groups 1 and 3 of the Robson classification. The studied organizational factors included the structural characteristics of maternity (academic or not, public or private, number of annual births, maternal intensive care unit, neonatal intensive care unit, number of delivery rooms) and the organization of the health care team (number of midwives and obstetricians, on call duty, workload and implementation of a morbi-mortality review). We used a logistic multilevel model, based on random center effect, for both univariable and multivariable analysis.

Results. – Our study population included 64,100 women. The cesarean delivery rate ranged from 5.5 to 11.3 % among the 10 maternities. In univariate analysis, the organizational variables significantly associated with the cesarean delivery rate were maternity status (university hospital, non-university public hospital and private hospital) and the implementation of a morbi-mortality review. However, after adjustment, none of these organizational factors were significantly associated with the cesarean delivery occurrence. When multivariate analysis was restricted to the nulliparous subgroup, the private status of maternity was significantly associated with a higher rate of cesarean deliveries (OR = 1.39 [1.09–1.76]). Also, the probability of cesarean delivery was higher when the number of births by delivery room increased (OR = 1.15 [1.01–1.31]). For the multiparous subgroup, no variable was significantly associated with cesarean delivery occurrence.

Conclusion. – In our global low-risk population, no organizational factors appeared to be associated with an increase in cesarean delivery rate. On the other hand, in the low-risk nulliparous population, the private status of the maternity and a high number of births by delivery room were associated with more cesarean deliveries. Increasing the number of delivery rooms could be a way to reduce the number of cesarean deliveries. Future researches should also try to identify specific factors that can reduce differences in cesarean delivery rates between private and public maternities.

© 2018 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

1. Introduction

La césarienne est l'intervention chirurgicale la plus pratiquée dans le monde. Or, il existe des différences considérables de taux de césariennes entre les pays, les régions d'un même pays, et même les maternités d'une même région. Le taux de césarienne varie par exemple de 17 % [1] en Finlande à 32 % aux États-Unis [2] et même 56 % au Brésil [3]. En France, le taux de césarienne est de 20,4 % [4]. Au sein du réseau de périnatalité MYPA (maternité en Yvelines et périnatalité active), des variations importantes du taux global de césarienne ont été rapportées entre les 10 maternités du réseau allant de 18,4 à 29,6 % [5]. Il est donc important et utile de comprendre les éléments contribuant à cette grande variabilité.

Dans ce but, l'Organisation mondiale de la santé (OMS) conseille de comparer les différentes maternités entre elles [6] en utilisant la classification de Robson [7–9]. Cette classification est totalement inclusive et basée sur les caractéristiques obstétricales des patientes. Elle comprend dix groupes, qui sont mutuellement exclusifs. Les groupes sont répartis suivant le nombre de fœtus, la parité, la présentation fœtale, le mode de début de travail, le terme à l'accouchement et l'éventuel antécédent de césarienne. Un avantage intéressant de la classification de Robson est de sélectionner facilement une population à bas risque.

Le taux de césarienne a augmenté ces dernières années dans la population à bas risque des nullipares à terme ayant un seul fœtus en présentation céphalique (groupe 1 de Robson). Cette augmentation du nombre de césarienne induit une augmentation de la contribution du groupe à bas risque au taux global de césarienne [10].

Plusieurs facteurs contribuant à l'augmentation du taux de césarienne ont été identifiés, notamment, les caractéristiques maternelles médicales, obstétricales et socio-économiques, le choix de la patiente et de l'obstétricien [11–15]. Cependant, il est peu probable que ces facteurs expliquent à eux seuls des variations considérables du taux de césarienne entre maternités [5,16], notamment dans des populations à bas risque obstétrical.

C'est pourquoi l'objectif de cette étude était d'étudier l'impact des facteurs organisationnels sur le taux de césarienne dans une population à bas risque.

2. Méthodes

Nous avons réalisé une étude de cohorte rétrospective en population sur tous les accouchements ayant eu lieu dans les dix maternités du réseau de périnatalité maternités en Yvelines et périnatalité active (MYPA) de janvier 2009 à décembre 2015.

Les données ont été extraites de la base de données CoNaissance 78. Ce programme repose sur l'exploitation du premier certificat de santé (PCS) complété par un certificat complémentaire ainsi qu'un certificat d'enfant mort-né, en collaboration avec le Conseil Départemental des Yvelines et l'unité Inserm EPOPé. Les principaux résultats issus de la base de donnée CoNaissance 78 ont récemment été publiés et montrent que le taux d'exhaustivité des PCS enregistrés dans les maternités du réseau MYPA par rapport à l'État Civil est de 99,1 % [5]. Nous avons classé tous les accouchements de la période d'étude selon la classification de Robson. Nous avons ensuite sélectionné une population à bas risque en ne conservant que les groupes 1 (nullipares à terme, en présentation céphalique, en travail spontané avec un seul fœtus) et 3 (multipares à terme, en présentation céphalique, en travail spontané avec un seul fœtus, sans antécédent de césarienne).

Le critère de jugement principal était l'accouchement par césarienne.

Les facteurs organisationnels étudiés ont regroupé les caractéristiques structurelles des maternités et l'organisation de l'équipe soignante. Ces caractéristiques ont été sélectionnées à partir des données de la littérature [17–20]. Les caractéristiques structurelles recueillies étaient le statut des maternités (centre hospitalier-universitaire, centre hospitalier public non universitaire et établissement privé), le nombre d'accouchement annuel et la composition du plateau technique (unité de soins intensifs

maternels, unité de soins intensifs néonataux, nombre de salle de naissance). Les caractéristiques recueillies pour définir l'organisation de l'équipe soignante étaient, le mode de garde de l'anesthésiste et de l'obstétricien, la réalisation d'une revue de morbi-mortalité (RMM) et la charge de travail des médecins et sages-femmes, modélisée par le ratio du nombre annuel d'accouchement sur le nombre de sages-femmes de garde en salle de naissance d'une part et le nombre d'obstétricien prenant des gardes dans la maternité d'autre part.

Les variables quantitatives ont été transformées en variables catégorielles. Nous avons réalisé une régression logistique en utilisant un modèle multiniveau à intercept aléatoire pour l'analyse univariée et l'analyse multivariée car nous avions comme hypothèse que nos données étaient corrélées au niveau du centre. L'utilisation d'un modèle multiniveau permettait de prendre en compte cette corrélation due aux données hiérarchiques et d'obtenir des odds ratio plus précis. Le premier niveau de ce modèle multiniveau correspondait aux données individuelles (femmes) et le deuxième niveau à la maternité. Nous avons dans un premier temps réalisé une analyse univariée et calculé les odds ratio avec leurs intervalles de confiance des facteurs potentiellement associés aux césariennes. Nous avons ensuite fait une analyse multivariée avec toutes les variables ayant un $p < 0,20$ et vérifié qu'il n'y avait pas d'interaction entre les variables du modèle. L'analyse multivariée a été réalisée en ajustant sur les variables obstétricales et socio-économiques significatives (âge maternel, niveau d'études, statut professionnel du père).

L'analyse multivariée a été réalisée sur les données complètes et nous avons estimé les odds ratios ajustés associés à la survenue d'une césarienne pendant le travail.

L'analyse a été réalisée dans un premier temps sur la population globale puis nous avons fait une analyse en sous-groupes afin d'étudier plus spécifiquement les facteurs associés au risque de césarienne parmi les nullipares et parmi les multipares.

L'analyse statistique a été réalisée avec R Studio, version 1.0.136.

3. Résultats

Durant la période d'étude, 124 945 accouchements ont été enregistrés. Notre population d'étude correspondant aux groupes 1 et 3 de Robson a inclus 64 100 femmes (Fig. 1). Dans cette population à bas risque, 29 423 femmes étaient nullipares (46 %). Le taux de césarienne a varié de 5,5 % à 11,3 % parmi les 10 maternités (Fig. 2), allant de 9,0 à 20,0 % parmi les nullipares et de 2,0 à 6,0 % parmi les multipares. Nous avons dans un premier temps décrit les variables organisationnelles au niveau de chaque maternité (Tableau 1).

En analyse univariée, les variables organisationnelles significativement associées au taux de césarienne étaient le statut de la maternité (centre hospitalier-universitaire, centre hospitalier public non universitaire et établissement privé) et la réalisation d'une RMM (Tableau 2). Après ajustement sur l'âge maternel, la parité, le niveau d'étude, le statut familial (en couple ou célibataire) et le statut professionnel de la patiente et de son conjoint, aucun de ces facteurs organisationnels n'étaient significativement associés au taux de césarienne (Tableau 3).

Lorsque l'analyse univariée a été restreinte au sous-groupe des nullipares, les variables organisationnelles significativement associées au risque de césarienne étaient le statut de la maternité, la réalisation d'une RMM, les ratios nombre d'accouchement par nombre de sage-femme, nombre d'accouchement par nombre de salle de naissance et nombre d'accouchement par nombre d'obstétricien (Tableau 4). Les variables « ratio d'accouchement par salle de naissance », « ratio d'accouchement par obstétricien » et « ratio d'accouchement par sage-femme » étant fortement corrélées entre elles, nous avons donc réalisé trois modèles pour étudier en analyse multivariée chacune de ces variables séparément (Tableau 5).

Le statut privé de la maternité était significativement associé à un nombre plus élevé de césariennes (OR = 1,39 [1,09–1,76]). De même, la probabilité de césarienne était plus importante lorsque le ratio accouchement par salle de naissance augmentait (OR = 1,15

Fig. 1. Diagramme de flux.

Fig. 2. Graphique représentant le taux de césarienne par maternité sur la population d'étude.

Tableau 1

Description de la population.

	Maternité 1	Maternité 2	Maternité 3	Maternité 4	Maternité 5	Maternité 6	Maternité 7	Maternité 8	Maternité 9	Maternité 10
<i>Statut</i>										
Centre hospitalier non universitaire		+	+	+	+					
Centre hospitalo-universitaire	+									
Centre privé						+	+	+	+	+
<i>Soins intensifs néonataux</i>										
Non		+		+	+	+	+	+	+	+
Oui	+		+							
<i>Nb. total d'accouchement</i>	16598	3904	9136	5599	7875	4757	2175	3055	4101	6850
<i>Nb. d'accouchement par an</i>										
< 1500		+		+		+	+	+	+	
1500–2500					+					
> 2500	+		+							+
<i>Ratio accouchement par salle de travail</i>										
Quartile 1 [102–335]						+	+	+	+	
Quartile 2 + 3 [336–541]		+	+	+	+					+
Quartile 4 [542–583]	+									
<i>Soins intensifs maternels</i>										+
Non						+	+			+
Oui	+	+	+	+	+			+	+	
<i>Présence de l'obstétricien</i>										
Garde de 24 heures	+	+	+	+	+			+	+	+
Astreinte						+	+			
<i>Présence de l'anesthésiste</i>										
Garde de 24 heures dans la maternité	+		+		+					+
Garde de 24 heures dans l'hôpital		+		+		+	+	+	+	
<i>Ratio accouchement par sage-femme</i>										
Quartile 1 [308–767]				+		+	+		+	
Quartile 2 + 3 [768–1138]	+	+			+			+		+
Quartile 4 [1139–1387]			+							
<i>Ratio accouchement par obstétricien</i>										
Quartile 1 [77–166]					+			+		
Quartile 2 + 3 [167–714]		+	+	+		+	+		+	+
Quartile 4 [715–779]	+									
<i>RMM</i>										
Non						+			+	
Oui	+	+	+	+	+		+	+		+

Tableau 2

Variables organisationnelles associées au taux de césariennes – analyse univariée avec un modèle à intercept aléatoire à effet centre.

Variables	OR	IC95 %	p
<i>Statut</i>			0,02
Centre hospitalier non universitaire	1		
Centre hospitalo-universitaire	1,26	[0,89; 1,77]	
Centre privé	1,36	[1,09; 1,69]	
<i>Soins intensifs néonataux</i>			0,82
Non	1		
Oui	0,96	[0,67; 1,37]	
<i>Nombre d'accouchement par an</i>			0,66
1500–2500	1		
< 1500	1,06	[0,94; 1,19]	
> 2500	1	[0,84; 1,18]	
<i>Ratio accouchement par salle de travail</i>			0,26
Quartile 2 + 3 [336–541]	1		
Quartile 1 [102–335]	1,03	[0,95; 1,12]	
Quartile 4 [542–583]	1,07	[0,99; 1,17]	
<i>Soins intensifs maternels</i>	0,91	[0,68; 1,23]	0,54
<i>Présence de l'obstétricien</i>			0,87
Garde de 24 heures	1		
Astreinte	1,03	[0,73; 1,46]	
<i>Présence de l'anesthésiste</i>			0,98
Garde de 24 heures dans la maternité	1		
Garde de 24 heures dans l'hôpital	> 0,99	[0,76; 1,33]	
<i>Ratio accouchement par sage-femme</i>			0,06
Quartile 2 + 3 [768–1138]	1		
Quartile 1 [308–767]	1,02	[0,95; 1,09]	
Quartile 4 [1139–1387]	0,89	[0,79; 0,99]	
<i>Ratio accouchement par obstétricien</i>			0,25
Quartile 2 + 3 [167–714]	1		
Quartile 1 [77–166]	1,05	[0,94; 1,17]	
Quartile 4 [715–779]	1,09	[0,98; 1,22]	
RMM	0,76	[0,57; 1,00]	0,05

Tableau 3

Variables organisationnelles associées au taux de césariennes – analyse multivariée avec un modèle à intercept aléatoire à effet centre.

Variables	OR	IC95 %	p value
<i>Statut</i>			0,16
Centre hospitalier non universitaire	1		
Centre hospitalo-universitaire	1,26	[0,91; 1,75]	0,28
Centre privé	1,29	[1,00; 1,65]	
RMM	0,90	[0,67; 1,21]	0,50
<i>Ratio accouchement par sage-femme</i>			0,28
Quartile 2 + 3 [768–1138]	1		
Quartile 1 [308–767]	1,07	[0,99; 1,16]	
Quartile 4 [1139–1387]	1,00	[0,86; 1,15]	

[1,01–1,31]). La variance inter maternités était de 0,05 et le pourcentage de variance expliquée par le niveau centre était de 0,06 %. La part de variance expliquée par nos modèles restait donc faible indiquant qu'une part importante des facteurs impliqués dans les variations du taux de césarienne reste inexpliquée.

Pour le sous-groupe des multipares, aucune variable n'était significativement associée à la variation du nombre de césarienne (Tableau 6).

4. Discussion

Notre étude montre qu'au sein d'une population à bas risque, le taux de césarienne variait de manière importante, passant du simple au double suivant la maternité. Cependant, en considérant la population globale, aucune variable organisationnelle, qu'il s'agisse des caractéristiques structurelles des maternités ou de l'organisation de l'équipe soignante, n'était associée significativement à la survenue d'une césarienne. En revanche, le statut de la maternité et le ratio d'accouchement par salle de naissance étaient

Tableau 4

Variables organisationnelles associées au taux de césariennes – analyse univariée sur le sous-groupe des nullipares avec un modèle à intercept aléatoire à effet centre.

Variables	OR	IC95 %	p
<i>Statut</i>			0,14
Centre hospitalier non universitaire	1		
Centre hospitalo-universitaire	1,13	[0,74; 1,71]	
Centre privé	1,31	[1,00; 1,70]	
<i>Soins intensifs néonataux</i>			0,8
Non	1		
Oui	0,95	[0,66; 1,37]	
<i>Nombre d'accouchement par an</i>			0,81
1500–2500	1		
< 1500	0,97	[0,85; 1,12]	
> 2500	0,94	[0,78; 1,14]	
<i>Ratio accouchement par salle de travail</i>			0,1
Quartile 2 + 3 [336–541]	1		
Quartile 1 [102–335]	1	[0,91; 1,10]	
Quartile 4 [542–583]	1,09	[0,99; 1,21]	
<i>Soins intensifs maternels</i>	0,97	[0,70; 1,33]	0,83
<i>Présence de l'obstétricien</i>			0,87
Garde de 24 heures	1		
Astreinte	0,97	[0,67; 1,41]	
<i>Présence de l'anesthésiste</i>			0,76
Garde de 24 heures dans la maternité	1		
Garde de 24 heures dans l'hôpital	1,05	[0,78; 1,41]	
<i>Ratio accouchement par sage-femme</i>			0,12
Quartile 2 + 3 [768–1138]	1		
Quartile 1 [308–767]	1,03	[0,96; 1,12]	
Quartile 4 [1139–1387]	0,9	[0,90; 1,02]	
<i>Ratio accouchement par obstétricien</i>			0,09
Quartile 2 + 3 [167–714]	1		
Quartile 1 [77–166]	1,06	[0,93; 1,21]	
Quartile 4 [715–779]	1,15	[1,01; 1,30]	
RMM	0,72	[0,53; 0,97]	0,03

significativement associés au taux de césarienne lorsque seule la population des nullipares était considérée.

Parmi les nullipares, le quartile correspondant au plus grand nombre d'accouchement par salle de naissance était, en effet, associé à une augmentation du nombre de césariennes. Cette variable reflétant l'occupation des salles de naissance, les variations de flux de nombre d'accouchement par salle semblent donc avoir un impact sur le taux de césarienne. Une activité importante pourrait donc influencer les pratiques des obstétriciens et conduire plus facilement à une décision de césarienne. Ce résultat n'est pas retrouvé chez les multipares. Le travail spontané de ce groupe de patientes étant plus rapide, il n'est pas surprenant que les variables organisationnelles n'aient pas ou moins d'influence.

En revanche, quand la disponibilité du personnel soignant et le mode de garde sont considérés, aucune des variables n'étaient associée significativement à la survenue d'une césarienne, contrairement à ce qui avait été précédemment décrit dans d'autres pays [21].

De plus, la charge de travail des sages-femmes n'était pas, dans notre population, associée aux variations de taux de césariennes. Ces résultats contradictoires d'autres études [22–25] peuvent s'expliquer par l'existence de recommandations éditées par la Haute Autorité de Santé. En effet les pratiques sont standardisées en France, et suivant le nombre d'accouchement annuel d'une maternité, le nombre de sages-femmes en salle de naissance et de pré-travail ainsi que le mode de garde de l'équipe médical est défini. Enfin, comme d'autres études l'avaient déjà montré, le nombre annuel d'accouchements et le type de maternité défini par la présence ou non d'une USI néonatale n'étaient pas associés à une augmentation du nombre de césarienne [17,26].

Nous avons utilisé la classification de Robson pour sélectionner notre population d'étude à bas risque. En effet, la plupart des

Tableau 5

Variables organisationnelles associées au taux de césariennes – analyse multivariée sur le sous-groupe des nullipares.

Variables	Modele 1		Modele 2		Modele 3	
	OR	IC95 %	OR	IC95 %	OR	IC95 %
<i>Statut</i>						
Centre hospitalier non universitaire	1		1		1	
Centre hospitalo-universitaire	1,17	[0,85; 1,62]	1,21	[0,88; 1,67]	1,09	[0,74; 1,59]
Centre privé	1,39	[1,09; 1,76]	1,31	[1,02; 1,68]	1,35	[1,05; 1,74]
<i>Ratio accouchement par salle de travail</i>						
Quartile 2 + 3 [336–541]	1					
Quartile 1 [102–335]	0,98	[0,87; 1,09]				
Quartile 4 [542–583]	1,15	[1,01; 1,31]				
<i>Ratio accouchement par sage-femme</i>						
Quartile 2 + 3 [768–1138]			1			
Quartile 1 [308–767]			1,09	[0,99; 1,20]		
Quartile 4 [1139–1387]			1,02	[0,87; 1,19]		
<i>Ratio accouchement par obstétricien</i>						
Quartile 2 + 3 [167–714]					1	
Quartile 1 [77–166]					1,04	[0,89; 1,22]
Quartile 4 [715–779]					1,16	[1,00; 1,36]
<i>RMM</i>	0,93	[0,72; 1,22]	0,9	[0,67; 1,21]	0,99	[0,73; 1,33]
<i>Âge maternel</i>						
20–35 ans	1		1		1	
< 20 ans	1,41	[1,30; 1,55]	1,41	[1,30; 1,55]	1,42	[1,30; 1,55]
> 35 ans	1,49	[1,12; 1,96]	1,48	[1,12; 1,96]	1,48	[1,12; 1,96]
<i>Niveau d'études</i>						
Études supérieures	1		1		1	
École primaire et secondaire	1,35	[1,17; 1,54]	1,35	[1,17; 1,54]	1,34	[1,17; 1,54]
Niveau bac	1,37	[1,24; 1,52]	1,37	[1,24; 1,52]	1,37	[1,24; 1,52]
<i>Statut professionnel du père</i>						
Actif	1		1		1	
Chômage	1,08	[0,88; 1,31]	1,08	[0,88; 1,31]	1,08	[0,88; 1,31]
Sans emploi	1,09	[0,92; 1,30]	1,09	[0,92; 1,30]	1,09	[0,92; 1,30]

Modèle 1 : modèle multivarié à intercept aléatoire sur l'effet centre : étude du nombre d'accouchement par salle de travail, ajusté sur le statut, la RMM, l'âge maternel, le niveau d'études et le statut professionnel du père. Modèle 2 : modèle multivarié à intercept aléatoire sur l'effet centre : étude du nombre d'accouchement par sage-femme, ajusté sur le statut, la RMM, l'âge maternel, le niveau d'études et le statut professionnel du père. Modèle 3 : modèle multivarié à intercept aléatoire sur l'effet centre : étude du nombre d'accouchement par obstétricien, ajusté sur le statut, la RMM, l'âge maternel, le niveau d'études et le statut professionnel du père.

Tableau 6

Variables organisationnelles associées au taux de césariennes – analyse univariée sur le sous-groupe des multipares avec un modèle à intercept aléatoire à effet centre.

Variables	OR	IC95 %	p
<i>Statut</i>			0,18
Centre hospitalier non universitaire	1		
Centre hospitalo-universitaire	1,41	[0,89; 2,22]	
Centre privé	1,28	[0,95; 1,73]	
<i>Soins intensifs néonataux</i>			0,72
Non	1		
Oui	1,08	[0,72; 1,60]	
<i>Nombre d'accouchement par an</i>			0,48
1500–2500	1		
< 1500	1,11	[0,91; 1,36]	
> 2500	1,1	[0,86; 1,41]	
<i>Ratio accouchement par salle de travail</i>			0,57
Quartile 2 + 3 [336–541]	1		
Quartile 1 [102–335]	1,07	[0,92; 1,25]	
Quartile 4 [542–583]	1	[0,86; 1,17]	
<i>Soins intensifs maternels</i>	0,96	[0,67; 1,37]	0,81
<i>Présence de l'obstétricien</i>			0,85
Garde de 24 heures	1		
Astreinte	0,96	[0,62; 1,49]	
<i>Présence de l'anesthésiste</i>			0,49
Garde de 24 heures dans la maternité	1		
Garde de 24 heures dans l'hôpital	0,89	[0,64; 1,24]	
<i>Ratio accouchement par sage-femme</i>			0,56
Quartile 2 + 3 [768–1138]	1		
Quartile 1 [308–767]	0,98	[0,86; 1,11]	
Quartile 4 [1139–1387]	0,9	[0,74; 1,09]	
<i>Ratio accouchement par obstétricien</i>			0,77
Quartile 2 + 3 [167–714]	1		
Quartile 1 [77–166]	1,02	[0,84; 1,24]	
Quartile 4 [715–779]	1,07	[0,88; 1,30]	
<i>RMM</i>	0,81	[0,56; 1,18]	0,28

femmes ayant une pathologie médicale ou obstétricale ayant habituellement un déclenchement artificiel du travail ou une césarienne programmée n'appartiennent donc pas aux groupes 1 et 3 de la classification de Robson. De plus, les facteurs de risque obstétricaux connus, à savoir la parité, le nombre de fœtus, la présentation fœtale, le mode de début de travail, l'antécédent de césarienne, la prématurité, interviennent dans cette classification pour définir les différents groupes. L'intérêt d'étudier cette population à bas risque était de supposer que ces patientes avaient a priori un risque faible de césarienne et donc que les variations du taux de césarienne entre les maternités devaient être minimales. Ce choix de population avait déjà été publié, montrant que cette population à bas risque représentait la majeure partie des parturientes [27]. De plus, grâce à l'utilisation de la classification de Robson, les principales variables obstétricales des parturientes étaient incluses dans notre analyse. Nous avons également inclus dans notre modèle l'âge maternel, facteur de risque établi de césarienne. Cependant, nous n'avons pas pu inclure, compte-tenu de la nature de notre base de données, l'indice de masse corporelle (IMC) des patientes, autre facteur de risque important [26,28,29].

La part de la variance expliquée étant très faible, d'autres facteurs organisationnels, non pris en compte dans notre modèle influencent très certainement le taux de césarienne comme l'existence de protocole, la discussion prospective ou rétrospective collégiale des dossiers, la réalisation de séances de simulation, e-learning. De même l'absence d'inclusion de facteurs médicaux et l'IMC doivent contribuer à cette faible part de la variabilité.

De même, la contribution du facteur « choix de la patiente » n'a pas pu être étudié dans notre modèle. Toutefois, il est très faible en France puisque le taux de césariennes électives pour désir maternel parmi les nullipares est inférieur à 1 % [30].

L'originalité de notre travail était d'inclure dans le même modèle les variables organisationnelles, obstétricales et socio-économiques, afin d'essayer de comprendre les éléments qui font varier le taux de césarienne avec autant d'importance. Nous avons disposé d'une grande population d'étude, soit 64 100 patientes sur sept années consécutives. De plus, la quasi-totalité des accouchements du réseau étaient inclus dans cette base de donnée puisque la base CoNaissance 78 a un taux d'exhaustivité de 99,1 %. Notre étude regroupait 10 maternités, 5 étant publiques et 5 étant privées. Cependant ces dix maternités appartenaient à un seul réseau de périnatalité. De plus, une maternité regroupait le plus grand nombre d'accouchement et était le seul centre hospitalier universitaire et le seul disposant d'une réanimation néonatale. Ce centre avait un poids important dans l'étude et le réseau MYPA pourrait différer des autres réseaux de périnatalité de France, limitant la validité externe de nos résultats.

Nous avons essayé de prendre en compte le niveau socio-économique des patientes car il a été montré qu'un faible niveau socio-économique était associé à un risque accru de césarienne. Cependant nous n'avions que des proxies à disposition et nous n'avions pas de variable reflétant de manière fiable le niveau socio-économique des patientes de notre population. Ces variables avaient toutefois déjà été utilisées dans d'autres études de périnatalité [31,32]. Enfin, une autre limite a été l'exclusion des femmes pour lesquelles la voie d'accouchement n'était pas renseignée et celles pour lesquelles les variables permettant de classer selon les groupes de Robson étaient manquantes. Cela représente respectivement 2,1 et 6,4 % de la population d'étude. Nous ne pouvons donc pas éliminer un possible biais de sélection. Cependant, le faible pourcentage de données manquantes n'affecte probablement pas nos résultats.

Au total, dans notre population globale à bas risque, aucun facteur organisationnel n'apparaissait associé à une augmentation de césarienne. En revanche, il y avait toujours une variation du simple au double entre les différentes maternités. Cependant, lorsque seules les nullipares ont été prises en compte, le statut privé du centre était associé à un plus grand nombre de césariennes. Sur cette population des nullipares, un ratio élevé d'accouchement par salle de naissance semble associé à un plus grand nombre de césariennes. Ainsi, augmenter le nombre de salles de travail pourrait donc être une piste pour tenter de réduire le nombre de césariennes parmi les nullipares, et ce d'autant plus que cette population représente l'enjeu le plus important, la réduction du taux de la première césarienne permettant de réduire le taux de patientes ayant un antécédent de césarienne, population pour laquelle le risque de césarienne itérative (programmée ou en cours de travail) est particulièrement important. Les travaux à venir devraient également chercher à identifier les facteurs spécifiques permettant de réduire les différences de taux de césarienne entre maternités privées et publiques.

Déclaration de liens d'intérêts

Les auteurs déclarent ne pas avoir de liens d'intérêts.

Références

- [1] Macfarlane A, Blondel B, Mohangoo A, Cuttini M, Nijhuis J, Novak Z, et al. Wide differences in mode of delivery within Europe: risk-stratified analyses of aggregated routine data from the Euro-Peristat study. *BJOG* 2016;123:559–68.
- [2] Osterman MJK, Kochanek KD, MacDorman MF, Strobino DM, Guyer B. Annual summary of vital statistics: 2012–2013. *Pediatrics* 2015;135:1115–25 [Disponible sur : <http://pediatrics.aappublications.org/content/early/2015/04/28/peds.2015-0434.Abstract>].
- [3] Betrán AP, Ye J, Moller A-B, Zhang J, Gülmezoglu AM, Torloni MR. The increasing trend in caesarean section rates: global, regional and national estimates: 1990–2014. *PLoS ONE* 2016;11:e0148343.
- [4] Blondel B, Coulm B, Bonnet C, Goffinet F, Le Ray C. National Coordination Group of the National Perinatal Surveys. Trends in perinatal health in metropolitan France from 1995 to 2016: results from the French National Perinatal Surveys. *J Gynecol Obstet Hum Reprod* 2017;46:701–13.
- [5] Lebreton E, Rozenberg P, Chalavoux K, Huart F, Cotte B, Pineau C, et al. Évaluation d'un réseau périnatal à partir des premiers certificats de santé. *J Gynecol Obstet Biol Reprod* 2014;43:342–50.
- [6] World Health Organization. WHO statement on caesarean section rates 2015;23:149–50.
- [7] Betrán AP, Vindevoghel N, Souza JP, Gülmezoglu AM, Torloni MR. A systematic review of the Robson classification for caesarean section: what works, doesn't work and how to improve it. *PLoS ONE* 2014;9:e97769 [Bhattacharya S, editor].
- [8] Torloni MR, Betrán AP, Souza JP, Widmer M, Allen T, Gülmezoglu M, et al. Classifications for caesarean section: a systematic review. *PLoS ONE* 2011;6:e14566 [Althabe F, editor].
- [9] Robson M, Hartigan L, Murphy M. Methods of achieving and maintaining an appropriate caesarean section rate. *Best Pract Res Clin Obstet Gynaecol* 2013;27:297–308.
- [10] Delbaere I, Cammu H, Martens E, Tency I, Martens G, Temmerman M. Limiting the caesarean section rate in low-risk pregnancies is key to lowering the trend of increased abdominal deliveries: an observational study. *BMC Pregnancy Childbirth* 2012;12:1.
- [11] McCourt C, Weaver J, Statham H, Beake S, Gamble J, Creedy DK. Elective caesarean section and decision-making: a critical review of the literature. *Birth* 2007;34:65–79.
- [12] Milcent C, Rochut J. Tarification hospitalière et pratique médicale : la pratique de la césarienne en France. *Rev Economique* 2009;60:489.
- [13] Spong CY, Berghella V, Wenstrom KD, Mercer BM, Saade GR. Preventing the first cesarean delivery: summary of a joint Eunice Kennedy Shriver national institute of child health and human development, society for maternal-fetal medicine, and American college of obstetricians and gynecologists workshop. *Obstet Gynecol* 2012;120:1181.
- [14] Robson S, Carey A, Mishra R, Dear K. Elective caesarean delivery at maternal request: a preliminary study of motivations influencing women's decision-making. *Aust N Z J Obstet Gynaecol* 2008;48:415–20.
- [15] Baicker K, Buckles KS, Chandra A. Geographic variation in the appropriate use of caesarean delivery. *Health Aff (Millwood)* 2006;25:w355–67.
- [16] Declercq E, Menacker F, MacDorman M. Maternal risk profiles and the primary caesarean rate in the United States, 1991–2002. *Am J Public Health* 2006;96:867–72.
- [17] Coulm B, Ray C, Lelong N, Drewniak N, Zeitlin J, Blondel B. Obstetric interventions for low-risk pregnant women in France: do maternity unit characteristics make a difference? *Birth* 2012;39:183–91.
- [18] Chaillet N, Dumont A. Evidence-based strategies for reducing caesarean section rates: a meta-analysis. *Birth* 2007;34:53–64.
- [19] Armstrong JC, Kozhimannil KB, McDermott P, Saade GR, Srinivas SK. Comparing variation in hospital rates of caesarean delivery among low-risk women using 3 different measures. *Am J Obstet Gynecol* 2016;214:153–63.
- [20] Snowden JM, Cheng YW, Kontgis CP, Caughey AB. The association between hospital obstetric volume and perinatal outcomes in California. *Am J Obstet Gynecol* 2012;207:478e1–7.
- [21] Karalis E, Gissler M, Tapper A-M, Ulander V-M. Effect of hospital size and on-call arrangements on intrapartum and early neonatal mortality among low-risk newborns in Finland. *Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol* 2016;198:116–9.
- [22] Scott KD, Berkowitz G, Klaus M. A comparison of intermittent and continuous support during labor: a meta-analysis. *Am J Obstet Gynecol* 1999;180:1054–9.
- [23] Zhang J, Geerts C, Hukkelhoven C, Offerhaus P, Zwart J, de Jonge A. Caesarean section rates in subgroups of women and perinatal outcomes. *BJOG* 2016;123:754–61.
- [24] Zhang J, Bernasko JW, Leybovich E, Fahs M, Hatch MC. Continuous labor support from labor attendant for primiparous women: a meta-analysis. *Obstet Gynecol* 1996;88:739–44.
- [25] Hellerstein S, Feldman S, Duan T. Survey of obstetric care and caesarean delivery rates in Shanghai, China. *Birth* 2016;43:193–9 [Disponible sur : <http://onlinelibrary.wiley.com/doi/10.1111/birt.12231/full>, cité 18 janvier 2017].
- [26] Kozhimannil KB, Law MR, Virnig BA. Caesarean delivery rates vary tenfold among US hospitals; reducing variation may address quality and cost issues. *Health Aff (Millwood)* 2013;32:527–35.
- [27] Le Ray C, Blondel B, Prunet C, Khireddine I, Deneux-Tharaux C, Goffinet F. Stabilising the caesarean rate: which target population? *BJOG* 2015;122:690–9.
- [28] Brennan DJ, Robson MS, Murphy M, O'Herlihy C. Comparative analysis of international caesarean delivery rates using 10-group classification identifies significant variation in spontaneous labor. *Am J Obstet Gynecol* 2009;201:308.e1–8.
- [29] Sebastião YV, Womack L, Vámos CA, Louis JM, Olaoye F, Caragan T, et al. Hospital variation in caesarean delivery rates: contribution of individual and hospital factors in Florida. *Am J Obstet Gynecol* 2016;214:123.e1–123.e18.
- [30] Le Ray C, Carayol M, Zeitlin J, Breart G, Goffinet F, Group PS, et al. Level of perinatal care of the maternity unit and rate of caesarean in low-risk nulliparas. *Obstet Gynecol* 2006;107:1269–77.
- [31] Kramer MS, Seguin L, Lydon J, Goulet L. Socio-economic disparities in pregnancy outcome: why do the poor fare so poorly? *Paediatr Perinat Epidemiol* 2000;14:194–210.
- [32] Fairley L. Social class inequalities in perinatal outcomes: Scotland 1980–2000. *J Epidemiol Community Health* 2006;60:31–6.