**Calcul théorique en couplage Λ - Σ du spectre
électronique des excimères Ar₂ et Kr₂ corrélé aux
configurations atomiques np⁵(n + 1) s et np⁵(n + 1) p**

Fernand Spiegelman, Florent X. Gadéa

► **To cite this version:**

Fernand Spiegelman, Florent X. Gadéa. Calcul théorique en couplage Λ - Σ du spectre électronique des excimères Ar₂ et Kr₂ corrélé aux configurations atomiques np⁵(n + 1) s et np⁵(n + 1) p. Journal de Physique, 1984, 45 (6), pp.1003-1023. 10.1051/jphys:019840045060100300 . jpa-00209831

HAL Id: jpa-00209831

<https://hal.science/jpa-00209831>

Submitted on 1 Jan 1984

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Classification

Physics Abstracts

31.20 — 31.50 — 33.10

Calcul théorique en couplage Λ - Σ du spectre électronique des excimères Ar_2 et Kr_2 corrélé aux configurations atomiques $np^5(n+1)s$ et $np^5(n+1)p$

F. Spiegelmann et F. X. Gadea

Laboratoire de Physique Quantique (*), Université Paul-Sabatier, 118, route de Narbonne, 31062 Toulouse Cedex, France

(Reçu le 10 octobre 1983, révisé le 2 janvier 1984, accepté le 6 février 1984)

Résumé. — Les courbes de potentiel adiabatiques de $\text{Ar}(3p^6\ ^1S_0) + \text{Ar}^*(3p^5\ 4s, 3p^5\ 4p)$ et de $\text{Kr}(4p^6\ ^1S_0) + \text{Kr}^*(4p^5\ 5s, 4p^5\ 5p)$ sont déterminées en représentation Λ , par des calculs d'IC *ab initio* mettant en œuvre des pseudopotentiels non empiriques et utilisant des bases d'orbitales étendues. Les croisements évités, avec des états corrélés à des configurations plus excitées, plus précisément 5s, 5p et 3d pour Ar_2^* , 6s, 6p et 4d pour Kr_2^* sont également pris en compte. L'analyse de la nature des OM Rydberg et des fonctions d'onde multiconfigurationnelles permet d'interpréter la structure du spectre électronique de ces deux excimères et de comprendre le caractère des croisements évités entre états Rydberg des gaz rares homonucléaires.

Abstract. — Adiabatic potential curves for $\text{Ar}(3p^6\ ^1S_0) + \text{Ar}^*(3p^5\ 4s, 3p^5\ 4p)$ and $\text{Kr}(4p^6\ ^1S_0) + \text{Kr}^*(4p^5\ 5s, 4p^5\ 5p)$ are determined in the Λ representation, from *ab initio* CI calculations using non-empirical pseudopotentials and extensive orbital basis sets. Avoided crossings with states correlated to higher excited configurations, e.g. 5s, 5p and 3d for Ar_2^* and 6s, 6p and 4d for Kr_2^* are also taken into account. The structure of the electronic spectrum of both excimers is interpreted; analysing the nature of the Rydberg MO's and the multiconfigurational wave-functions makes possible the understanding of the character of avoided crossing between Rydberg states of homonuclear rare gases.

1. Introduction.

Le travail qui est présenté ici constitue le développement et la poursuite d'une étude des états électroniques des excimères des gaz rares Ar_2^* et Kr_2^* dont l'étape initiale a essentiellement concerné les états moléculaires les plus bas résultant de la combinaison d'un atome à l'état fondamental et d'un atome dans un état de la première configuration excitée $np^5(n+1)s$ ($n = 3$ pour Ar, $n = 4$ pour Kr). Cette partie inférieure du spectre excité, qui comprend notamment les premiers états moléculaires métastables dont les parents en représentation Λ sont $^3\Sigma_u^+$ et $^1\Sigma_u^+$, a suscité de nombreux travaux, tant expérimentaux (cf. Ref. [1]) que théoriques [2-10] pour l'ensemble des excimères homonucléaires, motivés par l'utilisation de ces espèces dans les Lasers Moléculaires UV. Même si la convergence entre résultats *ab initio* et expérimentaux [9, 10] n'est pas encore toujours quantitative, ces efforts simultanés ont permis d'atteindre une meilleure compréhension de la structure électronique dans cette

partie du spectre, et les formes des courbes de potentiel sont maintenant assez bien établies.

La situation est beaucoup moins claire pour les espèces plus excitées. En particulier, les états moléculaires dissociant dans la seconde configuration excitée $np^5(n+1)p$ sont moins bien connus. Du point de vue théorique, en dehors des estimations de Mulliken [11] illustrées sur l'exemple de Xe_2^* , reprises par d'autres auteurs pour Ar_2^* [12, 13] et Kr_2^* [14], seuls ont été publiés à l'heure actuelle les calculs d'Iwata impliquant la configuration $2p^5\ 3p$ du néon, ainsi qu'une étude préliminaire à vocation méthodologique portant sur le croisement des états g de Ar_2^* corrélés aux configurations $3p^5\ 4s$ et $3p^5\ 4p$ par Teichteil et l'un des auteurs [15]. L'application directe de ces deux études concernait essentiellement l'assignation des spectres d'absorption IR, motivée par les résultats expérimentaux de Oka *et al.* [16, 17]. En dehors des travaux précédents, les études spectroscopiques expérimentales restent parcellaires. Récemment cependant, les progrès des techniques laser de préparation et d'analyse (Fluorescence Induite par Laser) ont également permis d'amorcer l'étude des mécanismes de transfert d'excitation faisant intervenir des collisions à deux

(*) E.R.A. n° 821 au C.N.R.S.

corps [13, 18]. Toutefois l'interprétation des résultats se révèle difficile surtout dans les zones où la densité des états moléculaires devient plus forte, et l'information d'origine théorique (courbes de potentiel), peut constituer une aide importante pour comprendre les phénomènes de transfert.

Nous présentons ici des calculs d'IC *ab initio* des courbes de potentiel de Ar_2^* et Kr_2^* dissociant dans un atome à l'état fondamental $3p^6\ ^1S_0$ et l'autre dans un état excité corrélé, soit à la configuration $np^5(n+1)s$, soit à la configuration $np^5(n+1)p$. Ces calculs rendent également compte des croisements à courte distance avec des états moléculaires issus de configurations plus excitées. Ils ont été menés dans le même cadre que les travaux précédents. Ils utilisent les pseudopotentiels relativistes moyens des références [9] et [10] et ont été conduits avec l'algorithme d'Interaction de Configurations (IC) CIPSI [20] dont nous rappelons brièvement le principe :

i) Une diagonalisation partielle dans un sous-espace S de l'espace d'IC permet d'obtenir une représentation multiconfigurationnelle d'ordre zéro des états spectroscopiques voulus :

$$P_S H P_S | \psi_m^{(0)} \rangle = E_m^{(0)} | \psi_m^{(0)} \rangle \quad (1)$$

$$| \psi_m^{(0)} \rangle = \sum_{K \in S} C_{mK}^{(0)} | K \rangle. \quad (2)$$

ii) Le complémentaire de S est traité perturbativement au second ordre, ce qui conduit pour l'état m à l'énergie

$$E_m^{(2)} = \langle \psi_m^{(0)} | H | \psi_m^{(0)} \rangle + \sum_{I \in S} \frac{|\langle \psi_m^{(0)} | H | I \rangle|^2}{E_m^{(0)} - E_I^{(0)}} \quad (3)$$

$E_I^{(0)}$ est l'énergie du déterminant I, $E_m^{(0)}$ l'énergie d'ordre zéro de l'état m. La définition des dénominateurs est la même que dans les références précédentes [9, 10].

iii) La sélection de S satisfait le critère suivant : tous les déterminants $| K \rangle$ tels que

$$\left| \frac{\langle \psi_m^{(0)} | H | K \rangle}{E_m^{(0)} - E_I^{(0)}} \right| < \eta \cdot \max | C_{mK}^{(0)} | \quad (4)$$

sont inclus dans S jusqu'à convergence du processus. Le seuil de sélection η a été choisi égal à 0,05 comme précédemment.

Il est impossible, déjà pour l'argon et *a fortiori* pour le krypton, de faire abstraction du couplage spin-orbite. Les espèces moléculaires des gaz rares sont en général caractérisées par le schéma de couplage $\Omega_c - \omega$ où $\Omega_c = \Lambda_c + \Sigma_c$ est la projection sur l'axe internucléaire du moment cinétique total du parent ionique (« cœur »), et $\omega = \lambda + \sigma$ correspond à celle du moment cinétique total de l'électron Rydberg (c'est l'équivalent du schéma de couplage atomique $J_c - j$ [19]). Cependant l'étude *a priori* des interactions

électroniques en représentation A (projection du moment cinétique orbital total des électrons) facilite la compréhension des caractéristiques des courbes de potentiel communes à tous les excimères homo-nucléaires. C'est cette étude que nous développons dans ce premier article, l'influence spécifique du couplage spin-orbite sur les potentiels moléculaires et la comparaison avec les résultats expérimentaux constituant l'objet d'une seconde publication.

Nous n'insisterons pas ici sur les résultats quantitatifs concernant les états les plus bas dont l'étude a déjà été publiée. Cependant nous développerons certains aspects théoriques, qui avaient été peu abordés dans les premiers articles essentiellement motivés par la confrontation avec les résultats expérimentaux, étendant ainsi aux gaz rares plus lourds un certain nombre de conclusions de Guberman et Goddard [21] issues d'une étude exhaustive sur He_2^* (voir aussi Réf. [22]).

2. Représentabilité des états Rydberg atomiques et moléculaires dans le calcul *ab initio*.

Notre discussion est plus particulièrement argumentée par des résultats concernant l'argon, cependant la plupart des commentaires s'appliquent également aux autres gaz rares et notamment au krypton. L'obtention de courbes de potentiel dans la zone intéressant la spectroscopie et les collisions à faible énergie ($4a_0 < R < \infty$ pour Ar_2^*) nécessite :

i) un comportement correct à la dissociation impliquant notamment une bonne représentation du spectre atomique (écarts inter- et intramultiplets).

ii) une représentation adéquate de la situation moléculaire à courte et à moyenne distance.

Les critères permettant de satisfaire ces deux conditions ne vont pas toujours de pair, particulièrement lorsque l'IC totale ne peut être menée à bien comme c'est presque toujours le cas avec de grandes bases d'orbitales moléculaires (OM). Tous les calculs qui suivent utilisent les bases d'orbitales atomiques triple-dzêta (OA) de valence, fonctions d de polarisation et de corrélation comprises, des références [9] et [10] pour Ar et Kr respectivement. La flexibilité de la représentation gaussienne triple-dzêta est suffisante pour décrire toutes les situations de polarisation de la couche de valence correspondant aux différents « cœurs » ioniques $^2\Sigma_u^+$, $^2\Pi_g$, $^2\Pi_u$ et $^2\Sigma_g^+$ (respectivement A, B, C, D en suivant la notation de Mulliken [11]). Le tableau I présente quelques résultats d'un calcul préliminaire sur l'ion Ar_2^+ , comparés à des calculs antérieurs d'autres auteurs et aux données spectroscopiques expérimentales. La bonne représentation de l'ion moléculaire X_2^+ ($X = \text{Ar}, \text{Kr}, \dots$) est évidemment une condition nécessaire à une bonne qualité des résultats pour les espèces excitées neutres, la nature diffuse de l'électron Rydberg faisant du « cœur ionique » une entité relativement transférable.

Tableau I. — Constantes spectroscopiques pour l'état fondamental de Ar₂⁺. Nos valeurs correspondant au calcul sans couplage SO (²Σ_u⁺) sont comparées à d'autres calculs d'IC *ab initio* (^a, ^b, ^c) et à un calcul utilisant des fonctionnelles de la densité (^d). Les calculs avec SO sont obtenus à partir des résultats précédents en utilisant la méthode des « atomes dans les molécules » [2] en représentation *A*-Σ, et un paramètre SO, ξ_{3p} tiré des tables atomiques. La valeur expérimentale résulte d'une étude de photo-absorption récente. Tous les calculs d'IC (y compris le nôtre) semblent sous-estimer légèrement l'énergie de dissociation. (^a) utilise des pseudopotentiels, (^b) et (^c) sont des calculs tous-électron).

[Spectroscopic constants for Ar₂⁺ ground state. Our values, referring to the calculation without SO coupling (²Σ_u⁺) are compared with other *ab initio* CI calculations (^a, ^b, ^c) and with a calculation using density functionals (^d). Calculations including SO coupling have been performed from the previous results using the « atoms in molecules » method [2] in the *A*-Σ representation with a ξ_{3p} parameter deduced from atomic tables. The experimental value was derived in a recent photo-absorption study. All CI calculations (including ours) seem to underestimate slightly the dissociation energy. (^a) is a pseudopotential calculation, (^b) and (^c) are all-electron calculations.]

	² Σ _u ⁺ Autres calculs				Notre calcul	Autres calculs		I(¹ / ₂) u Notre calcul	exp.
R _e (Å)	2,46 (^a)	2,48 (^b)	2,42 (^c)	2,43 (^d)	2,46	2,48 (^b)	2,43 (^d)	2,46	
D _e (eV)	1,28 (^a)	1,27 (^b)	1,26 (^c)	1,40 (^d)	1,27	1,19 (^b)	1,32 (^d)	1,21	1,33 ± 0,02 (^e)
ω _e (cm ⁻¹)	300 (^a)	293 (^b)			307	293 (^b)	298 (^d)	307	

(^a) CHRISTIANSEN, P. A., PITZER, K. S., LEE, Y. S., YATES, J. H., ERMILER, W. C. and WINTER, N. W., *J. Chem. Phys.* **75** (1981) 5410.

(^b) WADT, W. R., *J. Chem. Phys.* **68** (1978) 402.

(^c) et (^d) MICHELS, H. H., HOBBS, R. H. and WRIGHT, L. A., *J. Chem. Phys.* **69** (1978) 5151.

(^e) MOSELEY, J. T., SAXON, R. P., HUBER, B. A., COSBY, P. C., ABOUAF, R. and TADJEDDINE, M., *J. Chem. Phys.* **9** (1940) 61.

Nous nous intéresserons dans la suite de ce paragraphe essentiellement aux orbitales Rydberg.

Un premier problème est posé par le choix de la base atomique Rydberg. Des considérations énergétiques sur les positions possibles des minima des états attractifs corrélés aux configurations np⁵ nd, np⁵(n+2)s et np⁵(n+2)p suggèrent que de tels états sont susceptibles de croiser ceux issus de la configuration np⁵(n+1)p et nous ont conduit à introduire dans la base d'orbitales gaussiennes des

fonctions représentatives de ces configurations en plus de celles décrivant les orbitales (n+1)s et (n+1)p. Le dilemme qui survient alors est le compromis qu'il est nécessaire de conclure (sous peine de gigantisme et de risque de surcomplétude à courte distance) entre la multiplicité des orbitales Rydberg nécessaires, et la qualité de la description de chacune d'entre elles (c'est-à-dire le nombre de combinaisons libres de gaussiennes). Les premiers états excités atomiques ne sont pas des états Rydberg *purs* dans

Tableau II. — Rayon moyen (en a₀) des orbitales Rydberg RHF de Ar* (représentation 3-ξ des orbitales Rydberg) pour les états des configurations 3p⁵ 4s et 3p⁵ 3d, et énergies totales (Hartrees). Les exposants sont ceux du tableau IIIa.

[Mean radii (in a₀) of Ar* RHF Rydberg orbitals (triple-dzeta representation of Rydberg AO's) for states belonging to configurations 3p⁵ 4s and 3p⁵ 3d, and total energies (in Hartrees). The exponents are those given in table IIIa.]

	3p ⁵ 4s		3p ⁵ 3d				
Etats	³ P	¹ P	³ F	¹ F	^{3,1} D	³ P	¹ P
⟨ r ⟩	5,44	5,68	9,51	9,85	10,141	8,93	10,32
E _{RHF} (Hartrees)	-20,422593	-20,416561	-20,337775	-20,337328	-20,335628	-20,339136	-20,336815

la mesure où l'électron diffus interagit encore notablement avec le « cœur » ionique, comme le prouvent des écarts énergétiques intra-configuration qui demeurent importants (Tableau II). Ceci se traduit par une différenciation spatiale significative des orbitales diffuses issues de calculs Hartree-Fock restreints (RHF) correspondant aux différents multiplets d'une même configuration ainsi qu'on peut le voir au tableau II pour les états des configurations $3p^5 4p$ et $3p^5 3d$ de Ar^* (calculs en base étendue $3-\zeta$ pour l'orbitale diffuse). La représentation simple-dzêta de l'orbitale diffuse revient à imposer une intégrale coulombienne J_{vr} (positionnant le multiplet) et d'échange K_{vr} (déterminant son éclatement) uniques entre l'orbitale de valence φ_v et l'orbitale Rydberg φ_r^* . Au niveau monoélectronique, ceci risque de limiter les possibilités de repolarisation de l'orbitale diffuse spécifiques à chaque multiplet; au niveau de l'IC, l'absence d'une seconde orbitale de l identique dans la même région d'espace peut également conduire à sous-estimer la corrélation radiale de l'électron diffus avec les électrons de valence. Les contraintes de la représentation $1-\zeta$ s'atténuent cependant lorsque l'on passe à la situation moléculaire en raison de possibilités d'hybridation avec des OM corrélées à des OA de Rydberg de l différent (la complétude de la base moléculaire, résultant de la superposition des bases atomiques, est plus grande à courte distance). Dans le cas de l'argon, les configurations $3p^5 4p$ et $3p^5 3d$ sont relativement bien séparées, et les croisements entre états moléculaires issus de ces deux configurations ne se produisent que pour des distances internucléaires $R < 6 a_0$. En conséquence nous avons utilisé deux bases d'OA dans le calcul moléculaire, l'une B1 pour $R > 6 a_0$, ne comprenant que des fonctions représentant les orbitales $4s$ et $4p$ (représentation $2-\zeta$ de la référence [9]) et assurant une meilleure description des deux premières configurations excitées, l'autre B2 pour $R < 6 a_0$ dans laquelle les gaussiennes représentant les orbitales $3d$, $5s$ et $6s$ ont été incluses, mais où chaque orbitale Rydberg est décrite par une seule combinaison contractée (Tableau IIIa). Les résultats des deux calculs d'IC moléculaires, comparés à $R = 6 a_0$, se sont avérés en suffisamment bon accord ($\delta E < 100 \text{ cm}^{-1}$) pour ne pas nécessiter un recalage des énergies. Pour le krypton, aucune coupure énergétique ne sépare les configurations $4p^5 5p$ et $4p^5 4d$ dont les spectres respectifs se recouvrent même après prise en compte du couplage SO (plus fort pour Kr que pour Ar), et même à longue distance il était indiqué d'inclure les orbitales $4d$, $5s$ et $6s$. En raison des limitations pratiques, et malgré les indications développées précédemment, nous nous sommes résolus dans le cas du krypton, à une représentation $1-\zeta$ (Tableau IIIb) des orbitales Rydberg, peut-être au prix d'une certaine perte de précision à longue distance que l'on pourra évaluer en comparant les résultats aux niveaux expérimentaux (voir plus loin). La détermination des

Tableau III. — Bases gaussiennes de fonctions diffuses B2 pour l'argon et le krypton. Les étoiles caractérisent les fonctions non contractées de la base B1 pour l'argon.

[Gaussian basis sets B2 for argon and krypton diffuse functions. Stars refer to non-contracted function of argon B1 basis set.]

a) Argon :

Type	Exposant	Coefficients de contraction
4s	0,040201 *	0,5960
	0,017125 *	0,5698
	0,008	0,0041
4p	0,040201 *	0,3948
	0,017125 *	0,5777
	0,008	0,1310
3d	0,11706	0,1040
	0,028173	0,4419
	0,010245	0,6185
5s	0,008	0,9754
	0,004	0,5821
5p	0,008	0,5992
	0,004	0,7824

b) Krypton :

Type	Exposant	Coefficients de contraction
5s	0,035839	0,63
	0,015127	0,56
5p	0,035839	0,375
	0,015127	0,656
	0,0048	0,092
4d	0,033403	0,465
	0,011394	0,58
6s	0,006	1,48
	0,002	0,08
6p	0,0048	0,8782
	0,002	0,2142

coefficients de contraction a été faite sur les orbitales virtuelles des ions atomiques Ar^+ et Kr^+ issus de calculs SCF-Nesbet correspondant à l'opérateur monoélectronique [23] :

$$F_{at} = h(i) + \sum_{j=1}^4 n_j \left[J_j(i) - \frac{1}{2} K_j(i) \right] \quad (5)$$

avec des nombres d'occupation égaux à 2 pour l'orbitale ns , $5/3$ pour chaque orbitale np (occupation O1).

Ce choix assure la détermination d'orbitales virtuelles dans le champ de 7 électrons (elles ne sont pas trop diffuses comme le seraient celles résultant du calcul de l'état fondamental à couches fermées). Pour une configuration donnée, les coefficients de l'orbitale virtuelle sont proches de la moyenne des coefficients des orbitales issues de calculs RHF des différents états de la configuration.

Le choix de la base d'OM constitue un deuxième arbitraire, qui disparaîtrait évidemment si l'IC était complète. Il a été inspiré par le même principe que la détermination de la base atomique; les OM ont été obtenues à partir du calcul SCF-Nesbet d'un ion X_2^+ ($X = \text{Ar}, \text{Kr}$) dans lequel le trou dans la couche de valence serait réparti également sur toutes les OM corrélées aux OA np , avec l'opérateur monoélectronique

$$F_{\text{mol}}(i) = h(i) + \sum_{j=1}^8 n_j \left[J_j(i) - \frac{1}{2} K_j(i) \right] \quad (6)$$

et une occupation de valence égale à 2 pour les orbitales $\sigma_{g,u}$ et 11/6 pour chacune des OM issues des OA np .

Cette procédure permet :

i) de déterminer des OM virtuelles dans le champ de 15 électrons de valence, c'est-à-dire celles d'un « cœur » ionique;

ii) de traiter équitablement les OM de valence liantes σ_g , π_u ou antiliantes π_g , σ_u dans la mesure où le trou n'est pas localisé sur une orbitale particulière : aucun « cœur » ionique n'est privilégié, et l'on peut espérer ainsi une représentation monoélectronique équilibrée des états attractifs et répulsifs des ions, et à courte distance celle des états neutres de Rydberg. Cette procédure, si elle n'offre pas de garantie spécifique en ce qui concerne l'interaction entre les orbitales Rydberg et le « cœur » devrait cependant permettre de positionner raisonnablement les croisements évités entre états.

Cependant, dans le cas des excimères homonucléaires, les OM solutions de (6) possèdent la symétrie moléculaire $D_{\infty h}$ et tendent asymptotiquement vers des OA correspondant à un opérateur Nesbet (5), identique sur les deux atomes, caractérisé par une occupation égale à 11/6 pour chaque orbitale p (occupation O2) qui est celle d'une couche de valence contenant 7,5 électrons. Les OM ne dissocient donc pas vers les OA correspondant à l'occupation (O1) représentatives de l'atome excité engendré par la dissociation dissymétrique

L'occupation (O2) fournit pour l'atome excité des orbitales occupées de valence trop diffuses, intermédiaires entre celles de l'ion et du fondamental, défaut qui se répercute sur les OA Rydberg. Il en résulte, que pour un résultat équivalent, l'IC varia-

tionnelle de l'atome excité faite à partir des OA correspondant à l'occupation (O2) doit contenir en plus des excitations spectroscopiques canoniques $np \rightarrow (n+1)s$, $(n+1)p$, nd , $(n+2)s$, $(n+2)p$, quelques excitations vers des orbitales internes hautes en énergie qui permettent la repolarisation correcte des orbitales de valence de cet atome excité. Ces excitations jouent d'ailleurs en sens inverse pour assurer la dilatation des orbitales de valence de l'atome dans l'état fondamental. Dans la situation moléculaire à longue distance, cette question est liée au problème de la dissociation incorrecte des calculs monoélectroniques, ainsi qu'à la corrélation gauche/droite entre les électrons des sous-systèmes (atomes). La repolarisation des orbitales Rydberg est assurée quant à elle, par le mélange entre déterminants correspondant à des excitations vers des orbitales diffuses de même symétrie.

La comparaison avec les termes expérimentaux n'a de sens que si l'on tient compte du couplage spin-orbite (dans l'approximation monoélectronique [19] les constantes de structure fine que l'on peut déduire des tables expérimentales sont $\xi_{3p} = -964 \text{ cm}^{-1}$ pour l'argon, $\xi_{4p} = -3480 \text{ cm}^{-1}$ pour le krypton, les constantes correspondant aux orbitales Rydberg étant bien plus faibles). Le traitement *ab initio* du couplage SO moléculaire par la méthode développée par Teichteil *et al.* [24] fera l'objet d'un second article. Néanmoins, nous présentons aux tableaux IVa et IVb les résultats atomiques *ab initio* pour les configurations $3p^5 4s$, $3p^5 4p$ de Ar* (déjà publiés dans la référence [24]) et $4p^5 5s$, $4p^5 5p$ de Kr*, correspondant avant couplage SO à la limite de dissociation des calculs moléculaires de la section suivante (base B1 pour Ar*, B2 pour Kr*, occupation O2). Dans chaque cas, l'IC variationnelle contient les excitations spectroscopiques canoniques $np \rightarrow (n+1)s$, $(n+1)p$ pour la base B1, les mêmes plus $np \rightarrow nd$, $(n+2)s$, $(n+2)p$ pour la base B2, auxquelles ont été ajoutées quelques autres (voir ci-dessus), de manière à satisfaire le critère de sélection (4). Les niveaux expérimentaux sont retrouvés à mieux que $\sim 350 \text{ cm}^{-1}$ près pour l'argon, mieux que $\sim 500 \text{ cm}^{-1}$ pour le krypton. L'accord légèrement moins bon pour Kr* peut être attribué à l'utilisation de la représentation minimale pour les orbitales Rydberg.

De manière à tester la position des configurations supérieures, nous avons reporté (en utilisant cette fois la base B2 pour Ar*) les écarts entre l'état $np^5(n+1)s \ ^3P$ et les états $np^5(n+1)p \ ^3D$, $np^5 nd \ ^3F$, $np^5(n+2)s \ ^3P$, $np^5(n+2)p \ ^3D$ (Tableaux Va et Vb). Dans l'approximation monoélectronique pour le couplage SO, et en négligeant la contribution des orbitales diffuses, les états de plus haute multiplicité (J) dans chaque configuration se déduisent des précédents par une simple translation $E_{\text{SO}} = -\xi_{np}/2$. Les écarts ci-dessus peuvent donc être comparés directement avec ceux correspondant aux transitions depuis l'état 3P_2 le plus bas vers respectivement 3D_3 ,

Tableau IVa. — Termes des configurations atomiques $3p^5 4s$ et $3p^5 4p$ de l'argon après spin-orbite (à partir du 3P_2 ($3p^5 4s$)), déterminées avec la base B1. Les énergies sont en cm^{-1} .

[Terms of argon $3p^5 4s$ and $3p^5 4p$ atomic configurations including SO coupling, determined with basis set B1. Energies (in cm^{-1}) are referenced with respect to the first state 3P_2 ($3p^5 4s$). The calculated values are taken from reference [22].]

Etat	Calculé	Expérimental
$3p^5 4s$	3P_2 0	0
	3P_1 625	607
	3P_0 1 504	1 410
	1P_1 2 333	2 256
	3S_1 10 697	10 958
$3p^5 4p$	3D_3 12 239	12 319
	3D_2 12 413	12 473
	3D_1 12 930	12 943
	1D_2 13 054	13 094
	3P_0 13 765	13 910
	1P_1 14 044	13 988
	3P_2 14 166	14 146
	3P_1 14 411	14 352
	1S_0 15 226	15 578

Les valeurs calculées correspondent au calcul de la référence [22].

Tableau IVb. — Termes des configurations atomiques $4p^5 5s$ et $4p^5 5p$ du krypton après spin-orbite (à partir du 3P_2 ($4p^5 5s$)) déterminées avec la base B2. Les énergies sont en cm^{-1} .

[Terms of krypton $4p^5 5s$ and $4p^5 5p$ atomic configurations including SO coupling, determined with basis set B2. Energies (in cm^{-1}) are referenced with respect to the first state 3P_2 ($4p^5 5s$).]

Etat	Calculé	Expérimental
$4p^5 5s$	3P_2 0	0
	3P_1 899	945
	3P_0 5 045	5 220
	1P_1 5 686	5 875
	3S_1 10 936	11 196
$4p^5 5p$	3D_3 12 035	12 323
	3D_2 12 153	12 336
	3D_1 12 781	12 992
	1D_2 12 856	13 151
	3P_0 13 388	14 120
	1P_1 17 257	17 623
	3P_2 17 443	17 972
	3P_1 17 471	17 946
	1S_0 18 243	18 882

Tableau Va. — Positions des différentes configurations de Ar (en cm^{-1} à partir du 3P_2 ($3p^5 4s$)) évaluées pour les états de plus haute multiplicité. Le calcul est fait avec la base B2.

[Relative position of states of highest multiplicities in argon various configurations (in cm^{-1} from 3P_2 ($3p^5 4s$)). The calculation is performed with basis set B2.]

Etat	Calculé	Expérimental
$3p^5 4s$ 3P_2	0	0
$3p^5 4p$ 3D_3	12 097	12 319
$3p^5 3d$ 3F_4	20 162	19 606
$3p^5 5s$ 3P_2	19 903	20 324
$3p^5 5p$ 3D_3	23 285	23 799

Tableau Vb. — Positions des différentes configurations de Kr (en cm^{-1} à partir du 3P_2 ($4p^5 5s$)) évaluées pour les états de plus haute multiplicité. Le calcul est fait avec la base B2.

[Relative positions of states of highest multiplicities in krypton various configurations (in cm^{-1} from 3P_2 ($4p^5 5s$)). The calculation is performed with basis set B2.]

Etat	Calculé	Expérimental
$4p^5 5s$ 3P_2	0	0
$4p^5 5p$ 3D_3	12 033	12 323
$4p^5 4d$ 3F_4	18 631	17 826
$4p^5 6s$ 3P_2	19 181	19 655
$4p^5 5p$ 3D_3	22 791	23 144

3F_4 , 3P_2 et 3D_3 . Dans l'ensemble, les résultats calculés coïncident à mieux que 500 cm^{-1} près avec les résultats expérimentaux. La configuration $np^5 nd$ est légèrement trop haute, sans doute en raison de l'absence de fonctions de type f dans le calcul. En effet, la corrélation semble influencer, sensiblement sur les écarts intra- et interconfigurationnels.

3. Résultats moléculaires.

3.1 NATURE DES ORBITALES MOLÉCULAIRES. — Les OM de valence et Rydberg présentent des caractères bien différents (cf. Mulliken [25, 26] et Guberman et Goddard [21] pour une analyse détaillée). Les OM de valence de l'excimère neutre ressemblent beaucoup à celles de l'ion moléculaire. Les OA de valence qui les engendrent sont suffisamment concentrées et leur recouvrement reste très faible jusque vers environ

8 a_0 , pour les deux systèmes Ar₂^{*} et Kr₂^{*}. Même à distance plus courte et dans tout le domaine utile, ces OM sont bien définies par les OA des atomes séparés dont elles sont issues, conformément à l'analyse de Mulliken sur Xe₂^{*}. Le recouvrement des OM Rydberg commence beaucoup plus loin ; à 12 a_0 , les premières ont déjà un caractère moléculaire et sont très significativement hybridées (mélanges d'OA de mêmes m_l mais de l différents). A plus courte distance, sauf pour quelques-unes d'entre elles, le mélange devient très fort et l'analyse au seul regard des coefficients sur les fonctions des atomes séparés pratiquement impossible. Dans la région de stabilité des états moléculaires Rydberg les plus attractifs (autour de la distance d'équilibre R_e de l'ion moléculaire ²Σ_u⁺), l'analyse de Mulliken a montré que ces OM devraient ressembler à des orbitales atomiques centrées entre les deux noyaux (la distance internucléaire R devient petite par rapport au rayon moyen des orbitales Rydberg), ce qui, légitime la notion de système Rydberg dont les états peuvent être définis en première approximation par une configuration de l'ion moléculaire associé à une orbitale Rydberg de nature atomique. Guberman et Goddard ont montré sur He₂^{*} [21] que les transformations affectant certaines orbitales Rydberg, jusqu'à la distance $R = R_e$, ne correspondent pas à la promotion vers des orbitales de l'atome uni proposée par Mulliken [11, 13, 26, 27] ; cette propriété se transfère probablement aux excimères plus lourds (R_e plus grand).

De manière à identifier la nature des OM Rydberg ϕ_i^* du dimère X₂^{*} à courte distance ($R \cong R_e$), nous avons considéré leurs projections sur les OA Rydberg

χ_j^* de l'atome X, déterminées avec la base gaussienne B2 et centrées entre les deux noyaux a et b. Si g_k^a , g_l^b et g_p^0 représentent les fonctions contractées centrées respectivement sur le noyau a, le noyau b et au milieu, le recouvrement s'écrit :

$$\langle \phi_i^* | \chi_j^* \rangle = \sum_k \sum_p c_{ik}^a a_{jp} \langle g_k^a | g_p^0 \rangle + \sum_l \sum_p c_{il}^b a_{jp} \langle g_l^b | g_p^0 \rangle \quad (8)$$

avec

$$\phi_i^* = \sum_k c_{ik}^a g_k^a + \sum_l c_{il}^b g_l^b \quad (9)$$

et

$$\chi_j = \sum_p a_{jp} g_p^0. \quad (10)$$

Les coefficients a_{jp} correspondent à la base B2 du tableau IIIa.

Le calcul montre que pratiquement toutes les OM diffuses du dimère X₂^{*} significatives du point de vue spectroscopique peuvent être associées sans ambiguïté à courte distance à une orbitale bien définie de l'atome X :

$$\langle \phi_i^* | \chi_j^* \rangle > 0,9.$$

Les correspondances principales sont établies dans le tableau VIa pour l'argon, VIb pour le krypton. Le seul écart à cette règle concerne les OM $2\sigma_g^*$ et $3\sigma_g^*$ qui résultent d'un mélange entre les OA 3d et 5s, avec toutefois un poids plus fort sur 3d pour la première, sur 5s pour la seconde ; ceci peut s'expliquer par le fait que les OA 3d et 5s sont très proches en énergie et occupent radialement la même région

Tableau VI. — *Caractérisation des OM Rydberg de Ar₂^{*} et Kr₂^{*} à courte et à longue distance.*

[Nature of Ar₂^{*} and Kr₂^{*} Rydberg MO's at short and long distance.]

a) Ar₂^{*}.

OM	1 σ_g^*	2 σ_g^* ⁽¹⁾	3 σ_g^* ⁽¹⁾	1 σ_u^*	2 σ_u^*	1 π_u^*	2 π_u^*	1 π_g^*	1 δ_g^*
$R = R_e$	4s σ_g	3d σ_g	5s σ_g	4p σ_u	5p σ_u	4p π_u	5p π_u	3d π_g	3d δ_g
$R = \infty$	σ_g 4s	σ_g 4p	σ_g 3d	σ_u 4s	σ_u 4p	π_u 4p	π_u 3d	π_g 4p	δ_g 3d

b) Kr₂^{*}.

OM	1 σ_g^*	2 σ_g^* ⁽¹⁾	3 σ_g^* ⁽¹⁾	1 σ_u^*	2 σ_u^*	1 π_u^*	2 π_u^*	1 π_g^*	1 δ_g^*
$R' = R_e$	5s σ_g	4d σ_g	6s σ_g	5p σ_u	6p σ_u	5p π_u	6p π_u	4d π_g	4d δ_g
$R = \infty$	σ_g 5s	σ_g 4d	σ_g 4d	σ_u 5s	σ_u 5p	π_u 5p	π_u 4d	π_g 5p	δ_g 4d

(1) Pour ces OM, l'assignation à $R \cong R_e$ a été faite en suivant le coefficient le plus fort.

d'espace. Précisons enfin que la même opération de projection répétée (dans le cas de Ar_2^*) avec des orbitales de Rydberg χ_j^* correspondant à celle de l'atome uni (Kr) n'a pas permis d'établir de correspondance significative.

Les OM $1\sigma_g^*$, $1\pi_u^*$ et $1\delta_g^*$ gardent jusqu'à courte distance ($R = R_e$) la nature des OA qui les engendrent à la limite des atomes séparés. D'autres OM ($2\sigma_g^*$, $3\sigma_g^*$, $1\sigma_u^*$, $2\sigma_u^*$, $2\pi_u^*$, $1\pi_g^*$) présentent un caractère différent pour $R = R_e$ et pour $R \rightarrow \infty$. Leur nature change lentement avec la distance. Nous avons illustré ce comportement sur l'OM $1\sigma_u^*$ de Kr_2^* , en la projetant sur des fonctions moléculaires de type valence-bond symétrisées, normées mais pas orthogonales (Fig. 1)

$$\sigma_u^{\text{VB}} 5s = \frac{5s_a - 5s_b}{\sqrt{2(1 - \langle 5s_a | 5s_b \rangle)}}$$

et

$$\sigma_u^{\text{VB}} 5p = \frac{5pz_a + 5pz_b}{\sqrt{2(1 + \langle 5pz_a | 5pz_b \rangle)}}$$

$\sigma_u^{\text{VB}} 5p$ (fonction impaire) tend vers une OA 5p à courte distance. La mutation lente des recouvrements de l'OM $1\sigma_u^*$ avec les fonctions précédentes, indique que son caractère peut être interprété comme résultant d'un croisement évité entre les deux fonctions VB, l'OM convergeant à courte distance vers l'OA la plus basse en énergie de parité compatible avec celle de

Fig. 1. — Variation du recouvrement de l'OM SCF Nesbet $1\sigma_u^*$ de Kr_2^* avec les OM de type VB $\sigma_u^{\text{VB}} 5s$ et $\sigma_u^{\text{VB}} 5p$.

[Variation with internuclear distance of the overlap between SCF Nesbet $1\sigma_u^*$ MO and VB type $\sigma_u^{\text{VB}} 5s$ and $\sigma_u^{\text{VB}} 5p$ orbitals for krypton.]

l'OM. La permutation est lente en raison du fort recouvrement à moyenne et courte distance entre les deux fonctions $\sigma_u^{\text{VB}} 5s$ et $\sigma_u^{\text{VB}} 5p$. Pour la même raison, l'OM supérieure issue de ce croisement est très défavorisée énergétiquement et tend à perdre son sens spectroscopique. Un comportement analogue pourrait être observé pour toutes les OM qui subissent une transformation.

3.2 IC MOLÉCULAIRE ET RÉSULTATS. — Le choix de l'espace de référence S (IC variationnelle) a été fait comme suit. Pour Ar_2^* à longue distance ($R > 6 a_0$), la base d'OA B1 qui a été utilisée fournit une représentation 2- ζ de fonctions contractées g_{4s} , $g_{4s'}$, pour

Fig. 2. — Courbes d'énergie potentielle de Ar_2^* , a) $^3\Sigma_g^+$ et $^1\Sigma_g^+$, b) $^3\Sigma_u^+$ et $^1\Sigma_u^+$, c) $^3\Pi_g$ et $^1\Pi_g$, d) $^3\Pi_u$ et $^1\Pi_u$, e) $^3\Sigma_g^-$, $^1\Sigma_g^-$, $^3\Delta_g$ et $^1\Delta_g$, f) $^3\Sigma_u^-$, $^1\Sigma_u^-$, $^3\Delta_u$ et $^1\Delta_u$.

[Ar_2^* potential energy curves, a) $^3\Sigma_g^+$ and $^1\Sigma_g^+$, b) $^3\Sigma_u^+$ and $^1\Sigma_u^+$, c) $^3\Pi_g$ and $^1\Pi_g$, d) $^3\Pi_u$ and $^1\Pi_u$, e) $^3\Sigma_g^-$, $^1\Sigma_g^-$, $^3\Delta_g$ and $^1\Delta_g$, f) $^3\Sigma_u^-$, $^1\Sigma_u^-$, $^3\Delta_u$ and $^1\Delta_u$.]

l'OA 4s, g_{4p} et $g_{4p'}$ pour l'OA 4p. Nous avons introduit dans S toutes les monoexcitations depuis des OM corrélées à longue distance aux orbitales 3p de valence vers les OM diffuses engendrées par les fonctions g_{4s} , $g_{4s'}$, g_{4p} et $g_{4p'}$, compatibles avec la symétrie d'espace et de spin des états moléculaires calculés, comme dans la référence [9]. Avec la base d'OA B2, chaque fonction contractée correspond à une OA de Rydberg (1- ζ), et à courte distance ont été incluses dans S toutes les mono-excitations depuis les OM de valence corrélées aux OA 3p vers toutes les OM diffuses dissociant dans les OA 4s, 4p, 5s, 5p et 3d. De même pour Kr_2^* , toutes les mono-excitations depuis les OM de valence dissociant en 4p vers les OM diffuses issues de 5s, 5p, 4d, 6s et 6p ont été considérées quelle que soit la distance. Les déterminants équivalents à la dissociation (les OM g et u deviennent dégénérées) ont également été introduits, ce qui assure la convergence vers les états atomiques. Enfin quelques déterminants supplémentaires ont été ajoutés pour satisfaire le critère de stabilité (4).

Ce sont notamment les excitations qui permettent de corriger la polarisation incorrecte des OM symétriques à la dissociation. Il faut remarquer d'autre part que les effets de repolarisation spécifique du nuage électronique de valence dus au trou laissé dans la couche de valence par l'électron diffus et caractérisant un parent ionique particulier A, B, C, D sont pris en compte dans l'IC variationnelle. L'IC variationnelle assure une représentation correcte de tous les états moléculaires spectroscopiques à l'ordre zéro. Avec des variations suivant les bases utilisées et les symétries des états, la dimension de l'espace variationnel (S) est de l'ordre 50, celle de l'espace traité perturbativement est comprise entre $\sim 10^6$ et 2×10^6 . Les figures 2 pour Ar_2^* et 3 pour Kr_2^* représentent les courbes d'énergie potentielle obtenues avec le processus CIPSI complet (après perturbation). Les valeurs numériques des potentiels sont fournies dans les annexes A pour Ar_2^* et B pour Kr_2^* . Les caractéristiques spectroscopiques des potentiels sont résumées dans les tableaux VIIa et VIIb.

Tableau VII. — *Caractéristiques spectroscopiques des états. Pour chaque état, les positions énergétiques des puits (h_e , h'_e) ou des barrières (h_m , h'_m) sont comptées à partir de la valeur du potentiel à $R = \infty$.*

[Spectroscopic constants for molecular states. For each state, the energetical positions of the wells (h_e , h'_e) and humps (h_m , h'_m) are referenced with respect to the potential value at $R = \infty$. a) Ar_2^* , b) Kr_2^* .]

a) Ar_2^* .

Etat	h_e (eV)	R_e (Å)	ω_e (cm ⁻¹)	h'_e (eV)	R'_e (Å)	ω'_e (cm ⁻¹)	R_m (Å)	h_m (eV)	R'_m (Å)	h'_m (eV)
1 $^3\Sigma_g^+$	0,217	2,56	183				2,95	0,261		
1 $^1\Sigma_g^+$	0,208	2,53	188				3,00	0,287		
2 $^3\Sigma_g^+$	0,353	2,47	242				2,71	0,433		
2 $^1\Sigma_g^+$	0,107	2,47	246				2,83	0,211		
1 $^3\Sigma_u^+$	- 0,706	2,44	287							
1 $^1\Sigma_u^+$	- 0,773	2,43	292							
2 $^3\Sigma_u^+$	- 0,213	2,45	285	- 0,040	3,26	67	3,01	- 0,010		
2 $^3\Sigma_u^+$	- 0,416	2,44	291							
3 $^1\Sigma_u^+$	- 0,143	2,45	301	- 0,124	2,90	196	2,67	- 0,056	3,80	0,015
3 $^3\Sigma_u^+$	- 0,356	2,45	300							
1 $^3\Pi_g$	0,503	2,44	298		2,52	0,532				
1 $^1\Pi_g$	0,338	2,44	298		2,54	0,366				
2 $^3\Pi_g$	- 1,007	2,58	699							
2 $^1\Pi_g$	- 0,955	2,62	384							
3 $^3\Pi_g$	0,043	2,45	301		2,79	0,253				
3 $^1\Pi_g$	0,050	2,45	299		2,80	0,267				
2 $^3\Pi_u$	- 0,303	2,50	957		3,50	0,092				
2 $^1\Pi_u$	- 0,276	2,56	544		3,40	0,108				
3 $^3\Pi_u$	- 0,377	2,45	297		2,57	0,402				
3 $^1\Pi_u$	0,389	2,45	295		2,59	0,429				
1 $^3\Delta_g$	- 0,030	3,96	29							
1 $^1\Delta_g$	- 0,027	3,99	29							
1 $^{3,1}\Sigma_g^-$	- 0,076	3,74	113							
1 $^3\Delta_u$	- 0,173	2,43	263	- 0,084	3,30	91	2,78	0,071		
1 $^1\Delta_u$	- 0,224	2,43	300	- 0,085	3,17	119	2,79	0,025		
1 $^{3,1}\Sigma_u^-$	- 0,088	3,25	95							

b) Kr₂^{*}.

Etat	h_e (eV)	R_e (Å)	ω_e (cm ⁻¹)	h'_e (eV)	R'_e (eV)	ω'_e (cm ⁻¹)	h_m (eV)	R_m (Å)	h'_m (eV)	R'_m (Å)
1 ³ Σ _g ⁺	- 0,206	2,94	70				0,233	3,24		
1 ¹ Σ _g ⁺	0,202	2,92	74				0,251	3,30		
2 ³ Σ _g ⁺	0,424	2,88	144				0,341	3,02		
2 ³ Σ _g ⁺	0,095	2,86	147				0,144	3,15		
1 ³ Σ _u ⁺	- 0,642	2,81	155							
1 ¹ Σ _u ⁺	- 0,738	2,80	157							
2 ³ Σ _u ⁺	- 0,275	2,83	154							
2 ¹ Σ _u ⁺	- 0,430	2,81	159				0,006	5,16		
3 ³ Σ _u ⁺	- 0,143	2,82	157	- 0,184	3,29	177	- 0,069	3,03	0,017	4,52
3 ¹ Σ _u ⁺	- 0,300	2,81	166	- 0,126	3,40	98	- 0,093	3,20	0,013	4,90
2 ¹ Π _g	- 0,912	2,82	~ 300							
2 ³ Π _g	- 0,921	2,85	~ 600							
3 ¹ Π _g	0,058	2,79	193				0,154	3,10		
3 ³ Π _g	0,065	2,78	195				0,176	3,12		
2 ³ Π _u	- 0,257	2,82	~ 200				0,067	3,72		
2 ¹ Π _u	- 0,281	2,83	~ 500				0,069	3,70		
1 ³ Δ _u	- 0,204	2,78	164	- 0,110	3,65	68	0,009	3,15		
1 ¹ Δ _u	- 0,242	2,78	164	- 0,110	3,68	72	- 0,028	3,17		
2 ³ Δ _u	- 0,802	3,15	200							
2 ¹ Δ _u	- 0,806	3,16	193							
1 ^{3,1} Σ _u ⁻	- 0,099	3,67	61							

3.3 DISCUSSION. — Les courbes de potentiel de Ar₂^{*} et Kr₂^{*} sont très semblables qualitativement. Pour comprendre la structure du spectre électronique, nous nous sommes inspirés des arguments développés par Guberman et Goddard [21] sur l'exemple de He₂^{*}. La situation est cependant compliquée ici par la possibilité de retirer des électrons des orbitales de valence π_u et π_g , augmentant ainsi le nombre d'états dans chaque symétrie et multipliant les croisements évités. On distingue deux sortes de minima :

i) ceux correspondant à des états liés dont la distance d'équilibre est voisine d'un parent ionique stable. Ainsi, la série de minima à courte distance (aux environs de 4,6 a_0 pour Ar^{*}, 5,3 a_0 pour Kr₂^{*}) correspond au « cœur » A (²Σ_u⁺) relativement lié. De même, quelques états tels que 4 ³Σ_u⁺, 2 ^{3,1}Σ_u⁻, 1 ^{3,1}Δ_u⁻ possèdent un puits peu profond à distance moyenne, apparenté au « cœur » B (²Π_g);

ii) ceux résultant de croisements évités entre états de même symétrie, issus soit d'une même configuration atomique, soit de deux configurations atomiques différentes.

Il faut mentionner également pour la plupart des états, des minima faibles à longue distance ($R > 10 a_0$) dus aux forces de dispersion.

La structure du spectre moléculaire, relativement complexe, s'interprète assez bien en partant d'une représentation adiabatique intuitive et en considérant des OM Rydberg qui conserveraient leur caractère atomique quelle que soit la distance, sans tenir compte

des contraintes d'orthogonalité ni des couplages (ces OM, que nous désignerons dans la suite sans les étoiler, pour les différencier des OM résultant du calcul SCF Nesbet, pourraient être identifiées aux OM de type VB introduites au paragraphe précédent). Dans cette représentation que nous n'utilisons ici que de manière descriptive, les états moléculaires adiabatiques (qui peuvent se croiser) résultent de l'association d'un parent ionique particulier et d'une OM Rydberg adiabatique gardant le caractère de l'OA dans laquelle elle dissocie à longue distance. Cependant les seules OM conservant entièrement leur caractère et tendant à courte distance vers une OA identique à celles qui la définissent pour $R \rightarrow \infty$ sont celles qui ont même parité que ces OA. A partir de chaque configuration atomique la parité u/g des OM qui peuvent être utilisées pour construire les configurations moléculaires, est donc bien définie (il est alors indifférent de les spécifier par leur nature pour $R \rightarrow R_e$ par exemple 4sσ_g ou $R \rightarrow \infty$ σ_g 4s, nous utiliserons la seconde notation). Le « cœur » ionique est alors déterminé par la symétrie de l'état (ou la configuration) étudiée. C'est ce « cœur » qui gouverne le comportement attractif ou répulsif (A très attractif, B légèrement attractif, C plutôt répulsif, D très répulsif, voir références [11] et [29]). L'illustration qualitative qui suit en termes de configurations moléculaires, faite pour Ar₂^{*} vaut tout aussi bien pour les triplets que pour les singulets, que nous ne différencierons donc pas.

Pour la configuration 3p⁵ 4s, la seule OM paire Rydberg est σ_g 4s. On en déduit que les états molé-

culaires sont définis par les configurations A $\sigma_g 4s$ ($3^1\Sigma_u^+$ très attractifs), D $\sigma_g 4s$ ($3^1\Sigma_g^+$ très répulsifs), C $\sigma_g 4s$ ($3^1\Pi_u$ légèrement répulsifs), B $\sigma_g 4s$ ($3^1\Pi_g$ légèrement attractifs). Il en va de même pour les états issus de la configuration $3p^5 5s$. Dans la configuration $3p^5 4p$, ce sont les OM impaires qui doivent être considérées ($\sigma_u 4p$, $\pi_u 4p$); les états sont alors déterminés par A $\pi_u 4p$ ($3^1\Pi_g$ très attractifs), C $\sigma_u 4p$ ($3^1\Pi_g$ légèrement répulsifs), B $\pi_u 4p$ ($3^1\Sigma_u^+$, $3^1\Sigma_u^-$ et $3^1\Delta_u$ légèrement attractifs), D $\sigma_u 4p$ ($3^1\Sigma_u^+$ très répulsifs), B $\sigma_u 4p$ ($3^1\Pi_u$ légèrement attractifs), D $\pi_u 4p$ ($3^1\Pi_u$ très répulsifs), A $\sigma_u 4p$ ($3^1\Sigma_g^+$ très attractifs), C $\pi_u 4p$ ($3^1\Sigma_g^+$, $3^1\Sigma_g^-$, $3^1\Delta_g$ légèrement répulsifs). Le scénario est identique pour la configuration $3p^5 5p$. Enfin, avec les OM paires de la configuration $3p^5 3d$, on peut construire les configurations attractives A $\sigma_g 3d$ ($3^1\Sigma_u^+$), A $\pi_g 3d$ ($3^1\Pi_u$) et A $\delta_g 3d$ ($3^1\Delta_u$). En suivant ce jeu de construction il est aisé de déduire l'allure des courbes d'énergies potentielles diabatiques $V^*(R)$ à partir des potentiels $V_c(R)$ des parents ioniques

$$V^*(R) = V_c(R) - T$$

où T est le terme atomique. C'est ce que montre le schéma de la figure 5 dans lequel le terme de chaque configuration atomique représente une moyenne sur les états de la configuration. On peut constater que l'interprétation diabatique précédente positionne correctement dans le spectre toute la série des minima

à courte distance. Elle est en bon accord avec la nature des configurations dominant les fonctions multiconfigurationnelles du calcul d'IC à courte distance (aux environs de $R = 4,6 a_0$). Les courbes de potentiel adiabatiques résultent de l'application de la règle de non-croisement entre états de même symétrie. Pour rendre compte de manière plus détaillée de la structure des potentiels, on peut remarquer que ces croisements évités sont essentiellement de deux types :

i) Ceux qui font intervenir un croisement au niveau des OM (voir 3.1). L'OM la plus basse se modifie entre $R \rightarrow \infty$ et le domaine des courtes distances. La fonction d'IC se transforme en même temps de manière à suivre la configuration moléculaire d'énergie la plus basse et à respecter le critère de construction donné précédemment. Ainsi, par exemple, les états $1^3\Sigma_g^+$ et $1^1\Sigma_g^+$ sont portés pour R grand essentiellement par la configuration répulsive D $\sigma_g 4s$ (la configuration A $\sigma_u 4s$, dégénérée avec D $\sigma_g 4s$ à la dissociation, garde encore un poids significatif). Lorsque R diminue l'OM adiabatique $1\sigma_u^*$ ($\sigma_u 4s$ pour $R \rightarrow \infty$) devient $\sigma_u 4p$, et la configuration dominante est alors A $\sigma_u 4p$, attractive. Le changement de nature de $1\sigma_u^*$ se fait lentement et commence à distance suffisamment longue pour que le poids de A $\sigma_u 4s$ soit encore conséquent. L'interaction entre les deux états diabatiques qui se croisent est régie

Fig. 3. — Courbes d'énergie potentielle pour Kr_2^* , a) $^3\Sigma_g^+$ et $^1\Sigma_g^+$, b) $^3\Sigma_u^+$ et $^1\Sigma_u^+$, c) $^3\Pi_g$ et $^1\Pi_g$, d) $^3\Pi_u$ et $^1\Pi_u$, e) $^3\Sigma_g^+$, $^1\Sigma_g^+$, $^3\Delta_g$ et $^1\Delta_g$, f) $^3\Sigma_u^+$, $^1\Sigma_u^+$, $^3\Delta_u$ et $^1\Delta_u$.

[Kr_2^* potential energy curves, a) $^3\Sigma_g^+$ and $^1\Sigma_g^+$, b) $^3\Sigma_u^+$ and $^1\Sigma_u^+$, c) $^3\Pi_g$ and $^1\Pi_g$, d) $^3\Pi_u$ and $^1\Pi_u$, e) $^3\Sigma_g^+$, $^1\Sigma_g^+$, $^3\Delta_g$ and $^1\Delta_g$, f) $^3\Sigma_u^+$, $^1\Sigma_u^+$, $^3\Delta_u$ and $^1\Delta_u$.]

Fig. 4. — Schéma qualitatif des courbes de potentiel des configurations moléculaires diabatiques de Ar_2^+ obtenues en translatant les courbes de l'ion moléculaire Ar_2^+ .

[Qualitative picture of the potential curves of Ar_2^+ diatomic molecular configurations derived from translating the curves of the Ar_2^+ molecular ion.]

par les fortes contraintes d'orthogonalité entre $A \sigma_u 4s$ et $A \sigma_u 4p$, en raison du caractère très diffus des orbitales Rydberg, ce qui entraîne également un fort couplage. Le croisement est donc très évité, l'état inférieur présente une structure de puits suivi souvent d'une barrière arrondie à plus longue distance, l'état supérieur devient purement dissociatif. Ces barrières ont été nommées obligatoires par Mulliken [25] (par opposition à des barrières non obligatoires qui existeraient en l'absence de tout croisement, voir référence [21]). Des calculs diabatiques ont illustré ce phénomène sur He_2^+ [22, 28] et Ne_2^+ [2]. Ce phénomène se retrouve chaque fois qu'il y a changement de nature de l'OM Rydberg lorsque les atomes se rapprochent (voir Tableau VI). Il apparaît également clairement dans la forme des états $2^3\Pi_u$ et $2^1\Pi_u$, et intervient pour expliquer la structure des états $3^{3,1}\Sigma_g^+$ et $3^{3,1}\Sigma_u^+$ issus de la configuration atomique $3p^5 4p$.

ii) Le deuxième type de croisement évité, apparaît uniquement au niveau de l'IC. Les deux configurations impliquées, dont l'une est attractive, l'autre répulsive, diffèrent par deux spin-orbitales (« cœur »

ionique et électron Rydberg différents), l'interaction entre les deux états est faible et localisée. Le croisement est très peu évité. Les exemples les plus frappants sont fournis par le croisement évité des états $1^3\Pi_g$ et $2^3\Pi_g$ ainsi que par celui entre $1^3\Pi_u$ et $2^3\Pi_u$. Dans ces cas particuliers, les points de non-croisement sont très proches des minima des états attractifs, et une étude au-delà de l'approximation de Born-Oppenheimer (possibilités de prédissociation) est certainement souhaitable.

Quelques états sont impliqués en même temps dans les deux types de croisement, ce qui complique légèrement la forme des courbes (états $2^3\Sigma_g^+$ et $3^3\Sigma_g^+$, $2^3\Pi_u$). Enfin, les états singulet et triplet restent en général pratiquement parallèles : les différences (sur les courbes adiabatiques) sont essentiellement gouvernées par les positions des asymptotes (triplets et singulets atomiques) qui différencient les points de croisements évités respectifs des triplets et des singulets moléculaires. L'écrantage dû à l'électron Rydberg joue également un rôle sur la forme des courbes ainsi que le mélange de configurations dégénérées à longue distance ($\pi_x np \rightarrow \pi_x(n+1)p$, $\pi_y np \rightarrow \pi_y(n+1)p$ et $\sigma np \rightarrow \sigma(n+1)p$ qui assure la convergence vers les états atomiques. Du point de vue quantitatif, on peut faire les constatations suivantes :

i) Pour les états de cœur A, les puits de Kr_2^+ sont légèrement moins profonds que ceux de Ar_2^+ . Il en est ainsi pour les états $1^3\Sigma_u^+$ ($\text{Kr}_2^+ : D_e = 0,642 \text{ eV}$; $\text{Ar}_2^+ : D_e = 0,706 \text{ eV}$) et $1^1\Sigma_u^+$ ($D_e = 0,738$; $\text{Ar}_2^+ : D_e = 0,773 \text{ eV}$). En raison des croisements évités les énergies de dissociation des états adiabatiques supérieurs ne peuvent entrer dans ce type de comparaison. Lorsque les croisements sont très faiblement évités, on peut estimer les énergies de dissociation des états diabatiques. C'est le cas pour le $3\Pi_g$ corrélés au $3D$ de la configuration $np^5(n+1)p$ ($\text{Kr}_2^+ : D_e = 0,923 \text{ eV}$; $\text{Ar}_2^+ : D_e = 1,09 \text{ eV}$), le $1\Pi_g$ corrélé au $1D$ ($\text{Kr}_2^+ : D_e = 0,939 \text{ eV}$; $\text{Ar}_2^+ : D_e = 0,955 \text{ eV}$), le $3A_u$ corrélé au $3F$ de la configuration $np^5(n+1)d$ ($\text{Kr}_2^+ : D_e = 1,020 \text{ eV}$; $\text{Ar}_2^+ : D_e = 1,175 \text{ eV}$), le A_u corrélé au $1F$ ($\text{Kr}_2^+ : D_e = 1,057 \text{ eV}$, $\text{Ar}_2^+ : D_e = 1,202 \text{ eV}$). L'écart relatif ($\cong 8\%$) reste à peu près constant et suit assez bien les variations obtenues par Christiansen *et al.* [30] (qui ont également utilisé des pseudopotentiels relativistes moyens AREP) pour l'état ionique $2\Sigma_u^+$ ($\text{Kr}_2^+ : D_e = 1,20 \text{ eV}$, $\text{Ar}_2^+ : D_e = 1,28 \text{ eV}$). Les calculs tous électrons non relativistes de Wadt montrent cependant une variation très faible pour ces ions ($\text{Kr}_2^+ : D_e = 1,23 \text{ eV}$, $\text{Ar}_2^+ : D_e = 1,24 \text{ eV}$), de même que les calculs avec des fonctionnelles de la densité de Michels *et al.* [31] ($\text{Kr}_2^+ : D_e = 1,39 \text{ eV}$, $\text{Ar}_2^+ : D_e = 1,40 \text{ eV}$). On peut constater d'autre part que les énergies de dissociation se rapprochent de celle de l'ion $2\Sigma_u^+$ lorsque l'on monte dans le spectre et que l'orbitale de l'électron Rydberg devient plus diffuse (écrantage moins fort). Les distances d'équilibre R_e et les constantes vibrationnelles ω_e des états dont les formes au voisinage du minimum ne sont

pas trop modifiées par un croisement évité, sont assez proches de celles de l'ion parent ($\text{Kr}_2^+ : R_e = 2,77 \text{ \AA}$, $\omega_e = 183 \text{ cm}^{-1}$; $\text{Ar}_2^+ : R_e = 2,48 \text{ \AA}$, $\omega_e = 292 \text{ cm}^{-1}$ d'après Wadt).

ii) Les états de cœur B sont également assez semblables au parent ionique $^2\Pi_g$ de l'ion ($\text{Ar}_2^+ : D_e \cong 0,12 \text{ eV}$, $R_e \cong 3,15 \text{ \AA}$; $\text{Kr}_2^+ : D_e \cong 0,12 \text{ eV}$, $R_e \cong 3,42 \text{ \AA}$ d'après Wadt [29]). Ces minima faibles disparaissent cependant parfois en raison des couplages intraconfigurationnels à moyenne et longue distance.

L'évaluation de la fiabilité de nos calculs est relativement malaisée dans la mesure où ce sont les premiers calculs disponibles pour les états issus de la seconde configuration atomique excitée de Ar^* et Kr^* . La comparaison pour ces états avec les données expérimentales sera faite après inclusion du couplage SO (article II). Pour l'état $1^3\Sigma_u^+$ de Ar_2^* , notre énergie de dissociation est légèrement plus forte que celle calculée par Saxon et Liu dans un calcul tous électrons [4] ($D_e = 0,677 \text{ eV}$). Cependant, la confrontation avec les données expérimentales pour la partie basse du spectre, déjà publiée [8, 9], semble indiquer des énergies de dissociation légèrement sous-estimées pour les premiers états liés ($1u^3P_2$, $0_u^-^3P_2$ et $0_u^+^3P_1$), avec une erreur inférieure à $0,06 \text{ eV}$ pour Ar_2^* , $0,1 \text{ eV}$ pour Kr_2^* , ainsi que des distances d'équilibre surestimées de $0,05 \text{ \AA}$. Cet écart est du même ordre que celui existant pour l'ion $^2\Sigma_u^+$ entre les calculs d'IC *ab initio* et les résultats expérimentaux. Les évaluations expérimentales précises de D_e et R_e pour les premiers états excités sont difficiles et les résultats s'appuient souvent sur la forme répulsive de l'état fondamental qui est mal connue ou sur des formes trop simplifiées des potentiels. Cependant l'incomplétude de la base ou l'approximation du cœur gelé peuvent expliquer ces erreurs qui, si elles sont confirmées peuvent servir de repères majorants pour apprécier la qualité de nos calculs à courte distance.

4. Conclusion.

Nous avons déterminé les courbes de potentiels des deux excimères intermédiaires Ar_2^* et Kr_2^* dans une large région du spectre électronique, impliquant tous les états corrélés aux configurations $3p^5 4s$, $3p^5 4p$ et les états fortement attractifs corrélés aux configurations $3p^5 3d$, $3p^5 5s$ et $3p^5 5p$ pour l'argon, tous les états corrélés aux configurations $4p^5 5s$, $4p^5 5p$ et quelques-uns venant des configurations $4p^5 4d$, $4p^5 6s$ et $4p^5 6p$ pour le krypton. La structure électronique de ces excimères y apparaît, comme dans le cas de He^* , gouvernée à courte distance par le type de l'interaction dominant le cœur moléculaire ionique des états de Rydberg. Cependant, les profondeurs de puits ne sont pas identiques, et tendent vers les puits ioniques au fur et à mesure que l'on monte dans le spectre. L'étude montre une grande ressemblance entre les courbes de potentiel de ces deux excimères, ainsi d'ailleurs qu'avec celles de Ne_2^* calculées par Iwata (au moins pour les états n'impliquant pas les orbitales nd). Les estimations de Mulliken [11] sont souvent confirmées par le calcul. Cependant, d'autres états liés que ceux qu'il avait prévus se raccordent à la confirmation $np^5(n+1)p$; ces états sont issus de croisements évités avec les configurations supérieures. L'analyse spatiale des OM Rydberg en termes d'orbitales atomiques centrées entre les deux atomes semble confirmer les conclusions de Guberman et Goddard à propos de la nature des orbitales de Rydberg à la distance d'équilibre des excimères et correspond à une interprétation satisfaisante de la situation énergétique des courbes de potentiel associées aux divers états moléculaires à courte distance, ainsi que des positions des croisements évités; le caractère de ces croisements évités, qui régissent les potentiels adiabatiques, apparaît enfin fortement influencé par le comportement des OM Rydberg. La détermination des courbes de potentiel relativistes pour l'ensemble du spectre s'avère nécessaire pour mener une discussion quantitative fondée : elle fera l'objet d'une prochaine publication.

Annexe A.

A1. — *Energies potentielles des états $^3\Sigma_g^+$ et $^1\Sigma_g^+$ de Ar_2^* . La référence est -41 Hartrees.*

[Potential energies of $^3\Sigma_g^+$ and $^1\Sigma_g^+$ Ar_2^* states. The reference is -41 Hartrees.]

Etat $R(a_0)$	$1\ ^3\Sigma_g^+$	$1\ ^1\Sigma_g^+$	$2\ ^3\Sigma_g^+$	$3\ ^3\Sigma_g^+$	$2\ ^1\Sigma_g^+$	$3\ ^1\Sigma_g^+$	$4\ ^3\Sigma_g^+$	$4\ ^1\Sigma_g^+$
4,00	-0,511430	-0,506092	-0,462833	-0,443769	-0,461502	-0,443437	-0,439621	-0,437248
4,50	-0,535344	-0,529411	-0,484560	-0,466370	-0,483160	-0,465653	-0,461492	-0,459222
4,60	-0,536625	-0,530583	-0,485299	-0,467329	-0,483874	-0,466490	-0,462119	-0,459854
4,70	-0,537298	-0,531129	-0,485402	-0,467614	-0,483942	-0,466644	-0,462454	-0,460070
4,80	-0,537540	-0,531225	-0,485056	-0,467549	-0,483547	-0,466436	-0,465783	-0,462693
5,00	-0,537250	-0,530604	-0,483655	-0,476066	-0,482000	-0,465488	-0,466377	-0,462431
5,25	-0,536424	-0,529354	-0,483109	-0,483201	-0,480181	-0,470714	-0,465451	-0,463526
5,50	-0,535906	-0,528492	-0,489455	-0,482595	-0,480270	-0,476005	-0,465259	-0,463718
6,00	-0,536643	-0,528925	-0,494972	-0,485037	-0,483217	-0,480302		
6,50	-0,539115	-0,531428	-0,497261	-0,485335	-0,484734	-0,480565		
7,00	-0,541158	-0,533407	-0,498023	-0,485644	-0,485489	-0,479844		
7,50	-0,542771	-0,534990	-0,498294	-0,486249	-0,485880	-0,479498		
8,00	-0,543922	-0,536167	-0,498403	-0,487036	-0,486196	-0,479508		
9,00	-0,545177	-0,537597	-0,498505	-0,488479	-0,486810	-0,479937		
10,00	-0,545625	-0,538260	-0,498581	-0,489349	-0,487344	-0,480343		
12,00	-0,545717	-0,538664	-0,498630	-0,489888	-0,487920	-0,480703		
∞	-0,545514	-0,538885	-0,498416	-0,489797	-0,487931	-0,480665		
Dissociation	$4s\ ^3P$	$4s\ ^1P$	$4p\ ^3S$	$4p\ ^3D$	$4p\ ^1D$	$4p\ ^1S$		

A2. — *Energies potentielles des états $^3\Sigma_u^+$ et $^1\Sigma_u^+$ de Ar_2^* . La référence est -41 Hartrees.*

[Potential energies of $^3\Sigma_u^+$ and $^1\Sigma_u^+$ Ar_2^* states. The reference is -41 Hartrees.]

Etat $R(a_0)$	$1\ ^3\Sigma_u^+$	$1\ ^1\Sigma_u^+$	$2\ ^3\Sigma_u^+$	$3\ ^3\Sigma_u^+$	$2\ ^1\Sigma_u^+$	$3\ ^1\Sigma_u^+$	$4\ ^3\Sigma_u^+$
4,00	-0,551653	-0,548223	-0,485569	-0,473110	-0,482658	-0,471951	-0,454357
4,50	-0,571029	-0,567535	-0,505689	-0,494436	-0,502767	-0,493179	-0,474676
4,60	-0,571431	-0,567921	-0,506220	-0,495021	-0,503219	-0,493746	-0,475293
4,70	-0,571204	-0,567654	-0,506128	-0,494912	-0,503021	-0,493622	-0,477507
4,80	-0,570510	-0,566912	-0,505583	-0,494280	-0,502339	-0,492975	-0,483482
5,00	-0,568191	-0,564477	-0,503654	-0,491921	-0,500022	-0,490581	-0,489493
5,25	-0,564441	-0,560551	-0,500811	-0,493581	-0,496334	-0,486450	-0,487799
5,50	-0,560554	-0,556465	-0,499155	-0,494371	-0,492778	-0,485436	-0,483262
6,00	-0,554013	-0,549510	-0,499851	-0,490436	-0,488905	-0,484615	-0,474827
6,50	-0,550174	-0,545254	-0,499697	-0,488056	-0,488077	-0,481340	
7,00	-0,547838	-0,542610	-0,499333	-0,487433	-0,487575	-0,480160	
7,50	-0,546672	-0,541201	-0,499000	-0,487516	-0,487272	-0,479736	
8,00	-0,546147	-0,540483	-0,498820	-0,487917	-0,487171	-0,479702	
9,00	-0,545861	-0,539923	-0,498715	-0,488859	-0,487327	-0,480052	
10,00	-0,545824	-0,539705	-0,498637	-0,489496	-0,487626	-0,480421	
12,00	-0,545732	-0,539405	-0,498637	-0,489907	-0,488007	-0,480773	
∞	-0,545514	-0,538885	-0,498416	-0,489797	-0,487931	-0,480665	
Dissociation	$4s\ ^3P$	$4s\ ^1P$	$4p\ ^3S$	$4p\ ^3D$	$4p\ ^1D$	$4p\ ^1S$	

A3. — *Energies potentielles des états $^3\Pi_g$ et $^1\Pi_g$ de Ar₂^{*}. La référence est – 41 Hartrees.*

[Potential energies of $^3\Pi_g$ and $^1\Pi_g$ Ar₂^{*} states. The reference is – 41. Hartrees.]

Etat $R(a_0)$	1 $^3\Pi_g$	1 $^1\Pi_g$	2 $^3\Pi_g$	2 $^1\Pi_g$	3 $^3\Pi_g$	3 $^1\Pi_g$	4 $^3\Pi_g$	4 $^1\Pi_g$
4,00	– 0,506512	– 0,505912	– 0,462065	– 0,461883	– 0,448760	– 0,446159	– 0,444192	– 0,441828
4,50	– 0,526611	– 0,526052	– 0,509805	– 0,505828	– 0,482959	– 0,482744	– 0,466260	– 0,464523
4,60	– 0,527024	– 0,526465	– 0,516268	– 0,512177	– 0,483470	– 0,483234	– 0,467226	– 0,465440
4,70	– 0,526761	– 0,526202	– 0,521561	– 0,517349	– 0,483288	– 0,483036	– 0,467514	– 0,465676
4,80	– 0,525985	– 0,525426	– 0,525896	– 0,521558	– 0,482576	– 0,482306	– 0,467300	– 0,465414
5,00	– 0,532311	– 0,527568	– 0,523369	– 0,522962	– 0,480041	– 0,479727	– 0,467466	– 0,466936
5,25	– 0,537367	– 0,532538	– 0,518995	– 0,518376	– 0,475842	– 0,475345	– 0,473999	– 0,473592
5,50	– 0,540328	– 0,535248	– 0,514268	– 0,513619	– 0,478014	– 0,477453	– 0,470789	– 0,470425
6,00	– 0,543031	– 0,537546	– 0,505633	– 0,504900	– 0,481370	– 0,480846	– 0,462134	– 0,461280
6,50	– 0,544556	– 0,538688	– 0,499030	– 0,498153	– 0,482482	– 0,481920		
7,00	– 0,544975	– 0,538881	– 0,494939	– 0,493925	– 0,482872	– 0,482320		
7,50	– 0,545239	– 0,539000	– 0,492484	– 0,491321	– 0,483225	– 0,482711		
8,00	– 0,545446	– 0,539120	– 0,491089	– 0,489777	– 0,483642	– 0,483195		
9,00	– 0,545715	– 0,539312	– 0,489948	– 0,488360	– 0,484460	– 0,484199		
10,00	– 0,545795	– 0,539365	– 0,489735	– 0,487934	– 0,484976	– 0,484899		
12,00	– 0,545708	– 0,539237	– 0,489880	– 0,487968	– 0,485234	– 0,485272		
∞	– 0,545514	– 0,538885	– 0,489797	– 0,487931	– 0,485082	– 0,485082		
Dissociation	4s 3P	4s 1P	4p 3D	4p 1D	4p 3P	4p 1P		

A4. — *Energies potentielles des états $^3\Pi_u$ et $^1\Pi_u$ de Ar₂^{*}. La référence est – 41 Hartrees.*

[Potential energies of $^3\Pi_u$ and $^1\Pi_u$ Ar₂^{*} states. The reference is – 41. Hartrees.]

Etat $R(a_0)$	1 $^3\Pi_u$	1 $^1\Pi_u$	2 $^3\Pi_u$	2 $^1\Pi_u$	3 $^3\Pi_u$	3 $^1\Pi_u$	4 $^3\Pi_u$	4 $^1\Pi_u$
4,00	– 0,475857	– 0,475262	– 0,449550	– 0,449134	– 0,411747	– 0,407412	– 0,407414	– 0,405302
4,50	– 0,497799	– 0,496987	– 0,486722	– 0,479603	– 0,470635	– 0,470216	– 0,445315	– 0,443212
4,60	– 0,498719	– 0,497686	– 0,495500	– 0,488405	– 0,471181	– 0,470729	– 0,452867	– 0,451090
4,70	– 0,501081	– 0,497741	– 0,500737	– 0,495833	– 0,471051	– 0,470576	– 0,458954	– 0,457418
4,80	– 0,509943	– 0,500451	– 0,498944	– 0,497887	– 0,470403	– 0,469906	– 0,463852	– 0,462495
5,00	– 0,519964	– 0,512129	– 0,495928	– 0,495171	– 0,470797	– 0,469741	– 0,468181	– 0,467574
5,25	– 0,528391	– 0,520520	– 0,492704	– 0,491824	– 0,476376	– 0,475341	– 0,464051	– 0,463550
5,50	– 0,533823	– 0,525945	– 0,489551	– 0,488534	– 0,479309	– 0,478365	– 0,460214	– 0,459539
6,00	– 0,539613	– 0,531761	– 0,485983	– 0,484592	– 0,481341	– 0,480659	– 0,456692	– 0,456189
6,50	– 0,542745	– 0,534925	– 0,485819	– 0,483978	– 0,481418	– 0,481247		
7,00	– 0,544022	– 0,536272	– 0,486973	– 0,485142	– 0,481905	– 0,481663		
7,50	– 0,544738	– 0,537100	– 0,487910	– 0,486107	– 0,482476	– 0,482178		
8,00	– 0,545184	– 0,537677	– 0,488552	– 0,486751	– 0,483091	– 0,482791		
9,00	– 0,545645	– 0,638394	– 0,489226	– 0,487366	– 0,484191	– 0,483993		
10,00	– 0,545778	– 0,538725	– 0,489547	– 0,487599	– 0,484861	– 0,484806		
12,00	– 0,545707	– 0,538877	– 0,489868	– 0,487907	– 0,485221	– 0,485259		
∞	– 0,545514	– 0,538885	– 0,489797	– 0,487931	– 0,485082	– 0,485082		
Dissociation	4s 3P	4s 1P	4p 3D	4p 1D	4p 3P	4p 1P		

A5. — *Energies potentielles des états $^3\Delta_g$, $^1\Delta_g$, $^3\Sigma_g^-$ et $^1\Sigma_g^-$ de Ar_2^* . La référence est -41 Hartrees.*

[Potential energies of $^3\Delta_g$, $^1\Delta_g$, $^3\Sigma_g^-$ and $^1\Sigma_g^-$ Ar_2^* states. The reference is -41 Hartrees.]

Etat $R(a_0)$	$1\ ^3\Delta_g$	$1\ ^1\Delta_g$	$2\ ^3\Delta_g$	$2\ ^1\Delta_g$	$1\ ^3\Sigma_g^-$	$1\ ^1\Sigma_g^-$
4,00	− 0,437134	− 0,437088	− 0,371878	− 0,370907	− 0,369424	− 0,369439
4,50	− 0,459219	− 0,459132	− 0,439308	− 0,437657	− 0,435315	− 0,435326
4,60	− 0,459976	− 0,459872	− 0,447522	− 0,445779	− 0,443306	− 0,443306
4,70	− 0,460082	− 0,459940	− 0,454517	− 0,452727	− 0,450157	− 0,450157
4,80	− 0,460078	− 0,459596	− 0,460082	− 0,458578	− 0,456033	− 0,456033
5,00	− 0,470126	− 0,468171	− 0,457536	− 0,457409	− 0,465327	− 0,465327
5,25	− 0,478145	− 0,476167	− 0,454226	− 0,454032	− 0,473317	− 0,473317
5,50	− 0,483265	− 0,481289	− 0,451117	− 0,450708	− 0,478432	− 0,478432
6,00	− 0,488384	− 0,486426	− 0,453072	− 0,452457	− 0,483605	− 0,483605
6,50	− 0,490285	− 0,488288			− 0,485393	− 0,485393
7,00	− 0,490840	− 0,488852			− 0,486970	− 0,486970
7,50	− 0,490913	− 0,488947			− 0,486071	− 0,486071
8,00	− 0,490828	− 0,488881			− 0,486011	− 0,486011
9,00	− 0,490557	− 0,488640			− 0,485779	− 0,485779
10,00	− 0,490311	− 0,488420			− 0,485563	− 0,485563
12,00	− 0,490028	− 0,488154			− 0,485305	− 0,485305
	− 0,489797	− 0,487931			− 0,489797	− 0,489797
Dissociation	$4p\ ^3D$	$4p\ ^1D$			$4p\ ^3P$	$4p\ ^1P$

A6. — *Energies potentielles des états $^3\Delta_u$, $^1\Delta_u$, $^3\Sigma_u^-$ et $^1\Sigma_u^-$ de Ar_2^* . La référence est -41 Hartrees.*

[Potential energies of $^3\Delta_u$, $^1\Delta_u$, $^3\Sigma_u^-$ and $^1\Sigma_u^-$ Ar_2^* states. The reference is -41 Hartrees.]

Etat $R(a_0)$	$1\ ^3\Delta_u$	$1\ ^1\Delta_u$	$2\ ^3\Delta_u$	$2\ ^1\Delta_u$	$1\ ^3\Sigma_u^-$	$1\ ^1\Sigma_u^-$
4,00	− 0,475968	− 0,475896	− 0,402491	− 0,401376	− 0,398853	− 0,398853
4,50	− 0,495931	− 0,495854	− 0,462616	− 0,461287	− 0,458722	− 0,458735
4,60	− 0,496243	− 0,496164	− 0,468999	− 0,467632	− 0,465049	− 0,465049
4,70	− 0,495862	− 0,495781	− 0,474180	− 0,472777	− 0,470166	− 0,470166
4,80	− 0,494951	− 0,494876	− 0,478379	− 0,476946	− 0,474281	− 0,474281
5,00	− 0,492021	− 0,491929	− 0,484424	− 0,482918	− 0,480247	− 0,480247
5,25	− 0,487210	− 0,487111	− 0,488922	− 0,487338	− 0,484639	− 0,484639
5,50	− 0,491290	− 0,489658	− 0,481994	− 0,481876	− 0,486900	− 0,486900
6,00	− 0,492751	− 0,491041	− 0,472322	− 0,472163	− 0,488253	− 0,488253
6,50	− 0,492602	− 0,490792			− 0,487886	− 0,487886
7,00	− 0,492074	− 0,490224			− 0,487304	− 0,487304
7,50	− 0,491567	− 0,489704			− 0,486784	− 0,486784
8,00	− 0,491172	− 0,489303			− 0,486390	− 0,486390
9,00	− 0,490758	− 0,488778			− 0,485883	− 0,485883
10,00	− 0,490336	− 0,488469			− 0,485591	− 0,485591
12,00	− 0,490031	− 0,488170			− 0,485306	− 0,485306
∞	− 0,489797	− 0,487931			− 0,485082	− 0,485082
Dissociation	$4p\ ^3D$	$4p\ ^1D$			$4p\ ^3P$	$4p\ ^1P$

Annexe B.

B1. — *Energies potentielles des états $^3\Sigma_g^+$ et $^1\Sigma_g^+$ de Kr₂^{*}. La référence est – 36 Hartrees (– 35 si *).*

[Potential energies of $^3\Sigma_g^+$ and $^1\Sigma_g^+$ Kr₂^{*} states. The reference is – 36 Hartrees (– 35 if *).]

Etat $R(a_0)$	$1\ ^3\Sigma_g^+$	$1\ ^1\Sigma_g^+$	$2\ ^2\Sigma_g^+$	$3\ ^3\Sigma_g^+$	$2\ ^1\Sigma_g^+$	$3\ ^1\Sigma_g^+$
4,00	– * 0,984512	– * 0,978656	– * 0,939965	– * 0,922418	– * 0,938586	– * 0,921972
5,00	– 0,097400	– 0,091613	– 0,048941	– 0,032479	– 0,047682	– 0,031569
5,30	– 0,101777	– 0,095607	– 0,051807	– 0,036220	– 0,050448	– 0,034867
5,70	– 0,102657	– 0,095790	– 0,050978	– 0,048430	– 0,049261	– 0,036960
6,00	– 0,102492	– 0,095078	– 0,055164	– 0,051141	– 0,048883	– 0,042961
6,50	– 0,103181	– 0,095112	– 0,061269	– 0,053292	– 0,050402	– 0,048929
7,50	– 0,106894	– 0,098297	– 0,064643	– 0,053696	– 0,052665	– 0,048928
8,00	– 0,108461	– 0,099767	– 0,064883	– 0,053790	– 0,052965	– 0,048300
9,00	– 0,110398	– 0,101724	– 0,064859	– 0,054523	– 0,053280	– 0,047998
10,00	– 0,111157	– 0,102718	– 0,064699	– 0,055112	– 0,053552	– 0,048267
12,00	– 0,111066	– 0,103217	– 0,064901	– 0,056184	– 0,054314	– 0,048578
∞	– 0,110576	– 0,103510	– 0,063525	– 0,055747	– 0,054179	– 0,048655
Dissociation	5s ³ P	5s ¹ P	5p ³ S	5p ³ D	5p ¹ D	5p ¹ S

B2. — *Energies potentielles des états $^3\Sigma_u^+$ et $^1\Sigma_u^+$ de Kr₂^{*}. La référence est – 36 Hartrees (– 35 si *).*

[Potential energies of $^3\Sigma_u^+$ and $^1\Sigma_u^+$ Kr₂^{*} states. The reference is – 36 Hartrees (– 35 if *).]

Etat $R(a_0)$	$1\ ^3\Sigma_u^+$	$1\ ^1\Sigma_u^+$	$2\ ^3\Sigma_u^+$	$3\ ^3\Sigma_u^+$	$2\ ^1\Sigma_u^+$	$3\ ^1\Sigma_u^+$
4,00	– 0,029811	– 0,026729	– * 0,966452	– * 0,950668	– * 0,962699	– * 0,949310
5,00	– 0,132330	– 0,128984	– 0,071386	– 0,058756	– 0,068088	– 0,057457
5,30	– 0,134175	– 0,130632	– 0,073608	– 0,060962	– 0,070007	– 0,059664
5,70	– 0,131224	– 0,127345	– 0,071251	– 0,058353	– 0,066926	– 0,056420
6,00	– 0,127605	– 0,123432	– 0,068572	– 0,061444	– 0,063244	– 0,052172
6,50	– 0,121792	– 0,117103	– 0,066975	– 0,060368	– 0,058034	– 0,053194
7,50	– 0,114849	– 0,109272	– 0,066338	– 0,055997	– 0,055052	– 0,049715
8,00	– 0,113316	– 0,107419	– 0,065854	– 0,055357	– 0,054555	– 0,048706
9,00	– 0,112071	– 0,105710	– 0,065204	– 0,055284	– 0,054082	– 0,048137
10,00	– 0,111703	– 0,105083	– 0,064828	– 0,055457	– 0,053985	– 0,048312
12,00	– 0,111115	– 0,104352	– 0,064923	– 0,056236	– 0,054450	– 0,048589
∞	– 0,110576	– 0,103510	– 0,063523	– 0,055747	– 0,054179	– 0,048655
Dissociation	5s ³ P	5s ¹ P	5p ³ S	5p ³ D	5p ¹ D	5p ¹ S

B3. — *Energies potentielles des états $^3\Pi_g$ et $^1\Pi_g$ de Kr_2^* . La référence est – 36 Hartrees (– 35 si *).*

[Potential energies of $^3\Pi_g$ and $^1\Pi_g$ Kr_2^* states. The reference is – 36 Hartrees (– 35 if *).]

Etat $R(a_0)$	$1\ ^3\Pi_g$	$1\ ^1\Pi_g$	$2\ ^3\Pi_g$	$2\ ^1\Pi_g$	$3\ ^1\Pi_g$	$3\ ^3\Pi_g$	$4\ ^3\Pi_g$	$4\ ^1\Pi_g$
4,00	– * 0,982965	– * 0,982249	– * 0,939798	– * 0,939669	– * 0,918529	– * 0,921033	– * 0,891379	– * 0,887499
5,00	– 0,087486	– 0,086972	– 0,075295	– 0,070624	– 0,046781	– 0,046972	– 0,034659	– 0,031655
5,30	– 0,091047	– 0,088715	– 0,089232	– 0,086068	– 0,048815	– 0,049111	– 0,038419	– 0,035279
5,70	– 0,102097	– 0,096727	– 0,085637	– 0,085066	– 0,045403	– 0,045907	– 0,041177	– 0,040204
6,00	– 0,106263	– 0,100617	– 0,081190	– 0,080583	– 0,045172	– 0,045956	– 0,041719	– 0,040994
6,50	– 0,109442	– 0,103413	– 0,073554	– 0,072872	– 0,048927	– 0,049557	– 0,035288	– 0,033284
7,50	– 0,110970	– 0,104449	– 0,062871	– 0,061954	– 0,050173	– 0,050700	– 0,029422	– 0,026145
8,00	– 0,111147	– 0,104483	– 0,059995	– 0,058934	– 0,050215	– 0,050677	– 0,028650	– 0,025383
9,00	– 0,111319	– 0,104492	– 0,057213	– 0,055876	– 0,050513	– 0,050802	– 0,027819	– 0,024583
10,00	– 0,111341	– 0,104448	– 0,056318	– 0,054794	– 0,050939	– 0,051029	– 0,027399	– 0,024497
12,00	– 0,110971	– 0,104062	– 0,056303	– 0,054541	– 0,051567	– 0,051530	– 0,026937	– 0,024059
∞	– 0,110576	– 0,103510	– 0,055747	– 0,054179	– 0,051262	– 0,051262	– 0,025686	– 0,024144
Dissociation	5s 3P	5s 1P	5p 3D	5p 1D	5p 1P	5p 3P	4d 3F	4d 1F

B4. — *Energies potentielles des états $^3\Pi_u$ et $^1\Pi_u$ de Kr_2^* . La référence est – 36 Hartrees (– 35 si *).*

[Potential energies of $^3\Pi_u$ and $^1\Pi_u$ Kr_2^* states. The reference is – 36 Hartrees (– 35 if *).]

Etat $R(a_0)$	$1\ ^3\Pi_u$	$1\ ^1\Pi_u$	$2\ ^3\Pi_u$	$2\ ^1\Pi_u$	$3\ ^3\Pi_u$	$3\ ^1\Pi_u$	$4\ ^3\Pi_u$	$4\ ^1\Pi_u$
4,00	– * 0,953443	– * 0,952781	– * 0,928273	– * 0,927907	– * 0,891988	– * 0,891186	– * 0,841951	– * 0,838356
5,00	– 0,062548	– 0,061534	– 0,052526	– 0,044344	– 0,036203	– 0,035793	– 0,012724	– 0,010647
5,30	– 0,074653	– 0,066008	– 0,065162	– 0,064192	– 0,038358	– 0,037903	– 0,030636	– 0,029296
5,70	– 0,092145	– 0,083184	– 0,062489	– 0,061575	– 0,042386	– 0,039057	– 0,035460	– 0,037335
6,00	– 0,099312	– 0,090405	– 0,059385	– 0,058325	– 0,046949	– 0,046012	– 0,031081	– 0,030659
6,50	– 0,105635	– 0,096839	– 0,055196	– 0,053865	– 0,049567	– 0,048799	– 0,025744	– 0,025433
7,50	– 0,109830	– 0,101300	– 0,054105	– 0,052322	– 0,049596	– 0,049336	– 0,027335	– 0,024264
8,00	– 0,110526	– 0,102148	– 0,054610	– 0,052816	– 0,049712	– 0,049504	– 0,027415	– 0,023983
9,00	– 0,111138	– 0,103058	– 0,055395	– 0,053620	– 0,050259	– 0,050111	– 0,026784	– 0,023522
10,00	– 0,111291	– 0,103464	– 0,055762	– 0,053998	– 0,050770	– 0,050738	– 0,026983	– 0,023439
12,00	– 0,110968	– 0,103517	– 0,056262	– 0,054420	– 0,051486	– 0,051528	– 0,026866	– 0,023822
∞	– 0,110576	– 0,103510	– 0,055747	– 0,054179	– 0,051262	– 0,051262	– 0,025686	– 0,024144
Dissociation	5s 3P	5s 1P	5p 3D	5p 1D	5p 3P	5p 1P	4d 3F	4d 1F

B5. — *Energies potentielles des états $^3\Delta_g$, $^1\Delta_g$, $^3\Sigma_g^-$ et $^1\Sigma_g^-$ de Kr_2^* . La référence est – 36 Hartrees (– 35 si *).*

[Potential energies of $^3\Delta_g$, $^3\Delta_g$, $^3\Sigma_g^-$ and $^1\Sigma_g^-$ Kr_2^* states. The reference is – 36 Hartrees (– 35 if *).]

Etat $R(a_0)$	$1\ ^3\Delta_g$	$1\ ^1\Delta_g$	$2\ ^3\Delta_g$	$2\ ^1\Delta_g$	$3\ ^3\Delta_g$	$3\ ^1\Delta_g$	$1\ ^3\Sigma_g^-$	$1\ ^1\Sigma_g^-$
4,00	– * 0,913423	– * 0,913349	– * 0,809824	– * 0,809112	– * 0,784514	– * 0,784484	– * 0,807729	– * 0,807723
5,00	– 0,023295	– 0,023107	– 0,006507	– 0,006507	– * 0,981800	– * 0,981244	– 0,002395	– 0,002398
5,30	– 0,026958	– 0,026256	– 0,025725	– 0,025725	– 0,001670	– 0,001206	– 0,021810	– 0,021810
5,70	– 0,042245	– 0,040341	– 0,024489	– 0,024489	– 0,015246	– 0,014710	– 0,037228	– 0,037237
6,00	– 0,048826	– 0,046915	– 0,022393	– 0,022303	– 0,019925	– 0,019510	– 0,043809	– 0,043796
6,50	– 0,054411	– 0,052502	– 0,023864	– 0,023864	– 0,019671	– 0,019476	– 0,049421	– 0,049404
7,50	– 0,057274	– 0,055402	– 0,025818	– 0,025818	– 0,020337	– 0,020562	– 0,052345	– 0,052364
8,00	– 0,057397	– 0,055542	– 0,025957	– 0,025957	– 0,021271	– 0,021467	– 0,052519	– 0,052498
9,00	– 0,057157	– 0,055345	– 0,026146	– 0,026146	– 0,021832	– 0,022108	– 0,052322	– 0,052341
10,00	– 0,056854	– 0,055085	– 0,026212	– 0,026212	– 0,021831	– 0,022075	– 0,052075	– 0,052092
12,00	– 0,056418	– 0,054688	– 0,026123	– 0,026123	– 0,021531	– 0,021719	– 0,051710	– 0,051693
∞	– 0,055747	– 0,054179	– 0,025686	– 0,025686	– 0,021157	– 0,021323	– 0,051262	– 0,051262
Dissociation	5p 3D	5p 1D	4d 3F	4d 1F	4d 3D	4d 1D	5p 3P	5p 1P

B6. — *Energies potentielles des états $^3\Delta_u$, $^1\Delta_u$, $^3\Sigma_u^-$ et $^1\Sigma_u^-$ de Kr₂^{*}. La référence est — 36 Hartrees (— 35 si *).*
 [Potential energies of $^3\Delta_u$, $^1\Delta_u$, $^3\Sigma_u^-$ and $^1\Sigma_u^-$ Kr₂^{*} states. The reference is — 36 Hartrees (— 35 if *).]

Etat $R(a_0)$	$1\ ^3\Delta_u$	$1\ ^1\Delta_u$	$2\ ^3\Delta_u$	$2\ ^1\Delta_u$	$3\ ^3\Delta_u$	$3\ ^1\Delta_u$	$1\ ^3\Sigma_u^-$	$1\ ^1\Sigma_u^-$
4,00	— * 0,957582	— * 0,957409	— * 0,841159	— * 0,840250	— * 0,824501	— * 0,821116	— * 0,837439	— * 0,837417
5,00	— 0,061866	— 0,061721	— 0,027159	— 0,025913	— * 0,983299	— * 0,982904	— 0,023133	— 0,023126
5,30	— 0,063182	— 0,063024	— 0,042745	— 0,041393	— * 0,998693	— * 0,998255	— 0,038541	— 0,038521
5,70	— 0,058899	— 0,058712	— 0,053221	— 0,051736	— 0,011127	— 0,009071	— 0,048810	— 0,048827
6,00	— 0,055650	— 0,055247	— 0,055070	— 0,053709	— 0,017734	— 0,016645	— 0,052317	— 0,052301
6,50	— 0,059021	— 0,057373	— 0,045351	— 0,045052	— 0,022903	— 0,021903	— 0,054352	— 0,054335
7,50	— 0,058740	— 0,057014	— 0,033236	— 0,032634	— 0,024989	— 0,024187	— 0,053951	— 0,053936
8,00	— 0,058213	— 0,056468	— 0,030004	— 0,029138	— 0,024689	— 0,024089	— 0,053407	— 0,053390
9,00	— 0,057407	— 0,055660	— 0,027210	— 0,025721	— 0,023463	— 0,023403	— 0,052615	— 0,052597
10,00	— 0,056927	— 0,055198	— 0,026505	— 0,024727	— 0,022459	— 0,022654	— 0,052176	— 0,052159
12,00	— 0,056424	— 0,054711	— 0,026150	— 0,024366	— 0,021599	— 0,021788	— 0,051721	— 0,051699
∞	— 0,055747	— 0,054179	— 0,025686	— 0,024144	— 0,021157	— 0,021323	— 0,051262	— 0,051262
Dissociation	5p 3D	5p 1D	4d 3F	4d 1F	4d 3D	4d 1D	5p 3P	5p 1P

Bibliographie

- [1] KRAUSS, M. et MIES, F. H. dans *Excimer Lasers*, Topics in Applied Physics, Ed. Ch. K. Rhodes (Springer Verlag, New York) 1979.
- [2] COHEN, J. S. et SCHNEIDER, R., *J. Chem. Phys.* **61** (1974) 3230.
- [3] SCHNEIDER, B. et COHEN, J. S., *J. Chem. Phys.* **61** (1974) 3240.
- [4] SAXON, R. P. et LIU, B., *J. Chem. Phys.* **64** (1976) 3291.
- [5] ERMLER, W. C., LEE, Y. S., PITZER, K. S. et WINTER, N. W., *J. Chem. Phys.* **69** (1978) 976.
- [6] IWATA, S., *Chem. Phys.* **37** (1979) 251.
- [7] SPIEGELMANN, F., Thèse, Toulouse, 1979.
- [8] SPIEGELMANN, F. et MALRIEU, J. P., *Chem. Phys. Lett.* **57** (1978) 214.
- [9] CASTEX, M. C., MORLAIS, M., SPIEGELMANN, F. et MALRIEU, J. P., *J. Chem. Phys.* **75** (1981) 5006.
- [10] GADÉA, F. X., SPIEGELMANN, F., CASTEX, M. C. et MORLAIS, M., *J. Chem. Phys.* **78** (1983) 7270.
- [11] MULLIKEN, R. S., *J. Chem. Phys.* **52** (1970) 5170.
- [12] LORENTZ, D. C., *Physica C* **82** (1976) 19.
- [13] CHANG, R. S. F. et SETSER, D. W., *J. Chem. Phys.* **69** (1978) 3885.
- [14] BARR, T. L., DEE, D. et GILMORE, F. R., *J. Quant. Spectrosc. Radiat. Transfer* **15** (1975) 625.
- [15] TEICHTEIL, C. et SPIEGELMANN, F., *Chem. Phys.* **81** (1983) 283.
- [16] OKA, T., RAMA RAO, V. S., REDPATH, J. L. et FIRESTONE, R. F., *J. Chem. Phys.* **61** (1974) 4740.
- [17] ARAI, S., OKA, T., KOGORNA, M. and IMAMURA, M., *J. Chem. Phys.* **68** (1978) 4595.
- [18] INOUE, G., SETSER, D. W. et SADEGUI, N., *J. Chem. Phys.* **76** (1982) 977.
- [19] CONDON, E. U., SHORTLEY, G. H., *The Theory of Atomic Spectra* (Cambridge University, New York) 1951.
- [20] HURON, B., MALRIEU, J. P. et RANCUREL, P., *J. Chem. Phys.* **58** (1973) 5745.
- [21] GUBERMAN et GODDARD III, *Phys. Rev. A* **12** (1975) 1203.
- [22] COHEN, J. S., *Phys. Rev. A* **13** (1976) 86.
- [23] NESBET, R. K., *Proc. R. Soc. London Ser. A* **230** (1955) 312.
- [24] TEICHTEIL, C., PÉLISSIER, M. et SPIEGELMANN, F., *Chem. Phys.* **81** (1983) 273.
- [25] MULLIKEN, R. S., *J.A.C.S.* **86** (1964) 3183.
- [26] MULLIKEN, R. S., *J.A.C.S.* **88** (1966) 1849.
- [27] MULLIKEN, R. S., *Phys. Rev.* **36** (1964) 962.
- [28] EVANS, S. A., COHEN, J. S. and LANE, N. F., *Phys. Rev. A* **4** (1971) 2235.
- [29] WADT, W. R., *J. Chem. Phys.* **68** (1978) 402.
- [30] CHRISTIANSEN, P. A., PITZER, K. S., LEE, Y. S., YATES, J. H., ERMLER, W. C. et WINTER, N. W., *J. Chem. Phys.* **75** (1981) 5410.
- [31] MICHELS, H. H., HOBBS, R. H. et WRIGHT, L. A., *J. Chem. Phys.* **69** (1978) 5151.