Dépolarisation de la lumière diffusée par des molécules anisotropes : dépendance avec la densité

J. Berrue, A. Chave, B. Dumon, M. Thibeu

► To cite this version:

J. Berrue, A. Chave, B. Dumon, M. Thibeu. Dépolarisation de la lumière diffusée par des molécules anisotropes : dépendance avec la densité. *Journal de Physique Lettres*, 1976, 37 (7-8), pp.165-168. 10.1051/jphyslet:01976003707-8016500 . jpa-00231265

HAL Id: jpa-00231265

<https://hal.science/jpa-00231265>

Submitted on 1 Jan 1976

HAL is a multi-disciplinary open access archive for the deposit and dissemination of scientific research documents, whether they are published or not. The documents may come from teaching and research institutions in France or abroad, or from public or private research centers.

L'archive ouverte pluridisciplinaire **HAL**, est destinée au dépôt et à la diffusion de documents scientifiques de niveau recherche, publiés ou non, émanant des établissements d'enseignement et de recherche français ou étrangers, des laboratoires publics ou privés.

Classification
Physics Abstract
5.480 — 8.822

DÉPOLARISATION DE LA LUMIÈRE DIFFUSÉE PAR DES MOLÉCULES ANISOTROPES : DÉPENDANCE AVEC LA DENSITÉ

J. BERRUE, A. CHAVE, B. DUMON et M. THIBEAU

L.E.I.M.D.L., Faculté des Sciences, 49045 Angers Cedex, France

(Reçu le 27 février 1976, accepté le 3 mai 1976)

Résumé. — Trappeniers *et coll.* [1] calculent le taux de dépolariation de la lumière diffusée dans l'approximation D.I.D. et font l'hypothèse de l'orientation aléatoire des axes *intermoléculaires* des molécules en cours de collisions. Cette hypothèse n'est satisfaisante qu'à très basse densité [2, 3]. Nous tenons compte des corrélations d'orientations des axes intermoléculaires et donnons une expression du taux de dépolariation pour des molécules faiblement anisotropes à densités modérées. L'accord avec les mesures (N_2 , C_2H_4) [4] est satisfaisant.

Abstract. — Trappeniers *et al.* [1], using a D.I.D. approximation, have given an expression of the depolarization of scattered light. They assume that the orientations of the *intermolecular* axes of pairs of colliding molecules are independent. Except at very low density, this hypothesis is not satisfactory [2, 3]. In this paper we take into account the correlations of the orientation of these intermolecular axes and we give a theoretical expression valid for weakly anisotropic molecules at moderate densities. The results obtained are in good agreement with experimental data (N_2 , C_2H_4) [4].

Un fluide est composé de molécules linéaires. Leurs positions sont repérées par un trièdre orthonormé $Oxyz$. Un faisceau polarisé selon Oz se propage selon x et on observe les intensités diffusées selon Oy (I_{xz} et I_{zz}) polarisées selon x et z . La matrice (α) de polarisabilité d'une molécule peut s'écrire :

$$(\alpha) = \bar{\alpha}(U) + (\beta) \quad (1)$$

(U) est la matrice identité, $\bar{\alpha}$ la polarisabilité moyenne, (β) une matrice à trace nulle dont les éléments sont liés à l'orientation de la molécule et à son anisotropie δ

$$\bar{\alpha} = \frac{\alpha_{||} + 2\alpha_{\perp}}{3}, \quad \delta = \alpha_{||} - \alpha_{\perp}. \quad (2)$$

Nous supposons (α) non modifié par les collisions (approximation D.I.D.). Selon un calcul traditionnel [2], le champ E_p^h polarisant une molécule h , dépend des voisines l :

$$E_p^h = \left[(U) + \sum_{l \in D_f^h} (S^{lh})(\alpha)^l \right] G^h \quad (3)$$

(S^{lh}) est la matrice qui relie le champ en h , créé par un dipôle en l , à ce dipôle :

$$\left. \begin{aligned} S_{ij}^{lh} &= \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cdot \frac{3R_i^{lh} \cdot R_j^{lh} - (R^{lh})^2 \Delta_{ij}}{(R^{lh})^5} \\ (S^{lh}) &= (S^{hl}) \end{aligned} \right\} \quad (4)$$

Δ est l'indice de Kronecker, R^{lh} la distance mutuelle. D_f^h désigne l'ensemble des proches voisins de h , G^h le champ polarisant moyen. La molécule h présente un moment dipolaire μ^h induit :

$$\begin{aligned} \mu^h &= [(\alpha)^h + (Z)^h] G^h \\ (Z)^h &= (\alpha)^h \sum_{l \in D_f^h} (S^{lh})(\alpha)^l \end{aligned} \quad (5)$$

$(Z)^h$ peut être compris comme représentant une hyperpolarisabilité collisionnelle. Les intensités $I_{ij}(i, j = x, y, z)$ sont :

$$I_{ij} \sim |G|^2 \left\langle \sum_{h,m} (\alpha_{ij}^h \alpha_{ij}^m + \alpha_{ij}^h Z_{ij}^m + \alpha_{ij}^m Z_{ij}^h + Z_{ij}^h Z_{ij}^m) \cos \varphi^{hm} \right\rangle \quad (6)$$

φ^{hm} est le déphasage dû aux propagations, $\langle \rangle$ indique une moyenne sur toutes les configurations. Dès que φ^{hm} est sensiblement non nul, $(Z)^m$ est indépendant de $(Z)^h$ et de $(\alpha)^h$, de plus $\langle (Z)^m \rangle$ est nulle, on peut alors remplacer $\cos \varphi^{hm}$ par un quand il est en facteur de $\alpha_{ij}^h Z_{ij}^m$ ou de $Z_{ij}^h Z_{ij}^m$. La relation (6) devient alors :

$$I_{ij} \sim |G|^2 \left\langle \sum_{h,m} (\alpha_{ij}^h \alpha_{ij}^m \cos \varphi^{hm} + Z_{ij}^h Z_{ij}^m + 2\alpha_{ij}^h Z_{ij}^m) \right\rangle \quad (7)$$

Nous supposons selon l'hypothèse (notée H1 et discutée en annexe) qu'il n'y a pas de corrélations notables entre d'une part l'orientation d'une molécule, et d'autre part la position relative ou l'orientation de ses voisines.

Cependant et contrairement à [1], nous tiendrons compte des corrélations entre les positions des centres des molécules voisines d'une molécule donnée, ce qui conduit à des interférences parfois considérables sur le rayonnement dû aux hyperpolarisabilités collisionnelles.

Selon H1, la direction lm qui fixe la valeur de (S^{lm}) n'est pas corrélée à l'orientation d'une molécule quelle qu'elle soit. Il s'ensuit que la nullité de $\langle S^{lm} \rangle$ entraîne celle de termes tels que $\langle \alpha_{ij}^h \cdot Z_{ij}^m \rangle$; (S^{lm}) entre en effet dans le calcul de Z .

Les N molécules h sont équivalentes à une molécule particulière a . On en déduit :

$$I_{ij} = N \cdot |G|^2 \left\langle \sum_m \alpha_{ij}^a \alpha_{ij}^m \cos \varphi^{am} + Z_{ij}^a Z_{ij}^m \right\rangle. \quad (8)$$

Les moyennes du type

$$\left\langle \sum_m \alpha_{ij}^a \alpha_{ij}^m \cos \varphi^{am} \right\rangle$$

pour des molécules aléatoirement orientées sont bien connues en théorie classique de la diffusion, le taux de dépolarisation est alors :

$$\eta = \frac{I_{xz}}{I_{zz}} = \frac{\frac{\delta^2}{15} + \left\langle \sum_m Z_{xz}^a Z_{xz}^m \right\rangle}{\bar{\alpha}^2 \cdot \frac{RT\chi_T}{V} + \frac{4}{45} \cdot \delta^2 + \left\langle \sum_m Z_{zz}^a Z_{zz}^m \right\rangle} \quad (9)$$

$RT\chi_T/V$ est le facteur intervenant dans les fluctuations de densité. Si on néglige Z , η se réduit à la valeur qu'il aurait en l'absence de collision (η_{nc}). Pour les molécules expérimentalement étudiées (N_2 , C_2H_4) à moyenne densité, les ordres de grandeur des différents termes $\left(\text{prenant comme unité } \alpha^2 \cdot \frac{RT\chi_T}{V} + \frac{4}{45} \delta^2 \right)$ sont 10^{-2} pour $\delta^2/15$, 10^{-3} pour

$$\left\langle \sum_m Z_{xz}^a Z_{xz}^m \right\rangle \quad \text{et} \quad \left\langle \sum_m Z_{zz}^a Z_{zz}^m \right\rangle,$$

on peut donc négliger l'influence de Z au dénominateur de (9) et scinder l'équation (9) en deux termes :

$$\eta = \eta_{nc} + \eta_c \quad (10)$$

où

$$\eta_{nc} = \frac{3 \delta^2}{45 \alpha^2 \cdot \frac{RT\chi_T}{V} + 4 \delta^2} \quad (11)$$

$$\eta_c = \frac{\left\langle \sum_m Z_{xz}^a Z_{xz}^m \right\rangle}{\bar{\alpha}^2 \cdot \frac{RT\chi_T}{V} + \frac{4}{45} \delta^2}. \quad (12)$$

Nous appellerons F la quantité

$$\left\langle \sum_m Z_{xz}^a Z_{xz}^m \right\rangle.$$

Calcul de η_c à basse densité. — A basse densité, la molécule a n'est perturbée que par une seule autre (notée p); Z_{xz}^a , Z_{xz}^m sont indépendants sauf si m désigne p ou a . La nullité de $\langle Z_{xz}^a \rangle$ et de $\langle Z_{xz}^m \rangle$ montre que, dans F , seules comptent les valeurs de m égales à a et p :

$$F = \langle (Z_{xz}^a)^2 \rangle + \langle Z_{xz}^a Z_{xz}^p \rangle. \quad (13)$$

Si on développe Z_{xz}^a , Z_{xz}^p et si on regroupe les termes de façon à pouvoir faire des moyennes indépendantes, on obtient :

$$F = \sum_{\eta, \theta, \mu, \nu = x, y, z} [\langle \alpha_{x\eta}^a \alpha_{x\mu}^a \rangle \langle S_{\eta\theta}^{pa} \cdot S_{\mu\nu}^{pa} \rangle \langle \alpha_{\theta z}^p \alpha_{\nu z}^p \rangle + \langle \alpha_{x\eta}^a \alpha_{\nu z}^a \rangle \langle S_{\eta\theta}^{pa} S_{\mu\nu}^{ap} \rangle \langle \alpha_{\theta z}^p \alpha_{x\mu}^p \rangle] \quad (14)$$

tenant compte des moyennes angulaires suivantes :

$$\begin{aligned} \langle \alpha_{ij} \cdot \alpha_{kl} \rangle &= \bar{\alpha}^2 \Delta_{ij} \Delta_{kl} + \left(\frac{\delta}{3} \right)^2 D_{ijkl} \\ \langle S_{ij} \cdot S_{kl} \rangle &= \frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \left\langle \frac{1}{r^6} \right\rangle D_{ijkl} \\ D_{ijkl} &= \frac{1}{5} [3 \Delta_{ik} \Delta_{jl} + 3 \Delta_{il} \Delta_{jk} - 2 \Delta_{ij} \Delta_{kl}] \end{aligned} \quad (15)$$

où r représente la distance entre a et p . On en déduit la valeur suivante de F :

$$F = \left(\frac{1}{4 \pi \epsilon_0} \right)^2 \left\langle \frac{1}{r^6} \right\rangle \left[\frac{6}{5} \bar{\alpha}^4 + \frac{14}{75} \bar{\alpha}^2 \delta^2 + \frac{44}{1125} \delta^4 \right]. \quad (16)$$

On retrouve bien pour η_c la valeur connue pour les molécules isotropes [2] en faisant $\delta = 0$.

Dans le cas des molécules isotropes, les deux termes de (13) sont égaux. Cette égalité a été supposée par Trappeniers *et coll.*, même dans le cas des molécules anisotropes, ce qui est inexact et les conduit à une autre expression, pour le terme en $\alpha^2 \delta^2$ et en δ^4 ([1], éq. (21)).

Calcul de η_c à densité modérée pour des molécules peu anisotropes. — On suppose que dans (16) le terme dominant est le terme en $\bar{\alpha}^4$. L'erreur ainsi commise $\left(\sim \frac{7}{45} \cdot \frac{\delta^2}{\bar{\alpha}^2} \right)$ soit $\sim 2,3 \eta_0$, où η_0 est la valeur de η à densité nulle quand $RT\chi_T/V = 1$) est faible dans le cas de N_2 et C_2H_4 ($\eta_0 = 0,99 \times 10^{-2}$ et $1,20 \times 10^{-2}$). L'expression de η_c est alors valable pour une molécule de forme quelconque, pour le calcul de η_{nc} , il suffit de généraliser la définition de δ . Cette approximation revient à confondre $\bar{\alpha}(U)$ et (α) pour calculer F . Celui-ci devient alors :

$$F = \bar{\alpha}^4 \left\langle \sum_{l, m, t} S_{xz}^{al} S_{xz}^{mt} \right\rangle \quad (17)$$

soit

où

$$\left. \begin{aligned} F &= 2 \bar{\alpha}^4 \langle \sum' (S_{xz}^{al})^2 \rangle I \\ I &= \frac{\langle \sum'_{l,m,t} S_{xz}^{al} S_{xz}^{mt} \rangle}{2 \langle \sum' (S_{xz}^{al})^2 \rangle} \end{aligned} \right\} \quad (18)$$

l'indice (') affecté à $\sum$ indique qu'on restreint les sommes à $l \in D_f^a$, $t \in D_f^m$. Le facteur I a été calculé de plusieurs manières [2, 5]. Pour les gaz à densité modérée le calcul de Alder *et coll.* [5] semble le meilleur [4].

Comparaison avec l'expérience. Une analyse détaillée est présentée en [4], que nous résumons ici. La mesure de η_0 permet de déterminer δ^2/α^2 , donc, connaissant l'équation d'état, de calculer η_{nc} (11) et le dénominateur de (12). η_c (12) peut s'écrire :

$$\eta_c = \frac{6}{5} \left(\frac{\bar{\alpha}}{4 \pi \epsilon_0} \right)^2 n \int \left(\frac{1}{r^6} e^{-W/kT} d\tau \right) \times \frac{\bar{\alpha}^2}{\bar{\alpha}^2 \frac{RT\chi_T}{V} + \frac{4}{45} \delta^2} \quad (19)$$

n est la densité numérique de molécules, W le potentiel intermoléculaire, L un facteur tenant compte d'une distribution exacte des couples représentée par la fonction de distribution radiale $g(r)$ (à haute densité $g(r) \neq e^{-W/kT}$) :

$$L = \left[\int \frac{g(r)}{r^6} d\tau \right] / \left[\int \frac{e^{-W/kT}}{r^6} d\tau \right]. \quad (20)$$

En introduisant la densité ρ en Amagat ($\rho = nV_0/N_a$, V_0 volume molaire S.T.P., N_a nombre d'Avogadro); η_c ne peut se mettre sous la forme :

$$\eta_c = A \cdot \xi \quad (21)$$

où

$$A = \frac{6}{5} \left(\frac{\bar{\alpha}}{4 \pi \epsilon_0} \right)^2 \frac{N}{V_0} \int \frac{e^{-W/kT}}{r^6} d\tau \quad (22)$$

$$\xi = \rho \times \frac{\bar{\alpha}^2}{\bar{\alpha}^2 \frac{RT\chi_T}{V} + \frac{4}{45} \delta^2} \times L \times I \quad (23)$$

A est une constante, ξ dépend de la densité ρ . Pour calculer ξ nous avons évalué L et I (qui restent voisins de 1) en utilisant [5] et en assimilant les molécules à des sphères rigides. Une mesure précise de η , et le calcul de η_{nc} à cette densité (11), permet de déterminer η_c ($\eta_c = \eta - \eta_{nc}$). L'équation (21) permet alors de déduire une valeur expérimentale de A , utilisant une méthode de moindre carré. Cette valeur semble bien indépendante du domaine de densité étudié [4]. Les valeurs expérimentales ainsi obtenues pour N_2 et C_2H_4 ($0,9 \times 10^{-5}$ et $4,5 \times 10^{-5}$) sont en bon accord avec les valeurs théoriques (22), calculées en prenant pour W un potentiel L.J., soit $1,1 \times 10^{-5}$

et $5,2 \times 10^{-5}$. Il est vrai que la précision expérimentale est médiocre ($\sim 30\%$), car une faible erreur sur η_0 se répercute sur η_{nc} et conduit à une erreur relative importante sur η_c .

Conclusions. — La théorie présentée ici semble assez bien justifiée pour des molécules faiblement anisotropes ($\eta_{nc} \leq 1,3\%$) à densités modérées. On a tenu compte des phénomènes d'interférence dans la diffusion liée aux hyperpolarisabilités collisionnelles. Cependant, on a ignoré les modifications de polarisabilité en cours de collision, et les corrélations d'orientations moléculaires à hautes densités. Ces corrélations sont discutées par Trappeniers *et coll.* en [1].

Annexe. — Nous avons négligé les interférences portant sur l'intensité diffusée par les anisotropies propres des molécules, tout en mettant en évidence (18) les interférences portant sur l'intensité diffusée par l'anisotropie collisionnelle [8, 3]. Nous allons estimer l'importance des interférences entre deux molécules d'azote distantes de 6,68 Å, ce qui est l'ordre de grandeur de la distance entre molécules voisines à 150 Amagats et à température ambiante. Selon un résultat connu le facteur d'interférence I est alors :

$$I_{\text{propre}} = \frac{1 + 3 \langle \cos^2 \psi \rangle}{2}$$

où ψ est l'angle de la deuxième molécule avec la première.

Reprenant un potentiel du type Lennard-Jones à deux centres, employé par Quentrec et Brot [6], nous avons estimé l'énergie de deux molécules pour des orientations définies. La pondération par le facteur de Boltzmann de ces différentes orientations nous permet d'évaluer I_{propre} . Dans le cas envisagé, nous obtenons : $I_{\text{propre}} = 1 + 5 \times 10^{-3}$ très proche de 1.

Ceci fournit un ordre de grandeur des facteurs d'interférences dues aux corrélations d'orientation dans l'azote à 150 Amagats. Ainsi, l'effet de ces corrélations est très faible à cette densité. Ceci est confirmé par les travaux de Keijser R. A. J. [7] : il a étudié l'élargissement de la raie Rayleigh dépolarisée ($\Delta J = 0$) et des raies Raman de rotation dans différents gaz, à des pressions inférieures à 100 atm; les élargissements, mesurables au Fabry-Perot, restent faibles, traduisant le peu d'efficacité des choses au point de vue réorientation. Pour l'azote (150 Amagats, 20 °C), le taux de dépolarisation propre des molécules est de l'ordre de $1,8 \times 10^{-2}$, affecté par un facteur d'interférence 1,005 5, tandis que la contribution collisionnelle, calculée en négligeant les interférences, est de l'ordre de $1,4 \times 10^{-3}$, affectée d'un facteur d'interférence 0,5. On note que l'effet des interférences est environ 10 fois plus important sur la deuxième contribution que sur la première.

Bibliographie

- [1] TRAPPENIERS, N. J., KUZ, V. A. et TEN SELDAM, C. A., *Physica* **57** (1972) 294.
 - [2] THIBEAU, M., OKSENGORN, B. et VODAR, B., *J. Physique* **29** (1968) 287.
 - [3] SUNG CHUNG, An. Thèse, Catholic University of Washington (1975).
 - [4] BERRUE, J., CHAVE, A., DUMON, B. et THIBEAU, M., *J. Physique* (à paraître).
 - [5] ALDER, B. J., WEIS, J. J. et STRAUSS, H. L., *Phys. Rev. A* **7** (1973) 281.
 - [6] QUENTREC, B. et BROT, C., *Phys. Rev. A* **12** (1975) 272.
 - [7] KEIJSER, R. A. J., Thèse Amsterdam (1973).
 - [8] THIBEAU, M., Thèse Paris N° A04302 (1970).
-