On a, pour la solution :

$$P_{1,2} = \frac{\varepsilon_{1,2} - 1}{\varepsilon_{1,2} + 2} \frac{M_{1,2}}{d_{1,2}} = P_1 f_1 + P_2 f_2,$$

en remplaçant dans cette expression $M_{1,2}$ par $M_1 f_1 + M_2 f_2$, $d_{1,2}$ par $\frac{M_1 f_1 + M_2 f_2}{\frac{M_1 f_1}{d_1} + \frac{M_2 f_2}{d_2}}$, P_1 par $\frac{\xi_1 + 1}{\xi_1 + 2} \frac{M_1}{d_1}$

et $\varepsilon_{1,2}$ par $\varepsilon_1 f_1 + \varepsilon_2 f_2 - K f_1 f_2$ on obtient

$$P_2 = \frac{M_1}{d_1} f_1 \frac{3(\varepsilon_2 - \varepsilon_1 - K f_1)}{(\varepsilon_1 f_1 + \varepsilon_2 f_2 - K f_1 f_2 + 2)(\varepsilon_1 + 2)} + \frac{M_2}{d_2} \frac{\varepsilon_1 f_1 + \varepsilon_2 f_2 - K f_1 f_2 - 1}{\varepsilon_1 f_1 + \varepsilon_2 f_2 - K f_1 f_2 + 2} \quad (1)$$

et

$$P_{2\infty} = \frac{M_1}{d_1} \frac{3(\varepsilon_2 - \varepsilon_1 - K)}{(\varepsilon_1 + 2)^2} + \frac{\varepsilon_1 - 1}{\varepsilon_1 + 2} \frac{M_2}{d_2}. \quad (2)$$

Une discussion de l'erreur montre que la valeur $P_{2\infty}$ ainsi calculée est plus précise que celle usuellement fournie par l'extrapolation des données expérimentales obtenues à de très faibles concentrations, les erreurs commises sur celles-ci pouvant être considérables.

L'expression (2) nous a donné : $P_{2\infty} = 369 \text{ cm}^3$ pour N, 173 pour A et 85 pour D, en bon accord avec des valeurs antérieurement publiées [2].

3. Nous avons constaté que la conductibilité (mesurée à la fréquence de 50 Hz) de solutions de nitrobenzène et d'acétone placées pendant plusieurs mois, en tubes scellés, dans un champ électrostatique de 260 V/cm avait diminué (celle de solutions témoins, placées hors du champ, restant pratiquement inchangée). Il en était de même pour le pouvoir inducteur spécifique des solutions de nitrobenzène. Cette évolution se présente comme un phénomène complexe; bien que toujours de même sens, les modifications observées étaient variables et n'ont pu être reliées de façon simple aux concentrations.

Manuscrit reçu le 13 juin 1954.

- [1] BEDEAU F. — *Onde Élect.*, 1927, **6**, 36.
 [2] SMITH J. W. et CLEVERDON D. — *Trans. Faraday Soc.*, 1949, **45**, 109-121.
 PALIT Santi R. et BANERJEE Birendra Ch. — *Trans. Faraday Soc.*, 1951, **47**, 1299-1303.

SUR LE POUVOIR INDUCTEUR SPÉCIFIQUE ET L'INDICE DE RÉFRACTION DE SOLUTIONS DE CORPS POLAIRES (NITROBENZÈNE, ACÉTONE, DICHLORÉTHANE) DANS UN SOLVANT NON POLAIRE (BENZÈNE)

Par MM. R. ARNOULT et J. FONTAINE,

* Laboratoire de Radioélectricité,
Faculté des Sciences de Lille.

Pour le réglage d'appareils destinés à l'étude de substances diélectriques, il est commode de disposer d'une série de corps de pouvoir inducteur spécifique connu. Il est classique d'utiliser des solutions, plus ou moins concentrées, de substances polaires dans des solvants non polaires. Nous avons réalisé des solutions de nitrobenzène, d'acétone, et de dichloréthane dans le benzène; nous les désignerons dans ce qui suit par N, A et D.

La concentration molaire f_2 du corps polaire ⁽¹⁾ variait de 0,0005 à 0,647 pour N, de 0,005 à 0,642 pour A et de 0,018 à 0,345 pour D. Le pouvoir inducteur spécifique ε a été mesuré, à 20° C, par la méthode des doubles battements [1], à la fréquence de 1 MHz. On a mesuré également l'indice de réfraction n_D au réfractomètre de Pulfrich.

1. Nous avons constaté qu'à la précision des mesures effectuées (0,5 pour 100 sur ε ; 0,5 pour 1000 sur n_D) le pouvoir inducteur spécifique et l'indice de réfraction peuvent être représentés, à toutes les concentrations, par des expressions quadratiques en f_2 . En désignant par ε_1 , n_1 et ε_2 , n_2 les valeurs de ε et n_D pour le solvant non polaire et pour le corps polaire purs et par f_1 et f_2 les concentrations molaires ($f_1 + f_2 = 1$) on peut écrire ceci sous la forme

$$\begin{aligned} \varepsilon_{1,2} &= \varepsilon_1 f_1 + \varepsilon_2 f_2 - K f_1 f_2, \\ n_{1,2} &= n_1 f_1 + n_2 f_2 + K' f_1 f_2, \end{aligned}$$

avec

$$\begin{aligned} K &= 10,3 & K' &= 0,01 & \text{pour N;} \\ K &= 8,5 & K' &= 0,01 & \text{pour A} \end{aligned}$$

et

$$K = 4,1 \quad K' = 0,004 \quad \text{pour D.}$$

2. On sait que pour calculer le moment électrique de la molécule polaire on doit d'abord déterminer la limite $P_{2\infty}$ de la polarisation molaire pour une dilution infinie ($f_2 \rightarrow 0$).

(1) Rappelons que si l'on ajoute une masse m_2 d'un corps 2, de masse moléculaire M_2 , à une masse m_1 d'un corps 1, de masse moléculaire M_1 , on a par définition :

$$f_2 = \frac{\frac{m_2}{M_2}}{\frac{m_1}{M_1} + \frac{m_2}{M_2}} = \frac{m_2 M_1}{m_1 M_2 + m_2 M_1}.$$